







PLANCHE I

EXPLICATION DE LA PLANCHE I

	Pages.
FIG. 1. — <i>Theodoxus wallacei</i> (Dohrn), de Soengai Manoembaai (îles Aroe), 26-III-1929. Grandeur naturelle	59
FIG. 2. — <i>Littorina scabra</i> (Linné), de Soengai Manoembaai (îles Aroe), 26-III-1929. Grandeur naturelle a) forme typique; b) var. <i>filosa</i> .	75
FIG. 3. — <i>Erosaria labrolineata</i> (Gaskoin), de Sorong Door (Nouvelle-Guinée), 2-III-1929. × 2	131
FIG. 4. — <i>Aphanoconia musiva</i> (Gould), de Misool, 26-II-1929. × 5	69
FIG. 5. — <i>Columbella fulgurans</i> Lamarck, de Pasirpoeti (Halmaheira), 15-II-1929. × 2... ..	174
FIG. 6. — <i>Columbella pardalina</i> Lamarck, de l'île Weim, 28-II-1929. × 2	175
FIG. 7. — <i>Strombus floridus</i> Lamarck, de Manokwari, 14-III-1929. Grandeur natu- relle... ..	116
FIG. 8. — <i>Strombus plicatus</i> Lamarck, de Pantai Timoer (Bali), 25-I-1929. Grandeur naturelle	112





W. ADAM et E. LELOUP. — Prosobranchia.

PLANCHE II

EXPLICATION DE LA PLANCHE II

	Pages.
FIG. 1. — <i>Clypidina notata</i> (Linné), de Harang Hawoe (Java), 25-XII-1928. Grandeur naturelle	8
FIG. 2. — <i>Diodora galeata</i> (Helbling), <i>a</i>) et <i>b</i>) de Banda Neira, 24-II-1929; <i>c</i>) de Banda, 23-II-1929. × 2	8
FIG. 3. — <i>Cellana rota</i> (Gmelin), de Harang Hawoe (Java), 25-XII-1928. × 2	12
FIG. 4. — <i>Acmaea striata</i> (Quoy et Gaimard), de la baie de Paloe (Célèbes), 5-II-1929. Grandeur naturelle	14
FIG. 5. — <i>Acmaea crucis</i> Tenison-Woods, des îles Pisang et Foetoeroega, 18-III-1929. Grandeur naturelle	17
FIG. 6. — <i>Acmaea flammea</i> (Quoy et Gaimard), de l'île Nomvoor, 7-III-1929. <i>a</i>), <i>b</i>) et <i>c</i>) : l'exemplaire usé; <i>d</i>), <i>e</i>) et <i>f</i>) : le petit exemplaire montrant la sculpture de la coquille. × 2	18
FIG. 7. — <i>Cantharidus gilberti</i> (P. Fischer), de Banda Neira, 24-II-1929. × 3... ..	19
FIG. 8. — <i>Clanculus margaritarius</i> (Philippi), de Banda Neira, 24-II-1929. × 2	21
FIG. 9. — <i>Clanculus atropurpureus</i> (Gould), de Banda Neira, 24-II-1929. × 2	22
FIG. 10. — <i>Trochus maculatus</i> Linné, <i>a</i>) var. <i>verrucosa</i> Gmelin, d'Amboine, 21-II-1929; <i>b</i>) var. <i>granosa</i> Lamarck, de l'île Pisang, 18-III-1929. Grandeur naturelle	24




Clypidina notata (L.).



Diodora galeata (Helbling).




Cellana rota (Gmelin).



Acmaea striata (Quoy et Gaimard).



Acmaea crucis Ten.-Woods.



Acmaea flammea (Quoy et Gaimard).




Cantharidus gilberti
(P. Fischer).



Clanculus atropurpureus (Gould).



Clanculus margaritarius (Philippi).




Trochus maculatus Linné.
 a. — var. *verrucosa* Gm.
 b. — var. *granosa* L.


PLANCHE III

EXPLICATION DE LA PLANCHE III

	Pages.
FIG. 1. — <i>Trochus acutangulus</i> Chemnitz, de Banda, entre Banda Neira et Goenoeng Api, 23/24-II-1929. Grandeur naturelle	29
FIG. 2. — <i>Monilea callifera</i> (Lamarck), de la Plage de Palette, près Watampone Bone (Célèbes), 21-IV-1932. × 3	29
FIG. 3. — <i>Turbo radiatus</i> Gmelin, de Banda, entre Banda Neira et Goenoeng Api, 23/24-II-1929. Grandeur naturelle	34
FIG. 4. — <i>Turbo bruneus</i> [(Bolten), Röding], <i>a</i>) jeune exemplaire de Banda, entre l'île Lontor et Goenoeng Api, 24-II-1929; <i>b</i>) exemplaire adulte de Kaimana, 19-III-1929. Grandeur naturelle	34
FIG. 5. — <i>Turbo cinereus</i> Born, <i>a</i>) petit exemplaire de Watampone Bone (Célèbes), 21-IV-1932; <i>b</i>) et <i>c</i>) exemplaire moyen et grand exemplaire de Poeloe Babi (îles Aroe), 21-III-1929. Grandeur naturelle	37
FIG. 6. — <i>Astraea calcar</i> (Linné), <i>a</i>) d'Amboine, 21-II-1929; <i>b</i>) de Poeloe Babi (îles Aroe), 21-III-1929; <i>c</i>) de Banda, entre l'île Lontor et Goenoeng Api, 24-II-1929. Grandeur naturelle	40
FIG. 7. — <i>Nerita undata</i> Linné, de Poeloe Babi (îles Aroe), 21-III-1929. Grandeur naturelle	45
FIG. 8. — <i>Nerita plicata</i> Linné, des îles Pisang et Foetoeroega, 18-III-1929. Grandeur naturelle	41
FIG. 9. — <i>Nerita costata</i> Chemnitz, des îles Pisang, 18-III-1929. Grandeur naturelle.	43




Trochus acutangulus Chemnitz.




Monilea callifera
(Lamarek).




Turbo radiatus
Gmelin.



Turbo bruneus [(Bolten) Röding].




Turbo cinereus Born.




Astraea calcar (Linné).



Nerita undata Linné.



Nerita plicata Linné.




Nerita costata Chemnitz.

PLANCHE IV

EXPLICATION DE LA PLANCHE IV

	Pages.
FIG. 1. — <i>Nerita albicilla</i> Linné, des îles Philippines, 8/17-IV-1932. Grandeur naturelle... ..	48
FIG. 2. — <i>Nerita exuvia</i> Linné, des îles Pisang, 18-III-1929. Grandeur naturelle ...	49
FIG. 3. — <i>Nerita chamaeleon</i> Linné, de Sabang, 12-V-1929. Grandeur naturelle ...	50
FIG. 4. — <i>Nerita planospira</i> Anton, de Soengai Manoembaai (îles Aroe), 26-III-1929. Grandeur naturelle	51
FIG. 5. — <i>Nerita reticulata</i> Karsten, du port de Soembawa, 29-I-1929. × 2	52
FIG. 6. — <i>Nerita nigerrima</i> Chemnitz, des îles Pisang, 18-III-1929. Grandeur naturelle... ..	52
FIG. 7. — <i>Nerita polita</i> Linné, de Poeloe Babi (îles Aroe), 21-III-1929. Grandeur naturelle	53
FIG. 8. — <i>Nerita morio</i> Sowerby, du port de Soembawa, 29-I-1929. Grandeur naturelle... ..	54
FIG. 9. — <i>Nerita picea</i> Récluz, de Ternate, 17-II-1929. × 2	55
FIG. 10. — <i>Nerita insculpta</i> Récluz, de l'île Nomvoor, 7-III-1929. Grandeur naturelle.	57
FIG. 11. — <i>Neritina fuliginosa</i> v. d. Busch, de Harang Hawoe (Java), 25-XII-1928. Grandeur naturelle	63
FIG. 12. — <i>Neritina gagates</i> Lamarck, de Soengai Manoembaai (îles Aroe), 26-II-1929. Grandeur naturelle	64
FIG. 13. — <i>Neritina perottetiana</i> Récluz, de Kaimana, 19-III-1929. × 2	64
FIG. 14. — <i>Neritina sowerbiana</i> Récluz, de Kaimana, 19-III-1929. Grandeur naturelle.	65
FIG. 15. — <i>Neritina bicolor</i> (Récluz), de Djailolo, 6-II-1929. × 4	63
FIG. 16. — <i>Septaria janelli</i> (Récluz), de Djailolo, 6-II-1929. × 4	67



W. ADAM et E. LELOUP. — Prosobranchia.

