

DE VOGELS
VAN
BELGIË



LES OISEAUX
DE
BELGIQUE

1000 Teyn

DE VOGELS VAN BELGIË

LES OISEAUX DE BELGIQUE

DEEL II
TOME II

Uitgegeven door

N.V. FORT-PRODUKTEN



Edité par

S.A. PRODUITS FORT

FORT

ITEGEM

LEGENDE

♂ = mannetje

♀ = wijfje

1/2, 1/3, 2/5, 3/7, enz. = de helft, één derde, twee vijfden, drie zevenden, enz., van de werkelijke grootte.

Deel I bevat N^{rs} 1 tot 176.

Deel II bevat N^{rs} 177 tot 350.

Op de laatste bladzijde van deel I vindt U de stelselmatige indeling van de "Vogels van België".

Achteraan in deel II zijn de alfabetische lijsten weergegeven van de Nederlandse en Franse namen met aanduiding van de nummers.

LEGENDE

♂ = mâle

♀ = femelle

1/2, 1/3, 2/5, 3/7, etc. = la moitié, un tiers, deux cinquièmes, trois septièmes, etc., de la grandeur réelle.

Le tome I contient les N^{os} 1 à 176.

Le tome II contient les N^{os} 177 à 350.

Vous trouvez la classification systématique des "Oiseaux de Belgique" à la dernière page du tome I.

En dernières pages du tome II se trouvent les listes alphabétiques des noms français et néerlandais avec indication des numéros.

177. - *Bombycilla garrulus garrulus* (Linné)



Pestvogel - Jaseur du Nord

N° 177 - PESTVOGEL

Bombycilla garrulus garrulus (Linné). - 1/2.

Orde PASSERIFORMES. - Famille BOMBYCILLIDÆ.

Noorden van Europa en Siberië; zwerft in de winter tot Zuid-Europa, Klein-Azië en Perzië.

Bewoont de bossen van naaldbomen en berken; in de winter overal waar hij besbomen vindt : lijsterbes, witte hagedoorn, egelantier, mondhout, jeneverstruik, taxis, vlierboom, enz., waarvan de vruchten, buiten kerfdieren, zijn voornaamste voedsel uitmaken.

Nest van takjes, mos, gras, met van binnen haar en pluimen, gebouwd in de naaldbomen; 4-6 gevlekte eieren; één broedsel.

Rustige, stille vogel, zeer gezellig buiten de tijd van het nestelen. Zwakke stem; roepen : « ssirr », « duu », « tsie »; zijn zang is een zacht gemurmur, verbinding van verschillende roepen en klanken.

N° 177 - JASEUR DU NORD

Bombycilla garrulus garrulus (Linné). - 1/2.

Ordre PASSERIFORMES. - Famille BOMBYCILLIDÆ.

Nord de l'Europe et de la Sibérie; en hiver erre vers le sud jusqu'au midi de l'Europe, l'Asie Mineure et la Perse.

Habite les forêts de conifères et de bouleaux; en hiver partout où il trouve des arbres à baies : sorbier, aubépine, églantier, troène, genévrier, if, sureau, etc., dont les fruits, en dehors d'insectes, constituent sa principale nourriture.

Nid de brindilles, mousse, herbes, intérieur de poils et plumes, construit dans des conifères; 4-6 œufs, tachetés; une nichée.

Oiseau paisible, tranquille, très sociable en dehors de la saison de nidification. Voix faible; cris : « ssirr », « duu », « tsie »; son chant est un doux murmure, combinaison de différents cris et sons.

178. - *Turdus dauma aureus* Holandre



Goudlijster - Grive dorée

N° 178 - GOUDLIJSTER

Turdus dauma aureus Holandre. - 1/3.

Orde PASSERIFORMES. - Famille MUSCICAPIDÆ.

Bewoont het Oosten van Siberië, van de streek van de Baïkal tot de Stille Oceaan en Japan. Trekt naar het Zuiden in de winter. Zwerft soms tot in Europa, verdwaalt zelden tot in onze streken.

Bewoont de bossen met onderhout. Nest in de bomen, gebouwd uit mos, grasstengels, met van binnen bladeren, naalden van kegelvruchtbomen; 4-5 gevlekte eieren; waarschijnlijk twee broedsels.

Eet kerfdieren en bessen, wormen en slakken, meest op de grond. Haar zang schijnt aangenaam te zijn.

N° 178 - GRIVE DOREE

Turdus dauma aureus Holandre. - 1/3.

Ordre PASSERIFORMES. - Famille MUSCICAPIDÆ.

Habite l'est de la Sibérie, de la région du Baïkal à l'océan Pacifique et le Japon. Emigre au sud en hiver. Erre parfois jusqu'en Europe, s'égare rarement jusque dans nos régions.

Habite les forêts avec sous-bois. Nid dans les arbres, construit de mousse, tiges d'herbes, garniture intérieure de feuilles, aiguilles de conifères; 4-5 œufs, tachetés; probablement deux nichées.

Mange des insectes et des baies, vers et limaces, le plus souvent à terre. Son chant paraît être agréable.

179. - *Turdus sibiricus sibiricus* Pallas



Siberische Lijster - Grive sibérienne
1 ♂ 2 ♀

N° 179 - SIBERISCHE LIJSTER

Turdus sibiricus sibiricus Pallas. - 1/2.

Orde PASSERIFORMES. - Familie MUSCICAPIDÆ.

Bewoont het Noorden van Midden-Siberië, streken van de Ienisseï en van de Lena; overwintert in het Zuiden van Azië en zelfs in Maleisië. Verdwaalt bij uitzondering in Europa.

Nest in de struiken, gebouwd uit gras versterkt met aardemortel, van binnen gevoerd met bladeren en fijn gras; 6 gevlekte eieren.

Wilde en voorzichtige vogel, vergadert in benden in de winter. Eet wormen en kerfdieren, alsook bessen. Zijn zang is kort en fluitend, met een ronde rijke klank.

N° 179 - GRIVE SIBERIENNE

Turdus sibiricus sibiricus Pallas. - 1/2.

Ordre PASSERIFORMES. - Famille MUSCICAPIDÆ.

Habite le nord de la Sibérie moyenne, régions de l'Iénisséï et de la Léna; hiverne au sud de l'Asie et même en Malaisie. S'égare exceptionnellement en Europe.

Nid dans les buissons, construit d'herbes, consolidées de mortier de terre, intérieur garni de feuilles et herbes fines; 6 œufs, tachetés, Oiseau sauvage et prudent, se réunit en bandes en hiver. Mange des vers et des insectes, ainsi que des baies. Son chant est court et sifflant, d'un timbre rond et riche.

180. - *Turdus pilaris* Linné



Tjaklijster - Grive litorne

N° 180 - TJAKLIJSTER

Turdus pilaris Linné. - 2/5.

Orde PASSERIFORMES. - Familie MUSCICAPIDÆ.

Bewoont het Noorden en het midden van Europa en Siberië, in Europa in het Zuiden tot Polen en het Oosten van Duitsland; overwintert in het midden en het Zuiden van Europa en het Zuid-Westen van Azië.

Nestelt in de bossen, in de nabijheid der vlakten; bezoekt veel de weiden. Nest van gras, met slijk verbonden; 5-6 gevlekte eieren; twee broedsels.

Zeer gezellig. Voedt zich met wormen, weekdieren, kerfdieren, evenals met vruchten en bessen. Kenschetsende roep: « tjak tjak tjak », alsook « terr, terr », « tsie », « kwieb »; zang: een afgewisseld, nogal welluidend, doch zwak gekweel.

N° 180 - GRIVE LITORNE

Turdus pilaris Linné. - 2/5.

Ordre PASSERIFORMES. - Famille MUSCICAPIDÆ.

Habite le nord et le centre de l'Europe et de la Sibérie, en Europe au sud jusqu'à la Pologne et l'est de l'Allemagne; hiverne dans le centre et le sud de l'Europe et le sud-ouest de l'Asie.

Niche dans les bois, dans le voisinage des plaines; fréquente beaucoup les prairies. Nid d'herbes, reliées par de la boue; 5-6 œufs, tachetés; deux nichées.

Très sociable. Se nourrit de vers, mollusques, insectes, ainsi que de fruits et de baies. Cri caractéristique: « tchac tchac tchac », ainsi que « terr terr », « tsie », « quib »; chant: un ramage varié, assez musical, mais faible et sans vigueur.

181. - *Turdus viscivorus viscivorus* Linné



Grote Lijster - Grive draine

182. - 1. *Turdus ericetorum ericetorum* Turton
2. *Turdus ericetorum philomelus* Brehm



1. Westelijke Zanglijster - Grive musicienne occidentale
2. Noordelijke Zanglijster - Grive musicienne du Nord

N° 181 - GROTE LIJSTER

Turdus viscivorus viscivorus Linné. - 1/3.

Orde PASSERIFORMES. - Familie MUSCICAPIDÆ.

Plant zich voort in het Noorden en het midden van Europa, in het Zuiden van Europa alleen op de bergen, in het Oosten tot het Westen van Siberië. Overwintert in de streken van de Middellandse zee. Een verwante ondersoort bewoont de bergen van het Noorden van Afrika en een andere de bergen van het midden van Azië.

Bezoekt beboste streken; nestelt op een zekere hoogte op de bomen; nest van mos en gras verbonden met aardemortel, van binnen fijn gras, soms wol; 4 gevlekte eieren; twee broedsels.

Voedsel : wormen, weekdieren, vruchten en bessen. Hese en harde schreeuw : « tjerrrr », nog « tuktuktuk », « sieh »; zang : korte zin en gefloten, doch weinig afgewisselde tonen.

N° 181 - GRIVE DRAINE

Turdus viscivorus viscivorus Linné. - 1/3.

Ordre PASSERIFORMES. - Familie MUSCICAPIDÆ.

Se reproduit dans le nord et le centre de l'Europe, au sud de l'Europe seulement sur les montagnes, à l'est jusqu'à l'ouest de la Sibérie. Hiverné dans les régions méditerranéennes. Une sous-espèce voisine habite les montagnes du nord de l'Afrique et une autre les montagnes du centre de l'Asie.

Fréquente les régions boisées; niche à une certaine hauteur sur les arbres; nid de mousse et herbes solidifiées avec du mortier de terre, tapissé d'herbes fines, parfois de laine; 4 œufs, tachetés; deux nichées.

Nourriture : vers, mollusques, fruits et baies. Cri rauque et dur : « tcherrrr » et encore « tuctuctuc », « sieh »; chant : courtes phrases et notes flûtées, mais peu variées.

N° 182 - WESTELIJKE ZANGLIJSTER

Turdus ericetorum ericetorum Turton. - 2/5.

Orde PASSERIFORMES. - Familie MUSCICAPIDÆ.

Bewoont Groot-Britannië, het Westen en het Noorden van Frankrijk, België, Holland. Overwintert in Frankrijk en in Spanje. Een klein aantal van onze zanglijsters zijn standvogels.

Bewoont de bossen, parken, wouden met onderhout. Sedert enige tijd zelfs de steden. Nest in de struiken gebouwd bij middel van mos en gras, met van binnen een gladde laag gevormd van vermolmd hout en speeksel; 4-5 blauwe eieren met zwarte punten bezaaid; twee of drie broedsels.

Voedt zich met wormen, weekdieren, vruchten en bessen. Fijne en zwakke roep : « pits », « tsip », in toorn : « dak dak » of « dek dek »; krachtige luide en heldere zang bestaande uit herhaalde, afgewisselde, zeer welklinkende en aangename toonsneden. Vermaard onder onze beste zangers.

NOORDELIJKE ZANGLIJSTER

Turdus ericetorum philomelus Brehm. - 2/5.

Bewoont Europa, buiten het Westen, het hoge Noorden en het uiterste Zuiden; in Azië, de streken van het Westen en van het Zuid-Westen. Overwintert in de streken van de Middellandse zee, het Noorden van Afrika en het Zuid-Westen van Azië. Gemeen in België bij de doortrek van de herfst en van de lente.

Verschilt van het inlands ras door de kleuren van de bovendelen, die minder rosachtig, meer olijfgroen zijn, en door de wittere onderdelen, een minder geelachtige blekere borst.

N° 182 - GRIVE MUSICIENNE OCCIDENTALE

Turdus ericetorum ericetorum Turton. - 2/5.

Ordre PASSERIFORMES. - Familie MUSCICAPIDÆ

Habite la Grande-Bretagne, l'ouest et le nord de la France, la Belgique, la Hollande. Hiverné en France et en Espagne. Un petit nombre de nos oiseaux est sédentaire.

Habite les bois, parcs, forêts avec sous-bois. Depuis quelque temps même dans les villes. Nid construit dans les buissons au moyen de mousse et d'herbes, la coupe enduite d'une couche lisse formée de bois vermoulu et de salive; 4-5 œufs, bleus, parsemés de points noirs; deux ou trois nichées.

Se nourrit de vers, mollusques, insectes, de fruits et de baies. Cri fin et faible : « pits », « tsip », en colère « dak dak » ou « dek dek »; chant vigoureux, haut et clair, composé de motifs répétés, variés, très mélodieux et agréables. Réputé parmi nos meilleurs chanteurs.

GRIVE MUSICIENNE DU NORD

Turdus ericetorum philomelus Brehm. - 2/5.

Habite l'Europe, excepté l'ouest, le haut nord et l'extrême sud; en Asie, les régions de l'ouest et du sud-ouest. Hiverné dans les régions méditerranéennes, le nord de l'Afrique et le sud-ouest de l'Asie. Commun en Belgique aux passages de l'automne et du printemps.

Diffère de la race géographique indigène par les couleurs des parties supérieures, qui sont moins roussâtres, plus vert olive, et les parties inférieures plus blanchâtres. la poitrine moins jaunâtre, plus claire.



Koperwieklijster - Grive mauvis

N° 183 - KOPERWIEKLIJSTER

Turdus musicus musicus Linné. - 2/5.

Orde PASSERIFORMES. - Familie MUSCICAPIDÆ.

Nestelt in het Noorden van Europa en Azië. In Europa, in het Zuiden tot de breedte der Baltische landen. Overwintert in het Zuiden van Europa en in het Zuid-Westen van Azië. Trekt door België, doch in milde winters verblijven een zeker aantal in het lage land.

Bewoont de wouden met hakhout en struiken, tot aan de boomgrens. Zij bouwt een nest uit takjes, grasstengels, mos, verbonden met beslagen aarde; van binnen fijn gras; 5-6 gevlekte eieren; twee broedsels.

Voedt zich met kerfdieren, wormen, weekdieren, alsook met verscheidene bessen.

Sterkere en langere roep dan bij de Zanglijster : « tsiek », « tjittik », in toorn : « tek tek » of « terr terr »; zang : een lang zwak, maar weinig afgewisseld gebabbel, zachte klank, vrij aangenaam, vooral in bende uitgebracht.

N° 183 - GRIVE MAUVIS

Turdus musicus musicus Linné. - 2/5.

Ordre PASSERIFORMES. - Familie MUSCICAPIDÆ.

Niche dans le nord de l'Europe et de l'Asie. En Europe, au sud jusqu'à la latitude des Pays Baltes. Hiverne au sud de l'Europe et au sud-ouest de l'Asie. Traverse la Belgique lors des migrations, mais par hivers cléments un certain nombre séjournent dans le bas pays.

Habite les forêts avec taillis et buissons, jusqu'à la limite des arbres. Il construit un nid de brindilles, tiges d'herbes, mousse, reliées avec de la terre gâchée, intérieur tapissé d'herbes fines; 5-6 œufs, tachetés; deux nichées.

Se nourrit d'insectes, vers, mollusques, ainsi que de différentes baies. Cri plus fort et plus allongé que chez la Grive musicienne : « tsic », « tchittic », en colère « tek tek » ou « terr terr »; chant : un faible ramage prolongé mais peu varié, ton doux, assez agréable, surtout émis en bande.



Swainson's Dwerqlijster - Petite Grive de Swainson

N° 184 - SWAINSON'S DWERGLIJSTER

Turdus ustulatus swainsoni Tschudi. - 3/5.

Orde PASSERIFORMES. - Familie MUSCICAPIDÆ.

Vogel van het Westen van Noord-Amerika, overwintert in Midden-Amerika en in het Noorden van Zuid-Amerika. Bezoekt België bij uitzondering.

Houdt zich op in dichte struiken, is zeer vreesachtig en schuw. Nestelt op mensenhooft in het hakhout; nest gebouwd uit droog gras en mos, met van binnen worteltjes; 4 bleek-groenblauwe, bruin gevlekte eieren; één legsel.

Roep : « kwiep », « gwaïet », « tjoek »; rijke en zeer aangename zang, bestaande uit gebonden en welluidende tonen.

N° 184 - PETITE GRIVE DE SWAINSON

Turdus ustulatus swainsoni Tschudi. - 3/5.

Ordre PASSERIFORMES. - Familie MUSCICAPIDÆ.

Oiseau de l'ouest de l'Amérique du Nord, hiverne en Amérique centrale et dans le nord de l'Amérique du Sud. Visiteur exceptionnel en Belgique. Se tient dans les buissons épais, est très peureux et farouche. Niche à hauteur d'homme dans les taillis; nid construit d'herbes sèches et de mousse, intérieur garni de racelles; 4 œufs, bleu verdâtre pâle, tachetés de brun; une ponte.

Cris : « quiep », « huaït », « tchouc »; chant riche et très agréable, composé de notes liées et mélodieuses.

185. - *Turdus obscurus* Gmelin



Vale Lijster - Grive pâle

N° 185 - VALE LIJSTER

Turdus obscurus Gmelin. - 1/2.

Orde PASSERIFORMES. - Famille MUSCICAPIDÆ.

Bewoont Siberië, van de Ienisseï tot het uiteinde van Azië. Trekt door China naar het Zuid-Oosten van Azië en de eilanden van Maleisië. Verdwaalt soms in Europa, zelden in België.

Leeft in de bossen, vooral de wouden van naaldbomen in de bergen; nest vrij hoog geplaatst, gemaakt met gras dat verbonden is met vochtige aarde en van binnen met fijn gras gevoerd; 4-5 gevlekte eieren; waarschijnlijk één broedsel.

Eet wormen, slakken, kerfdieren, evenals verschillende bessen. Zang : schoon, klaar, gefloten, maar kort en weinig afgewisseld.

N° 185 - GRIVE PALE

Turdus obscurus Gmelin. - 1/2.

Ordre PASSERIFORMES. - Famille MUSCICAPIDÆ.

Habite la Sibérie, de l'Iénisséï à l'extrémité de l'Asie. Emigre à travers la Chine vers le sud-est de l'Asie et les îles de la Malaisie. S'égare parfois en Europe, rarement en Belgique.

Vit dans les forêts, principalement les bois de conifères des montagnes; nid posé assez haut, formé d'herbes reliées de terre humide et intérieurement tapissé de fines herbes; 4-5 œufs, tachetés; probablement une nichée. Mange des vers, limaces, insectes, ainsi que différentes baies. Chant : beau, clair, flûté, mais court et peu varié.

186. - *Turdus naumanni eunomus* Temminck



Rosvleugellijster - Grive à ailes rouges

N° 186 - ROSVLEUGELLIJSTER

Turdus naumanni eunomus Temminck. - 3/7.

Orde PASSERIFORMES. - Famille MUSCICAPIDÆ.

Plant zich voort in het Oosten van Siberië vanaf de vallei van de Lena; overwintert naar het Zuiden in Midden-Azië; bezoekt zelden Europa, bij uitzondering in België.

Leeft op de randen der wouden op open plaatsen met struiken en kleine bossen. Zeer wild; vergadert in benden buiten de paartijd. Nest op de grond of laag in de struiken, vervaardigd met mos en gras; 5 gevlekte eieren.

Voedsel : wormen en kerfdieren, bessen, vooral van de jeneverboom. Roep gelijkende op die van de Koperwieklijster; zingt ook dikwijls in benden en vormt alzo een mengsel van sterke en afgewisselde tonen.

N° 186 - GRIVE A AILES ROUSSES

Turdus naumanni eunomus Temminck. - 3/7.

Ordre PASSERIFORMES. - Famille MUSCICAPIDÆ.

Se reproduit dans l'est de la Sibérie à partir de la vallée de la Léna; hiverne vers le sud dans l'Asie moyenne; visite rarement l'Europe, exceptionnellement en Belgique.

Vit aux lisières, des forêts et dans les terrains ouverts parsemés de buissons et de petits bois. Très sauvage; se réunit en bandes en dehors de la saison de la parade. Nid à terre ou dans les buissons à peu de hauteur, composé de mousse et d'herbes; 5 œufs, tachetés.

Nourriture : vers et insectes, baies, principalement de genévrier. Cri ressemblant à celui de la Grive mauvis; chante aussi souvent en bandes, produisant un mélange de sons forts et variés.

187. - *Turdus ruficollis atrogularis* Jarocki



Zwartkeellijster - Grive à gorge noire
1 ♂ 2 ♀

N° 187 - ZWARTKEELLIJSTER

Turdus ruficollis atrogularis Jarocki. - 2/5.

Orde PASSERIFORMES. - Familie MUSCICAPIDÆ.

Bewoont het Westen van Siberië, de bekkens van de Obi en van de Ienisseï, in het Zuiden tot de bergen van Midden-Azië. Overwintert in het Zuiden van Azië. Vertoont zich soms in Europa, zelden in België. Leeft in de bossen van naaldbomen; nest staat vrij laag, gebouwd uit gras verbonden door aardemortel, langs binnen gevoerd met zacht gras; 4-6 gevlekte eieren. Voedt zich waarschijnlijk met kerfdieren, wormen en bessen. Zang in de aard van die der Zanglijster, nog meer afgewisseld en met minder herhalingen.

N° 187 - GRIVE A GORGE NOIRE

Turdus ruficollis atrogularis Jarocki. - 2/5.

Ordre PASSERIFORMES. - Famille MUSCICAPIDÆ.

Habite l'ouest de la Sibérie, les bassins de l'Obi et de l'Iénisséï, au sud jusqu'aux montagnes de l'Asie centrale. Hiverné au sud de l'Asie. Se montre parfois en Europe, rarement en Belgique. Vit dans les forêts de conifères; nid à peu de hauteur, construit d'herbes reliées par du mortier de terre, l'intérieur garni d'herbes douces; 4-6 œufs, tachetés. Se nourrit probablement d'insectes, de vers et de baies. Chant dans le genre de celui de la Grive musicienne, plus varié encore et moins de répétitions.

188. - *Turdus torquatus torquatus* Linné



Kraagmerel - Merle à plastron
1 ♂ 2 ♀

N° 188 - KRAAGMEREL

Turdus torquatus torquatus Linné. - 2/5.

Orde PASSERIFORMES. - Famille MUSCICAPIDÆ.

Nestelt in Engeland en in Scandinavië; overwintert ten Zuid-Westen van Europa en ten Noord-Westen van Afrika. Nabijstaande rassen bewonen de bergen van het midden en van het Zuiden van Europa en van het Zuid-Westen van Azië. Vertoont zich in België in de trek tijden. Zoekt de hooggelegen heide op, de beboste hellingen van heuvels en van bergen. Nestelt in de plantengroei, bij de grond; nest van takjes en gras, verbonden met vochtige aarde, binnenste van fijn gras; 4 gevlekte eieren; twee legsels. Eet kerfdieren, wormen, weekdieren, evenals vruchten en verschillende bessen. Geroep : « tek tek », « tsek tsek », « tijk tijk », « tjerr »; zang : in de aard van de Zwarte Merel en van de Grote Lijster.

N° 188 - MERLE A PLASTRON

Turdus torquatus torquatus Linné. - 2/5.

Ordre PASSERIFORMES - Famille MUSCICAPIDÆ.

Niche en Angleterre et en Scandinavie; hiverné au sud-ouest de l'Europe et au nord-ouest de l'Afrique. Des races voisines habitent les montagnes du centre et du sud de l'Europe et du sud-ouest de l'Asie. Se montre en Belgique aux époques de migration. Recherche les bruyères en altitude, les flancs boisés des collines et des montagnes. Niche dans la végétation près du sol; nid de brindilles et herbes, reliées de terre humide, intérieur garni d'herbes fines; 4 œufs, tachetés; deux nichées. Consomme des insectes, vers, mollusques, ainsi que des fruits et différentes baies. Cris : « tec tec », « tsec tsec », « tchic tchic », « tcherr »; chant : dans le genre du Merle noir et de la Grive draine.

189. - *Turdus merula merula* Linné



Zwarte Merel - Merle noir
1 ♂ 2 ♀

N° 189 - ZWARTE MEREL

Turdus merula merula Linné. - 2/5.

Orde PASSERIFORMES. - Familie MUSCICAPIDÆ.

Nestelt in Europa, buiten het hoge Noorden en het uiterste Zuiden. Overwintert in de streken van de Middellandse zee. Nabijverwante ondersoorten werden herkend in zekere eilanden en streken van het Zuiden van Europa, van het Noorden van Afrika en van het midden en het Zuiden van Azië. De Merels die in België nestelen zijn bijna alle standvogels.

Verblijft op de plaatsen waar er hagen en struiken zijn, zelfs in de steden. Zijn nest, weinig hoog geplaatst, is gebouwd met mos en gras, verbonden met aardemortel, en gevoerd met zacht gras; 4-5 gevlekte eieren; drie broedsels.

Voedsel: kerfdieren, aardwormen, weekdieren, ook vruchten en bessen. Verschillende roepgeluiden, als « tjoek », « tjewie », « tjik »; zang: gebonden afgewisselde toonsneden met een ronde gefloten, zeer aangename klank.

N° 189 - MERLE NOIR

Turdus merula merula Linné. - 2/5.

Orde PASSERIFORMES. - Familie MUSCICAPIDÆ.

Niche en Europe, excepté le haut nord et l'extrême sud. Hiverné dans les régions méditerranéennes. Des sous-espèces voisines ont été reconnues dans certaines îles et régions du sud de l'Europe, du nord de l'Afrique et du centre et du sud de l'Asie.

Les sujets nichant en Belgique sont presque tous sédentaires.

Fréquente les endroits où il y a des haies et des buissons, même dans les villes. Son nid, établi à peu de hauteur, est construit de mousse et d'herbes, consolidées de mortier de terre, l'intérieur rembourré d'herbes molles; 4-5 œufs, tachetés; trois nichées.

Nourriture: insectes, vers de terre, mollusques, puis des fruits, des baies. Cris divers, comme « tchouc », « tchewie », « tchic »; chant: strophes liées, variées sur un timbre rond et flûté, fort agréable.

190. - *Prunella collaris collaris* (Scopoli)



Alpenhaagmus - Accenteur alpin

N° 190 - ALPENHAAGMUS

Prunella collaris collaris (Scopoli). - 1/2.

Orde PASSERIFORMES. - Familie PRUNELLIDÆ.

Bewoont de gebergten van het midden en het Zuiden van Europa en het Noorden van Afrika. In de Balkans en in Azië bevinden zich andere gewestelijke rassen. Bezoekt België bij uitzondering.

Bewoont de rotsige plaatsen met kreupelhout, naar de boomgrens; daalt lager in de winter.

Nestelt in de rotsspleten tussen de stenen, onder een struik planten of een tak van een naaldboom; nest zorgvuldig gebouwd uit stengels en wortels van alpenplanten, mos, korstmos, haar en pluimen; 3-4 bleekblauwe eieren zonder vlekken; twee broedsels.

Voedt zich vooral met kerfdieren in de zomer, met zaden en bessen in de winter. Roepen: « tjirriririp », « tjeurp », « djem », « truwie »; zang overtreft die van onze Haagmus: muzikaler, afgewisselder, meer aangehouden.

N° 190 - ACCENTEUR ALPIN

Prunella collaris collaris (Scopoli). - 1/2.

Orde PASSERIFORMES. - Familie PRUNELLIDÆ.

Habite les massifs montagneux du centre et du sud de l'Europe et du nord de l'Afrique. Aux Balkans et en Asie se trouvent d'autres races géographiques. Visiteur exceptionnel en Belgique.

Fréquente les endroits rocheux, avec broussailles, vers la limite des arbres; descend plus bas en hiver.

Niche dans des fentes de rochers, entre les pierres, sous une touffe de végétation ou une branche de conifère; nid soigneusement construit de tiges et racines de plantes alpestres, de mousse, lichens, poils et plumes; 3-4 œufs, bleu pâle, sans taches; deux nichées.

Se nourrit surtout d'insectes en été, de graines et baies en hiver. Cris: « tchirriririp », « tcheurp », « djem », « truï »; chant supérieur à celui de notre Accenteur: plus musical, plus varié, plus soutenu.

191. - *Monticola saxatilis* (Linné)

Hub. Dupond



Rotsmerel - Monticole de roche

1 ♂ 2 ♀

N° 191 - ROTSMEREL

Monticola saxatilis (Linné). - 2/5.

Ordre PASSERIFORMES. - Famille MUSCICAPIDÆ.

Bewoont de bergen van het midden en van het Zuiden van Europa en van het midden van Azië; overwintert in de keerkringstreken van Afrika, ten Noorden van Hindoestan en ten Zuiden van China. Bezoekt toevallig België.

Wild en schuw. Houdt zich op rotsige plaatsen met arme plantengroei. Nest in rotsholte, vervaardigd van mos, gras, gevoerd met worteltjes en zacht gras; 4-5 bleekblauwe eieren, licht gestippeld; één, misschien twee broedsels.

Eet uitsluitend kerfdieren. Roep : « tak tak », « fied »; zang : gefloten, vol en zeer aangenaam gekweel.

N° 191 - MONTICOLE DE ROCHE

Monticola saxatilis (Linné). - 2/5.

Ordre PASSERIFORMES. - Famille MUSCICAPIDÆ.

Habite les montagnes du centre et du sud de l'Europe et du centre de l'Asie; hiverne en Afrique tropicale, au nord de l'Hindoustan et au sud de la Chine. Visiteur accidentel en Belgique.

Sauvage et farouche. Se tient aux endroits rocheux avec pauvre végétation. Nid dans trou de rocher, formé de mousse, herbes, intérieur de radicelles et herbes molles; 4-5 œufs, bleu pâle, légèrement pointillés; une, peut-être deux nichées.

Régime exclusivement insectivore. Cri : « tac tac », « fid »; chant : gazouillement flûté, moelleux, très agréable.

192. - *Monticola solitarius solitarius* (Linné)

Hub. Dupond



Blauwe Rotsmerel - Monticole bleu

1 ♂ 2 ♀

N° 192 - BLAUWE ROTSMEREL

Monticola solitarius solitarius (Linné). - 1/2.

Ordre PASSERIFORMES. - Famille MUSCICAPIDÆ.

Bewoont de bergen van Midden- en Zuid-Europa, het Noorden van Afrika en het Zuid-Westen van Azië. Bezoekt België bij uitzondering.

Houdt zich op rotsige plaatsen. Nestelt in de rotsholten; nest van gras en mos, met van binnen worteltjes en fijn gras; 4-5 bleekblauwe gestippelde eieren; één broedsel.

Wilde en eenzame vogel. Uitsluitend kerfdieretend. Roep : « tek tek »; schetterende zang : mengsel van liefelijke, zachte en harde, gebonden klanken die lange weinig afgewisselde toonsneden vormen.

N° 192 - MONTICOLE BLEU

Monticola solitarius solitarius (Linné). - 1/2.

Ordre PASSERIFORMES. - Famille MUSCICAPIDÆ.

Habite les montagnes de l'Europe centrale et méridionale, le nord de l'Afrique et le sud-ouest de l'Asie. Visiteur exceptionnel en Belgique.

Se tient dans les endroits rocheux. Niche dans des cavités de rochers; nid d'herbes et de mousse, intérieur de radicelles et d'herbes fines; 4-5 œufs bleu pâle, ponctués; une nichée.

Oiseau sauvage et solitaire. Exclusivement insectivore. Cri : « tec tec »; chant retentissant : mélange de sons flûtés, doux et durs, liés, formant de longues strophes peu variées.

193. - *Cinclus cinclus aquaticus* Bechstein



Waterspreeuw - Cincle plongeur

N° 193 - WATERSPREEUW

Cinclus cinclus aquaticus Bechstein. - 1/2.

Orde PASSERIFORMES. - Familie TROGLODYTIDÆ.

Bewoont Duitsland, buiten het Noorden, België en het heuvelachtig Zuiden van Nederland, Frankrijk, met uitzondering van het Zuid-Westen. Andere ondersoorten bewonen andere streken in Europa, Afrika en Azië. Standvogel of zwerver op korte afstand.

Bezoekt de stromen en waterlopen van de bergen. Nestelt onder een of andere beschutting : brug, muurgat, rotsuitstek, enz.; nest in vorm van dikke bol met zijdelingse opening, gebouwd uit mos met grasstengels vermengd; van binnen verdorde bladeren; 5-6 zuiverwitte eieren; twee broedsels.

Voedt zich met kerfdieren, schaaldieren, kleine weekdieren, al duikend gevangen terwijl hij op de bodem onder water voortgaat. Roepen : « tsit tsit tsit », « tsiet », « tserp », « klink »; zang : een gekweel van zachte, vloeiende en aangename tonen.

N° 193 - CINCLE PLONGEUR

Cinclus cinclus aquaticus Bechstein. - 1/2.

Ordre PASSERIFORMES. - Famille TROGLODYTIDÆ.

Habite l'Allemagne, excepté le nord, la Belgique et le sud vallonné des Pays-Bas, la France, sauf le sud-ouest. D'autres sous-espèces habitent d'autres régions en Europe, en Afrique et en Asie. Sédentaire ou un peu errant.

Fréquente les torrents et cours d'eau des montagnes. Niche sous quelque abri : pont, trou de mur, saillie de rocher, etc.; nid en forme de grosse boule avec ouverture sur le côté, construit de mousse entremêlée de tiges d'herbes, intérieur tapissé de feuilles mortes; 5-6 œufs, blanc pur; deux nichées.

Se nourrit d'insectes, crustacés, petits mollusques capturés le plus souvent en plongeant et marchant au fond de l'eau. Cris : « tsit tsit tsit », « tsiet », « tserp », « clinnc »; chant : un gazouillis de notes douces, coulantes et agréables.

194. - *Merops apiaster* Linné



Bieënsnapper - Guêpier méridional

N° 194 - BIEËNSNAPPER

Merops apiaster Linné. - 1/2.

Orde CORACIIFORMES. - Familie MEROPIDÆ.

Bewoont het Noorden van Afrika, het Zuiden van Europa en het Westen van Azië. Overwintert in Afrika en in het Noord-Westen van Hindoestan. Bij uitzondering in België.

Bezoekt de wel met bomen voorziene vlakten, en de open plaatsen der bossen waar hij op een tak gaat zitten en van waar hij wegschiet om de kerfdieren in de vlucht te vangen, zoals de Zwaluwen. Gewoonlijk in kleine benden vergaderd. Nestelt in koloniën in de wanden van de zandgroeven, de doorgravingen en zelfs op de bijna vlakke gronden waar hij een gang graaft van 1 tot 2 m diep, die uitgaat op een ronde kamer welke de eieren en de jongen bevat. Geen nest; 5-6 witte eieren; één broedsel. Zeer kenschetsende roep : « gruu gruu gruu » of « kruuk kruuk », die hij vaak al vliegend slaakt en die hij herhaalt en een weinig in vorm van zang wijzigt.

N° 194 - GUEPIER MERIDIONAL

Merops apiaster Linné. - 1/2.

Ordre CORACIIFORMES. - Famille MEROPIDÆ.

Habite le nord de l'Afrique, le sud de l'Europe et l'ouest de l'Asie. Hiverne en Afrique et dans le nord-ouest de l'Hindoustan. Visiteur exceptionnel en Belgique.

Fréquente les plaines bien pourvues d'arbres et les clairières des bois où il se perche et d'où il s'élance pour chasser les insectes au vol, à la manière des Hirondelles. Généralement réuni en petites bandes. Niche en colonies dans les parois des carrières de sable, les tranchées et même dans les terrains presque plats où il se creuse un couloir de 1 à 2 m de profondeur et terminé par une chambre ronde qui contient les œufs et les jeunes. Pas de nid; 5-6 œufs, blancs; une nichée.

Cri très caractéristique : « gruu gruu gruu » ou « kruuk kruuk », qu'il pousse fréquemment en volant et qu'il répète en modifiant un peu en forme de chant.

195. - *Coracias garrulus garrulus* Linné



Scharrelaar - Rollier d'Europe

N° 195 - SCHARRELAAR

Coracias garrulus garrulus Linné. - 1/3.

Orde CORACIIFORMES. - Familie CORACIIDÆ.

Bewoont het Noord-Westen van Afrika, het Zuiden van Europa — afwezig in het Westen — het midden tot de breedte van de Bothnische golf, Rusland en het Westen van Azië. Overwintert in de keerkringstreken en het Zuiden van Afrika. Bezoekt toevallig België.

Vogel van de wouden en bossen, woont in boomholten, soms in een oude muur of een andere holte. Nest afwezig of soms een weinig gras, haar, pluimen; 4-5 witte eieren; één broedsel.

Voedt zich met kerfdieren, meest op de grond gevangen, evenals met vruchten in de herfst. Hese schreeuw: « rakk » of « kraah », die hij meermaals herhaalt in vorm van zang.

N° 195 - ROLLIER D'EUROPE

Coracias garrulus garrulus Linné. - 1-3.

Orde CORACIIFORMES. - Familie CORACIIDÆ.

Habite le nord-ouest de l'Afrique, le sud de l'Europe, — absent à l'ouest — le centre jusqu'à la latitude du golfe de Bothnie, la Russie et l'ouest de l'Asie. Hiverné en Afrique tropicale et méridionale. Visite accidentellement la Belgique.

Oiseau des bois et forêts, se loge dans les trous d'arbres, parfois dans un vieux mur ou autre cavité. Nid absent ou parfois quelques herbes, poils, plumes; 4-5 œufs, blancs; une nichée.

Se nourrit d'insectes, le plus souvent pris à terre, ainsi que de fruits en automne. Cri rauque: « rack », ou « kraah », qu'il répète plusieurs fois en guise de chant.

196. - *Alcedo atthis ispida* Linné



Ijsvogel - Martin-pêcheur d'Europe

N° 196 - IJSVOGEL

Alcedo atthis ispida Linné. - 1/2.

Orde CORACIIFORMES. - Familie ALCEDINIDÆ.

Bewoont Europa vanaf het midden van Scandinavië en de breedte van Leningrad, in het Zuiden tot de noordelijke oever van de Middellandse Zee. Door andere vormen vervangen in het Noord-Westen van Afrika, het uiterste Zuiden en het Zuid-Oosten van Europa. Is eerder zwerver dan trekker; sommige vogels nochtans verwijderen zich vrij ver naar het Zuiden.

Bezoekt alle soorten water en nestelt in de omgeving, waar hij in een rivieroever of in een helling een gang graaft van 50 tot 90 cm diep, uitgaande op een kamer waar de 6-7 witte eieren op de naakte grond gelegd worden. Twee legfels.

Voedt zich met kleine vissen, bij de oppervlakte ontdekt en al duikend gevangen; ook met kleine schaaldieren en waterinsecten. De roep is schel en slepend: « tiet tiet tiet »; de zang is een zacht trillen van kleine stemgeluiden op afgewisselde tonen aaneengeschakeld.

N° 196 - MARTIN-PECHEUR D'EUROPE

Alcedo atthis ispida Linné. - 1-2.

Orde CORACIIFORMES. - Familie ALCEDINIDÆ.

Habite l'Europe depuis le milieu de la Scandinavie et la latitude de Leningrad, au sud jusqu'au rivage nord de la Méditerranée. Remplacé par d'autres formes dans le nord-ouest de l'Afrique, l'extrême sud et le sud-est de l'Europe. Est plutôt errant que migrateur; certains sujets, cependant, se rendent assez loin vers le sud.

Fréquente toutes espèces d'eaux et niche dans le voisinage, où il se creuse, dans les berges ou un talus, un couloir de 50 à 90 cm de profondeur, aboutissant à une chambre où les 6-7 œufs blancs sont déposés sur le sol nu. Deux pontes.

Se nourrit de petits poissons, aperçus à la surface et capturés en plongeant; également de petits crustacés et insectes aquatiques. Le cri est grêle et traînant: « tiet tiet tiet »; le chant est un doux trille de petits cris modulés sur des tons variés.

197. - *Columba livia livia* Gmelin



Rotsduif - Pigeon biset

N° 197 - ROTSDUIF

Columba livia livia Gmelin. - 1/4.

Orde COLUMBIFORMES. - Famille COLUMBIDÆ.

Woont plaatselijk op de westelijke kusten van Europa en de kusten van de Middellandse Zee, evenals op de eilanden van deze streken. Andere ondersoorten bevinden zich in het Zuid-Westen van Azië en in verscheidene streken van Afrika.

Zoekt de wildste rotsige plaatsen op, waar zij in de door de zee uitgeholde spleten en grotten gunstige plaatsen vindt om haar nest te vestigen. Dit bestaat uit een licht hoopje twijgjes en is soms zeer diep in de grotten gelegen; 2 witte eieren; twee of drie broedsels.

Voedt zich met gekweekte en wilde zaden die zij op het binnenland verzamelt, bij gelegenheid met enige kleine weekdieren. Stem: « koe koe roe koe koe », als het kirren van de huisduif, die van haar afstamt. Zeer gezellig. De Rotsduiven die men ziet nestelen in de rotsen van de Maas-streek, in België, zijn zeer waarschijnlijk vogels die afstammen van tot de wilde staat teruggekeerde huisduiven; enige andere zijn uit de gevangenschap ontsnapt en komen voort van een nabije kwekerij van Rotsduiven die onlangs ingevoerd werden voor de duivenschietingen.

N° 197 - PIGEON BISET

Columba livia livia Gmelin. - 1-4.

Orde COLUMBIFORMES. - Famille COLUMBIDÆ.

Habite localement les côtes occidentales de l'Europe et les côtes de la mer Méditerranée ainsi que des îles de ces régions. D'autres sous-espèces se trouvent dans le sud-ouest de l'Asie et dans diverses contrées de l'Afrique.

Recherche les endroits rocheux les plus sauvages, où il trouve, dans les crevasses et les grottes excavées par la mer, des places favorables pour poser son nid. Celui-ci, établi parfois fort profondément dans les cavernes, ne consiste qu'en un léger tas de brindilles; 2 œufs, blancs; deux ou trois nichées.

Se nourrit de grains cultivés et de graines sauvages cherchés à l'intérieur des terres, occasionnellement de quelques petits mollusques. Voix: « cou cou rou cou cou », comme le roucoulement du pigeon domestique, dont il est l'ancêtre. Très sociable. Les exemplaires qu'on observe nichant dans les rochers de la région de la Meuse, en Belgique, sont très probablement des individus descendant de pigeons domestiques retournés à l'état sauvage; quelques autres sont des échappés de captivité provenant d'un élevage voisin de Bisets importés récemment pour les tirs aux pigeons.

198. - *Columba ænas ænas* Linné



Holduif - Pigeon colombin

N° 198 - HOLDUIF

Columba ænas ænas Linné. - 1/4.

Orde COLUMBIFORMES. - Famille COLUMBIDÆ.

Bewoont Europa, het Westen en het midden van Azië tot de 60e breedtegraad. De bewoners van het Noorden overwinteren in het Zuiden tot het Noorden van Afrika. Twee of drie andere gewestelijke vormen werden voor gematigd Azië beschreven.

Verkeert bij voorkeur in beboste streken met oude bomen. Nestelt in de boomholten; stelt zich ook tevreden met een konijnenhol op de helling der heuvels of met een holte gevormd in klimop of een andere dichte plant. Nest bestaande uit enige twijgjes; 2 witte eieren; twee, soms drie broedsels.

Voedt zich met zaden, gras en weke plantdelen, bij gelegenheid met kleine weekdieren. Stem: « hoe hoe hoe », of « koe-hoep » herhaald. Zeer gezellig.

Vroeger uiterst zeldzaam in België; thans vrij gemeen, doch plaatselijk. Schijnt de Zwarte Specht gevolgd te hebben in zijn vooruitgang naar het Westen, en zijn holten voor het nestelen benuttigd te hebben.

N° 198 - PIGEON COLOMBIN

Columba ænas ænas Linné. - 1/4.

Orde COLUMBIFORMES. - Famille COLUMBIDÆ.

Habite l'Europe, l'ouest et le centre de l'Asie jusqu'au 60° degré de latitude. Les habitants du nord hivernent au sud jusqu'au nord de l'Afrique. Deux ou trois autres formes géographiques sont décrites de l'Asie tempérée.

Fréquente les régions de préférence boisées avec vieux arbres. Niche dans les cavités d'arbres; à défaut, se contente d'un terrier de lapin sur le flanc des collines ou d'un trou formé dans le lierre ou autre dense végétal. Nid constitué par quelques brindilles; 2 œufs, blancs; deux, parfois trois nichées.

Se nourrit de grains, graines, d'herbes et parties molles des plantes, occasionnellement de petits mollusques. Voix: « ghou ghou ghou » ou « cou-houp » répétés. Très sociable.

Jadis extrêmement rare en Belgique; actuellement assez commun, mais local. Paraît avoir suivi le Pic noir dans son avance vers l'ouest, utilisant ses trous pour la nidification.

199. - *Columba palumbus palumbus* Linné



Woudduif - Pigeon ramier

N° 199 - WOUDDUIF

Columba palumbus palumbus Linné. - 1/5.

Orde COLUMBIFORMES. - Famille COLUMBIDÆ.

Bewoont Europa en het Zuid-Westen van Azië tot Perzië. Andere gewestelijke vormen werden in Azië en Afrika waargenomen.

Leeft in de beboste streken, waar zij op de bomen nestelt; bij gebrek aan bomen bouwt ook haar nest in de struiken, zelfs op de grond. Is in enige steden vertrouwelijk geworden. Het nest bestaat uit enige takjes waarop de 2 witte eieren rusten; twee, dikwijls drie broedsels.

Voedt zich met graan en zaden, gras, bladeren van klaver en andere planten; in de winter met beukenoten, eikels, ahornvruchten, enz.; stelt zich bij sneeuwweide tevreden met raap- en koolbladeren. Zeer gezellig; vergaderen na de voortplanting in grote benden: een gedeelte gaat overwinteren in de streken van de Middellandse Zee; de andere zwerven op zoek naar voedsel. Stem: « koer koerr koerkoerr ». De Duiven en de Tortels zijn een uitstekend wild.

N° 199 - PIGEON RAMIER

Columba palumbus palumbus Linné. - 1/5.

Ordre COLUMBIFORMES. - Famille COLUMBIDÆ.

Habite l'Europe et le sud-ouest de l'Asie jusqu'à la Perse. D'autres races géographiques ont été constatées en Asie et en Afrique.

Vit dans les régions boisées, où il niche sur les arbres; à défaut d'arbres, construit son nid dans les buissons, même à terre. S'est familiarisé dans quelques villes. Le nid se compose de quelques branchettes sur lesquelles reposent les 2 œufs, blancs; deux, souvent trois nichées.

Se nourrit de grains et de graines, herbes, feuilles de trèfle et autres plantes; en hiver, les faines, glands, fruits d'érable, etc., constituent une importante ressource; en temps de neige, se contente de feuilles de navet et de choux. Très sociable; après la reproduction, se réunissent en grandes troupes: une partie se rend hiverner dans les régions de la Méditerranée, les autres errent à la recherche de nourriture. Voix: « cour courrrr courcourr ». Les Pigeons et les Tourterelles sont un excellent gibier.

200. - *Streptopelia turtur turtur* (Linné)



Tortelduif - Tourterelle des bois

N° 200 - TORTELDUIF

Streptopelia turtur turtur (Linné). - 1/3.

Orde COLUMBIFORMES. - Famille COLUMBIDÆ.

Bewoont Europa vanaf de breedte van het Zuiden van Scandinavië tot de Middellandse Zee en het Westen van Azië; overwintert in het Noorden van Afrika en het Zuid-Westen van Azië.

Zoekt de beboste streken op, of de landerijen met kleine bosjes voorzien, waar zij op kleine hoogte nestelt. Nest bestaande uit enige twijgjes, waar men de 2 witte eieren kan door zien; dikwijls twee broedsels.

Voedt zich met alle soorten zaden van gekweekte of wilde planten; voegt er soms gras en malse bladeren bij. Wordt doorgaans bij paren ontmoet. Komt laat in de lente aan en vertrekt vroeg op het einde van de zomer om in Afrika te gaan overwinteren. Stem: « toerr-toerrr-toerrr », verscheidene malen herhaald.

N° 200 - TOURTERELLE DES BOIS

Streptopelia turtur turtur (Linné). - 1/3.

Ordre COLUMBIFORMES. - Famille COLUMBIDÆ.

Habite l'Europe depuis la latitude du sud de la Scandinavie jusqu'à la Méditerranée et l'ouest de l'Asie; hiverne dans le nord de l'Afrique et le sud-ouest de l'Asie.

Recherche les régions boisées ou pourvues de bosquets, où il niche à faible hauteur. Nid composé de quelques brindilles à travers lesquelles on peut voir les 2 œufs, blancs; souvent deux nichées.

Se nourrit de toutes espèces de graines de plantes cultivées ou sauvages; y ajoute parfois quelques herbes et feuilles tendres. Se remarque généralement par couples. Arrive tard au printemps et repart tôt à la fin de l'été pour aller hiverner en Afrique. Voix: « tourrr tourrrr tourrr » plusieurs fois répétés.

201. - *Corvus corax corax* Linné



Raaf - Grand Corbeau

N° 201 - RAAF

Corvus corax corax Linné. - 1/6.

Orde PASSERIFORMES. - Famille CORVIDÆ.

Bewoont bijna heel Europa, het Noorden van Azië en van Amerika. In België nestelden de laatste paren omstreeks 1865; vertoont zich sindsdien slechts onregelmatig hier en daar in het land, vooral in Hoog-België. Allesetend, leeft vooral van krengen, doch valt ook zwakke prooien aan die zich niet kunnen verdedigen. De paren blijven voor het leven samen. Nestelt in bomen en rotsen; nest van dunne takken, verstevigd met aardemortel, haar, wol; 4-6 eieren, gevlekt. Standvogel, uitgenomen in het hoge Noorden. Schreeuwen : een diep « kraag kraag » en « korronk korronk ».

N° 201 - GRAND CORBEAU

Corvus corax corax Linné. - 1/6.

Ordre PASSERIFORMES. - Famille CORVIDÆ.

Habite à peu près toute l'Europe, le nord de l'Asie et de l'Amérique. En Belgique les derniers couples ont niché vers 1865; depuis lors ne se montre plus qu'irrégulièrement çà et là dans le pays, surtout en Haute-Belgique. Omnivore, vit surtout de charognes, mais s'attaque aussi aux proies faibles et sans défense. Les couples restent unis pour la vie. Niche dans arbres et rochers; nid de branches minces, consolidées de mortier de terre, intérieur de mousse, poils, laine; 4-6 œufs, tachetés. Sédentaire, sauf dans le haut nord. Cri : un profond « craagh craagh » et « corronk corronk ».

202. - *Corvus cornix cornix* Linné



Bonte Kraai - Corbeau mantelé

N° 202 - BONTE KRAAI

Corvus cornix cornix Linné. - 1/5

Orde PASSERIFORMES. - Famille CORVIDÆ.

Bewoont Ierland, Schotland, de Hebriden- en Færoë-eilanden, Scandinavië, het Oosten van Duitsland vanaf de Elbe, Oostenrijk, Italië en meer naar het Oosten van deze landen in heel Europa. Trekt in de winter naar het Westen van Europa. In België, vooral talrijk in de lage streken van het land. Allesetend, met inbegrip van mest en uitwerpselen in tijd van schaarste. Kiest een dicht bos als slaapplek en begeeft er zich iedere avond naar toe, soms van heel ver. Zekere vogelkundigen beschouwen ze als een ondersoort van *Corvus corone*, met welke zij soms paart. Nestelt op de bomen, nest van takjes met aarde vermengd, gevoerd met haar, wol; 4-6 eieren, blauwgroen, gevlekt; één broedsel. Stem : een hees « krei » of « kroag » « kraah ».

N° 202 - CORBEAU MANTELE

Corvus cornix cornix Linné. - 1/5.

Ordre PASSERIFORMES. - Famille CORVIDÆ.

Habite l'Irlande, l'Ecosse, les îles Hébrides et Færoë, la Scandinavie, l'est de l'Allemagne à partir de l'Elbe, l'Autriche, l'Italie et plus à l'est de ces pays dans toute l'Europe. En hiver émigre vers l'ouest de l'Europe. En Belgique, alors nombreux surtout dans les régions basses du pays. Omnivore, y compris du fumier et des excréments en temps de disette. Se choisit un bois épais comme dortoir et s'y rend tous les soirs, parfois de fort loin. Certains ornithologues le considèrent comme sous-espèce de *Corvus corone*, avec lequel il s'apparie parfois. Niche sur les arbres, nid de branchettes mêlées de terre, intérieur fourré de poils, laine; 4-6 œufs, vert bleuâtre, tachetés; une nichée. Voix : un rauque « krai » ou « croag », « craah ».

203. - *Corvus corone corone* Linné



Zwarte Kraai - Corbeau corneille

N° 203 - ZWARTE KRAAI

Corvus corone corone Linné. - 1/6.

Orde PASSERIFORMES. - Familie CORVIDÆ.

Bewoont het Westen van Europa, ten Oosten tot aan de grens van het gebied van *Corvus cornix*. Leeft in België bij paren, bezoekt de vlakten, vooral de weiden, doch nestelt afzonderlijk in de bossen en in de boomgroepen waar zij haar nest kan verbergen. Dit wordt gebouwd met takjes, mos, droog gras, verbonden met modder, opgevuld met haar; 4-5 eieren, groenachtig, gevlekt; één legsel. Allesetend; zoekt de eieren en de jonge vogels op in de nesten. Stem : als deze van de Bonte Kraai.

N° 203 - CORBEAU CORNEILLE

Corvus corone corone Linné. - 1/6.

Ordre PASSERIFORMES. - Familie CORVIDÆ.

Habite l'ouest de l'Europe, à l'est jusqu'à la frontière de l'habitat de *Corvus cornix*. En Belgique vit par couples, fréquente les plaines, principalement les prairies, mais niche isolément dans les bois et dans les groupes d'arbres où il peut cacher son nid. Celui-ci est bâti avec branchettes, mousse, herbes sèches, reliées avec de la terre boueuse; intérieur fourré de poils; 4-5 œufs, verdâtres, tachetés; une ponte. Omnivore; recherche les œufs et jeunes oiseaux dans les nids. Voix : comme celle du Corbeau mantelé ci-dessus.

204. - *Corvus frugilegus frugilegus* Linné



Roek - Corbeau freux

1. Volwassen - Adulte - 2. Jong - Jeune

N° 204 - ROEK

Corvus frugilegus frugilegus Linné. - 1/6.

Orde PASSERIFORMES. - Familie CORVIDÆ.

Bewoont Europa, uitgenomen het Zuiden en het uiterste Noorden. In België vooral in de kleiachtige middenvlakte. Gezellig, nestelt in koloniën op grote bomen; nest van twijgjes verbonden door beslagen aarde en gevoerd met droog gras, mos, zelden haar of wol; legsel 3-5 bleekgroene gevlekte eieren. Eén broedsel. Allesetend, doch bij voorkeur dierlijk voedsel, wormen en larven. Onze inlandse Roeken zijn standvogels; in de winter komen er talrijke uit het Noorden en uit het Oosten in het land aan en verorberen veel gezaaid graan. Geschreeuw : « kaach », « kiow », « ki-oek », « kaw-kaw ».

N° 204 - CORBEAU FREUX

Corvus frugilegus frugilegus Linné. - 1/6.

Ordre PASSERIFORMES. - Familie CORVIDÆ.

Habite l'Europe sauf le sud et l'extrême nord. En Belgique surtout dans la plaine limoneuse de la Moyenne-Belgique. Sociable, niche en colonies sur de grands arbres; nid de brindilles consolidé de terre gâchée; intérieur herbes sèches, mousse, rarement avec poils ou laine; ponte 3-5 œufs, verdâtre pâle, tachetés. Une nichée. Omnivore, mais de préférence nourriture animale, vers et larves. Nos Freux indigènes sont sédentaires; en hiver de nombreux sujets du nord et de l'est arrivent dans le pays et consomment beaucoup de blé semé. Cris : « kaah », « kiow », « ki-ouk », « kaw-kaw ».

205. - *Colæus monedula spermologus* (Vieillot)



Kauw - Choucas des tours

N° 205 - KAUW

Colæus monedula spermologus (Vieillot). - 1/5.

Orde PASSERIFORMES. - Familie CORVIDÆ.

Bewoont het Noord-Westen van Afrika en het Westen van Europa tot Denemarken, ten Oosten tot Rusland. Andere gewestelijke vormen bezetten meer noordelijke en oostelijke streken.

Zeer gezellig, leeft in koloniën. De paren blijven hun heel leven bijeen. Wordt aangetroffen in de vlakten, velden en weiden; allesetend, doch vooral dierlijk voedsel. Nestelt in boomholten, hoge gebouwen, schouwen, enz., waar de op de bomen verzamelde twijgjes opgestapeld worden; 4-6 eieren, blauwgroen, gevlekt. Eén broedsel. Onze Kauwen zijn standvogels; een zeker aantal vogels van het Oosten brengen de winter bij ons door. Geroep : « tjak », « kiak », « tjak-a-tjak-a-tjak ».

N° 205 - CHOUCAS DES TOURS

Colæus monedula spermologus (Vieillot). - 1/5.

Ordre PASSERIFORMES. - Familie CORVIDÆ.

Habite le nord-ouest de l'Afrique et l'ouest de l'Europe jusqu'au Danemark, à l'est jusqu'à la Russie. D'autres formes géographiques occupent les régions plus septentrionales et orientales.

Très sociable, vit en colonies. Les couples sont unis pour la vie. Se rencontre dans les plaines, champs et prairies; omnivore, mais nourriture surtout animale. Niche dans les cavités des arbres, bâtiments élevés, cheminées, etc., où des brindilles recueillies sur les arbres sont entassées; 4-6 œufs, vert bleuâtre, tachetés; une nichée. Nos Choucas sont sédentaires; un certain nombre d'oiseaux de l'est passent l'hiver chez nous. Cris : « tchac », « kiak », « tchac-a-tchac-a-tchac ».

206. - *Pica pica galliæ* Kleinschmidt



Gallische Ekster - Pie gauloise

N° 206 - GALLISCHE EKSTER

Pica pica galliæ Kleinschmidt. - 1/4.

Orde PASSERIFORMES. - Familie CORVIDÆ.

Deze vorm bewoont Frankrijk en België; de typische vorm of andere gewestelijke vormen bezetten het overige van Europa, het Westen en het midden van Azië en het Noorden van Amerika.

Standvogel; leeft bij paren in de zomer, in kleine benden in de winter. Bouwt op de top van de grote bomen een omvangrijk nest, bedekt met een dak van vaak doornige takken, die het beschutten tegen de gevaren van boven; binnenste bezet met mortel van aarde en fijne wortels; 5-8 groenblauwe gevlekte eieren. Allesetend, doch vooral dierlijk voedsel; is belust op eieren en kuikens. Vermaard verstand. Kan de menselijke spraak naleren. Stem : « tjac », « tjakkerak », « tjaktjaktjaktjaktjak ».

N° 206 - PIE GAULOISE

Pica pica galliæ Kleinschmidt. - 1/4.

Ordre PASSERIFORMES. - Familie CORVIDÆ.

Cette forme habite la France et la Belgique; la forme type ou d'autres formes géographiques occupent le reste de l'Europe, l'ouest et le centre de l'Asie et le nord de l'Amérique.

Sédentaire; vit par couples en été, par petites bandes en hiver. Bâtit au sommet des grands arbres un nid volumineux, recouvert d'un toit de branches, souvent épineuses, qui le protègent contre les dangers d'en haut, intérieur garni de mortier de terre et de fines racines; 5-8 œufs, bleu verdâtre, tachetés. Omnivore, mais nourriture animale préférée; mangeur redoutable d'œufs et de poussins. Intelligence renommée. Peut apprendre à articuler la parole humaine. Cris : « tchac », « tchackerac », « tchac-tchactchactchactchac ».

207. - 1. *Nucifraga caryocatactes macrorhynchus* Brehm
2. *Nucifraga caryocatactes caryocatactes* (Linné)



1. Dunsnavelige Notenkraker - Casse-noix moucheté de Sibérie
2. Diksnavelige Notenkraker - Casse-noix moucheté d'Europe

208. - *Garrulus glandarius rufitergum* Hartert



Eikelgaai - Geai des chênes

N° 207 - DIKSNAVELIGE NOTENKRAKER

Nucifraga caryocatactes caryocatactes (Linné). - 1/4.

Orde PASSERIFORMES. - Familie CORVIDÆ.

Bewoont het Noord-Westen en de bergachtige gedeelten van het midden van Europa. Bezoekt België zeer zelden en onregelmatig in de herfst en in de winter.

Leeft in zijn vaderland in wouden van naaldbomen; nestelt vrij hoog in de bomen; 3-4 eieren, bleekgroen, gevlekt. Voedt zich vooral met zaden van naaldbomen, nootjes, bessen, insecten en jonge vogels. Schreeuw gelijkend op die van de Gaai : « krei, krei, krei », doch zachter; roep van het mannetje op het wijfje : een diep, kort « keur », « keur, keur, keur ».

DUNSNABELIGE NOTENKRAKER

Nucifraga caryocatactes macrorhynchus Brehm. - 1/4.

Heeft als vaderland het Noord-Oosten van Rusland en Siberië. In de winters van schaarste zwerft een groot aantal naar het Zuiden en het Westen van Europa, tot in Italië en de Pyreneeën.

Leeft in de wouden van naaldbomen, vooral daar waar de Ceder van Siberië, *Pinus cembra sibirica*, groeit, waarvan het zaad zijn voornaamste voedsel uitmaakt. Bezoekt onregelmatig België in min of meer groot getal en is tijdens vele jaren afwezig.

Verschilt van de vorige ondersoort door een langere, doch dunnere en meer puntige snavel.

N° 207 - CASSE-NOIX MOUCHETE D'EUROPE

Nucifraga caryocatactes caryocatactes (Linné). - 1/4.

Ordre PASSERIFORMES. - Famille CORVIDÆ.

Habite le nord-ouest et les parties montagneuses du centre de l'Europe. Visiteur d'automne et d'hiver très rare et irrégulier en Belgique.

Dans sa patrie vit dans les forêts de conifères; niche assez haut dans les arbres; 3-4 œufs, verdâtre pâle, tachetés. Se nourrit principalement de graines de conifères, de noisettes, de baies ainsi que d'insectes et de jeunes oiseaux. Cri analogue à celui du Geai : « krai, krai, krai », mais plus doux; appel du mâle à la femelle : un profond « keur », « keur, keur, keur ».

CASSE-NOIX MOUCHETE DE SIBERIE

Nucifraga caryocatactes macrorhynchus Brehm. - 1/4.

A pour patrie le nord-est de la Russie et la Sibérie. Les hivers de disette un grand nombre errent vers le sud et l'ouest de l'Europe, jusqu'en Italie et les Pyrénées.

Vit dans les forêts de conifères, principalement où croît le Cèdre de Sibérie, *Pinus cembra sibirica*, dont les graines constituent sa principale nourriture. Visite irrégulièrement la Belgique en plus ou moins grand nombre et absent en maintes années.

Diffère de la sous-espèce précédente par un bec plus long, mais plus mince et plus pointu.

N° 208 - EIKELGAAI

Garrulus glandarius rufitergum Hartert. - 1/4.

Orde PASSERIFORMES. - Famille CORVIDÆ.

Deze gewestelijke vorm, bij ons veelal Vlaamse Gaai genoemd, bewoont de Britse Eilanden, België en een deel van Holland.

Leeft in de wouden en de bossen bij voorkeur van bladlobbomen, waar hij tamelijk laag nestelt; 5-6 gevlekte eieren; één broedsel. Vooral plantaardig voedsel : eikels, beukennoten, hazelnoten, vruchten, bessen; verbergt een deel voor dagen van schaarste; eet ook kerfdieren, wormen, weekdieren, enz.; zoekt planmatig vogelnesten op om er de eieren en de jongen van te verslinden. Harde en onaangename stem : « rrei, rreitsch », doch laat soms in de lente een nabootsende zang horen.

N° 208 - GEAI DES CHENES

Garrulus glandarius rufitergum Hartert. - 1/4.

Ordre PASSERIFORMES. - Famille CORVIDÆ.

Cette forme géographique habite les Iles Britanniques, la Belgique et une partie de la Hollande.

Vit dans les bois et les forêts de préférence d'essences feuillues, où il niche à faible hauteur; 5-6 œufs, tachetés; une nichée. Nourriture en majeure partie végétale : glands, faines, noisettes, fruits, baies; cache une partie pour les jours de disette; mange aussi des insectes, vers, mollusques, etc., cherche méthodiquement les nids d'oiseaux pour en dévorer les œufs et les jeunes. Voix dure et désagréable : « rrai, rraitch », mais au printemps laisse parfois entendre un chant imitateur.

209. - *Plegadis falcinellus falcinellus* (Linné)



Bruine Ibis - Ibis falcinelle
1. Paarkleed - Nuptial - 2. Jongkleed - Jeune

N° 209 - BRUINE IBIS

Plegadis falcinellus falcinellus (Linné). - 1/6.

Orde CICONIIFORMES. - Familie PLEGADIDÆ.

Woont plaatselijk in Marokko, in het Zuiden en het Zuid-Oosten van Europa en vanaf Klein-Azië tot Indië. Overwintert in het midden en het Zuiden van Afrika, in de keurkinglanden van Azië. Woont nog in de evenaarstreken van Afrika en op Madagascar, evenals in het Zuid-Oosten van de Verenigde Staten van Amerika. Vertoont zich zelden in België. Zoekt de moerassen met riet op, de overstroomde gronden, modderbanken aan de monding der stromen. Zeer gezellig; nestelt in koloniën in de grote rietvelden of op de struiken die in het water groeien. Nest op de grond, bestaande uit riet; deze in de struiken zijn gebouwd met takken en twijgjes; 3-4 blauwwitte eieren; één broedsel. Voedt zich met kerfdieren, weekdieren, bloedzuigers, kikvorsen, dikkoppen, aardwormen. Zijn stem, die zelden gehoord wordt, gelijkt op het « kra-a-k » van de Kraai.

N° 209 - IBIS FALCINELLE

Plegadis falcinellus falcinellus (Linné). - 1/6.

Ordre CICONIIFORMES. - Familie PLEGADIDÆ.

Habite localement dans le Maroc, dans le sud et le sud-est de l'Europe et depuis l'Asie Mineure jusqu'aux Indes. Hiverné dans le centre et le sud de l'Afrique, en Asie tropicale. Habite encore l'Afrique équatoriale et à Madagascar ainsi qu'au sud-est des Etats-Unis d'Amérique. Se montre rarement en Belgique.

Recherche les marais avec roseaux, les terres inondées, bancs de boue à l'embouchure des fleuves. Très sociable; niche en colonies dans les massifs de roseaux ou sur les buissons croissant dans l'eau. Nid à terre, composé de roseaux, ceux dans les buissons construits de branches et de brindilles; 3-4 œufs, blanc bleuâtre; une nichée.

Se nourrit d'insectes, mollusques, sangsues, batraciens, têtards, crustacés, vers de terre. Sa voix, qu'on entend rarement, ressemble au « cra-a-k » du Corbeau.

210. - *Ardea cinerea cinerea* Linné



Blauwe Reiger - Héron cendré

N° 210 - BLAUWE REIGER

Ardea cinerea cinerea Linné. - 1/9.

Orde CICONIIFORMES. - Familie ARDEIDÆ.

Bewoont de meeste niet-bergachtige streken van Europa, van het Noorden van Afrika en het Westen van Azië. Ondersoorten worden gevonden in het Oosten van Azië en op Madagascar. De bewoners van het Noorden trekken naar het Zuiden, vooral naar Afrika.

Bezoekt de moerassige of wel van water voorziene streken. Nestelt in de grote bomen in de nabijheid van het water. Is niet gezellig, doch nestelt in dichte koloniën; nest gebouwd met ruw geschikte takken. De oude nesten worden hersteld en opnieuw bezet; 4-5 groenblauwe eieren; één broedsel.

Voedt zich voornamelijk met vissen, ook met kikvorsen, kleine zoogdieren, jonge vogels, wormen, kerfdieren. Leidt een eerder nachtelijk leven.

Zijn schreeuw klinkt « kraatsch », een andere gelijkt op « gooo ». De jongen in het nest herhalen een kenmerkend « kek kek kek... ».

N° 210 - HERON CENDRE

Ardea cinerea cinerea Linné. - 1/9.

Ordre CICONIIFORMES. - Familie ARDEIDÆ.

Habite la plupart des régions non montagneuses de l'Europe, du nord de l'Afrique et de l'ouest de l'Asie. Des sous-espèces se trouvent dans l'est de l'Asie et à Madagascar. Les habitants du nord émigrent vers le sud, notamment en Afrique.

Recherche les régions marécageuses ou bien pourvues d'eau. Niche dans les grands arbres dans le voisinage des eaux. N'est pas sociable, mais niche en colonies serrées; nid construit de branches grossièrement disposées. Les anciens nids sont réparés et réemployés; 4-5 œufs, bleu verdâtre; une nichée.

Se nourrit principalement de poissons, aussi de grenouilles, petits mammifères, jeunes oiseaux, vers, insectes. Est plutôt nocturne.

Son cri résonne comme « kraatsch », un autre cri ressemble à « gooo ». Les jeunes au nid répètent un « kek kek kek... » caractéristique.



Purperreiger - Héron pourpré
1. Volwassen - Adulte - 2. Jong - Jeune

N° 211 - PURPERREIGER

Ardea purpurea purpurea Linné. - 1/8.

Orde CICONIIFORMES. - Familie ARDEIDÆ.

Bewoont het Noorden van Afrika, het Zuiden en het midden van Europa, in het Noorden tot Holland en Duitsland, het Westen van Azië en enige streken van het midden en het Zuiden van Afrika. Andere gewestelijke rassen bevinden zich in het Oosten en het Zuiden van Azië, in Maleisië en op Madagascar.

Houdt zich op in de moerassen, overstromde gronden met rietvelden en moerasstruiken. Nestelt gewoonlijk in koloniën in de rietvelden, zelden in de bomen. Nest zonder zorg gebouwd met oude rietstengels; 4-5 bleekgroenblauwe eieren; één legsel.

Eet vissen en kleine zoogdieren, kikvorsen en hagedissen, kerfdieren en waterlarven, schaaldieren en weekdieren.

Zijn schreeuw luidt « frank », doch wordt zelden gehoord; een andere gelijkt op « koerork » of nog « schreit ».

N° 211 - HERON POURPRE

Ardea purpurea purpurea Linné. - 1-8.

Ordre CICONIIFORMES. - Famille ARDEIDÆ.

Habite le nord de l'Afrique, le sud et le centre de l'Europe, au nord jusqu'à la Hollande et l'Allemagne, l'ouest de l'Asie et quelques régions du centre et du sud de l'Afrique. D'autres races géographiques se trouvent dans l'est et le sud de l'Asie, en Malaisie et à Madagascar.

Se tient dans les marécages, terres inondées avec massifs de roseaux et buissons de marais. Niche ordinairement en colonies dans les massifs de roseaux, rarement dans des arbres. Nid construit sans soins avec de vieilles tiges de roseaux; 4-5 œufs, bleu verdâtre pâle; une ponte.

Mange des poissons et petits mammifères, grenouilles et lézards, insectes et larves aquatiques, crustacés et mollusques.

Son cri est représenté par « frank », mais s'entend rarement; un autre ressemble à « kourork » ou encore « schrait ».



Grote Zilverreiger - Grande Aigrette

N° 212 - GROTE ZILVERREIGER

Egretta alba alba (Linné). - 1/6.

Orde CICONIIFORMES. - Familie ARDEIDÆ.

Woont plaatselijk in het Zuiden van Europa, het Westen en het midden van Azië, in de landen met grote moerassen, delta's, mondingen van grote stromen. Andere gewestelijke rassen worden gevonden in Afrika en in de warme gedeelten van Azië, Australië en Amerika. Vertoont zich bij uitzondering in België.

Leeft in de moerassen, op de stranden, de slijkerige oevers der stromen en rivieren. Nestelt dikwijls in koloniën, gewoonlijk in grote rietvelden, zelden op bomen, die ten andere weinig gevonden worden op de plaatsen waar hij verkeert. Het nest is een hoop oude rietstengels; 4 bleekblauwe eieren; één broedsel.

Voedsel : vissen, kleine zoogdieren, hagedissen, kikvorsen, kerfdieren en larven, weekdieren en wormen. Zeer zwijgzame vogel; zijn schreeuw gelijkt op een zwaar en laag gekras : « rha ».

N° 212 - GRANDE AIGRETTE

Egretta alba alba (Linné). - 1/6.

Ordre CICONIIFORMES. - Famille ARDEIDÆ.

Habite localement dans le sud de l'Europe, l'ouest et le centre de l'Asie, dans les pays où se trouvent de grands marais, deltas, embouchures de grands fleuves. D'autres races géographiques se rencontrent en Afrique et dans les parties chaudes de l'Asie, de l'Australie et de l'Amérique. Se montre exceptionnellement en Belgique.

Vit dans les marais, sur les plages, les bords vaseux des fleuves et rivières. Niche souvent en colonies, ordinairement dans de vastes étendues de roseaux, rarement sur des arbres, ceux-ci étant généralement rares dans les milieux qu'elle fréquente. Le nid est un tas de vieilles tiges de roseaux; 4 œufs, bleu pâle; une nichée.

Nourriture : poissons, petits mammifères, lézards, grenouilles, insectes et larves, mollusques et vers. Oiseau très silencieux; son cri ressemble à un croassement grave et bas : « rha ».

213. - *Egretta garzetta garzetta* (Linné)



Kleine Zilverreiger - Aigrette garzette

N° 213 - KLEINE ZILVERREIGER

Egretta garzetta garzetta (Linné). - 1/6.

Orde CICONIIFORMES. - Familie ARDEIDÆ.

Woont in het Oosten, het Zuiden en het Noorden van Afrika, in het Zuiden van Europa en in gematigd Azië. Nabijstaande ondersoorten worden gevonden in Australië, Maleisië, Madagascar. De vogels die het meest ten Noorden wonen trekken naar de Middellandse Zee, het Noorden van Afrika, het Zuiden van Azië. Verdwaalt bij uitzondering in België.

Zoekt moerassen op, overstroomde gronden, slijkerige boorden van lagunen, stromen en rivieren, waar hij zich voedt met vissen, kikvorsen, schaaldieren, weekdieren, wormen, kerfdieren. Nestelt in koloniën, dikwijls in gezelschap van andere soorten Reigers, Ibis, enz.; het nest, samengesteld uit takken, rietstengels, wordt op de bomen, de struiken, zelfs op de grond tussen het riet geplaatst; 4 bleek-groenblauwe eieren; één broedsel.

Zwijgzame vogel, doch bij het nest hoort men soms « ark, or, ork » of « rrhei », met een hese stem uitgebracht.

N° 213 - AIGRETTE GARZETTE

Egretta garzetta garzetta (Linné). - 1/6.

Orde CICONIIFORMES. - Familie ARDEIDÆ.

Habite dans l'est, le sud et le nord de l'Afrique, dans le sud de l'Europe et en Asie tempérée. Des races voisines se rencontrent en Australie, Malaisie, Madagascar. Les oiseaux qui habitent le plus au nord émigrent vers la Méditerranée, le nord de l'Afrique, le sud de l'Asie. S'égare exceptionnellement en Belgique.

Recherche les marais, de terres inondées, bords vaseux des lagunes, fleuves et rivières, où elle se nourrit de poissons, grenouilles, lézards, crustacés, mollusques, vers, insectes. Niche en colonies, souvent en compagnie d'autres espèces de Hérons, Ibis, etc.; le nid, petite agglomération de branches, tiges de roseaux, est placé sur des arbres, des buissons, même à terre parmi les roseaux; 4 œufs, bleu verdâtre pâle; une nichée.

Oiseau silencieux, mais près du nid on entend parfois « ark, or ork » ou « rrhai », émis d'une voix rauque.

214. - *Ardeola ralloides* (Scopoli)



Ralreiger - Héron crabier

1. Paarkleed - Nuptial - 2. Jongkleed - Jeune

N° 214 - RALREIGER

Ardeola ralloides (Scopoli). - 1/4.

Orde CICONIIFORMES. - Familie ARDEIDÆ.

Bewoont bijna geheel Afrika, het Zuiden van Europa, noordwaarts tot Polen, en het Westen van Azië. Die van Europa trekken naar Afrika. Gaat zelden door België.

Zoekt moerassen op, slijkerige boorden van stromen en meren, voorzien van riet, wilgen en andere struiken. Nestelt bij voorkeur op de bomen en struiken, zeldener op de grond in de rietvelden; dikwijls in koloniën onder de Zilverreigers, Nachtreigers, Ibis, enz. Nest met meer of minder zorg gebouwd bij middel van takken en rietstengels; 4-6 bleek-groenblauwe eieren; één broedsel.

Voedt zich vooral met kerfdieren, kleine vissen, kikvorsen, schaaldieren, weekdieren, aardwormen. Zijn roep : « karr », is hees en schraal. Deze vogel is vooral 's avonds en 's morgens bedrijvig.

N° 214 - HERON CRABIER

Ardeola ralloides (Scopoli). - 1/4.

Orde CICONIIFORMES. - Familie ARDEIDÆ.

Habite presque toute l'Afrique, le sud de l'Europe, au nord jusqu'à la Pologne, et l'ouest de l'Asie. Ceux de l'Europe émigrent en Afrique. Passe rarement par la Belgique.

Recherche les marécages, bords vaseux des fleuves et des lacs, pourvus de roseaux, saules et autres buissons. Niche de préférence sur les arbres et les buissons, plus rarement à terre dans les massifs de roseaux; souvent en colonies parmi des Aigrettes, Bihoreaux, Ibis, etc. Nid construit avec plus ou moins de soins, au moyen de branches ou tiges de roseaux; 4-6 œufs, bleu verdâtre pâle; une nichée.

Se nourrit principalement d'insectes, petits poissons, grenouilles, crustacés, mollusques, vers de terre. Son cri : « karr », est rauque et grêle. Cet oiseau est surtout actif le matin et le soir.

215. - *Nycticorax nycticorax nycticorax* (Linné)



Nachtreiger - Héron bihoreau
1. Volwassen - Adulte - 2. Jong - Jeune

N° 215 - NACHTREIGER

Nycticorax nycticorax nycticorax (Linné). - 1/5.

Orde CICONIIFORMES. - Familie ARDEIDÆ.

Bewoont de keerkringstreken, het Zuiden en Noorden van Afrika, het Zuiden en het midden van Europa, in het Noorden tot Holland en Duitsland, en bijna geheel Azië, buiten het Noorden. De vogels die het verst in het Noorden wonen trekken naar de Middellandse Zee en het Zuiden van Azië.

Zoekt moerassige bossen op, meren en andere waters, met struiken voorzien. Nestelt in koloniën dikwijls in gezelschap van Zilverreigers, Ibissen, Ralreigers, enz., op de bomen en de struiken, minder op de grond in het riet. Plat nest, gebouwd uit takken of riet; 3-4 bleek blauw-groene eieren; bij uitzondering twee broedsels.

Eet voornamelijk vissen, hagedissen, kikvorsen, weekdieren, wormen, kerfdieren en larven, soms kleine zoogdieren. Zijn roep is hees, als « kaak, kwoek, kwaak, kwak », enz. Is vooral bedrijvig bij de schemering en 's nachts.

N° 215 - HERON BIHOREAU

Nycticorax nycticorax nycticorax (Linné). - 1/5.

Ordre CICONIIFORMES. - Familie ARDEIDÆ.

Habite l'Afrique tropicale, méridionale et septentrionale, le sud et le centre de l'Europe, au nord jusqu'à la Hollande et l'Allemagne, et presque toute l'Asie, sauf le nord. Les oiseaux habitant le plus au nord émigrent vers la Méditerranée et le sud de l'Asie.

Recherche les bois marécageux, lacs et autres eaux garnies de buissons. Niche en colonies, souvent en compagnie d'Aigrettes, Ibis, Crabiers, etc., sur les arbres et les buissons, plus rarement à terre dans les roseaux. Nid construit de branches ou de roseaux, de forme plate; 3-4 œufs, vert bleuâtre pâle; exceptionnellement deux nichées.

Mange principalement des poissons, lézards, grenouilles, mollusques, vers, insectes et larves, parfois de petits mammifères. Son cri est rauque, comme « kaak, kwoek, kwaak, kwak », etc. Est principalement crépusculaire et nocturne.

216. - *Ixobrychus minutus minutus* (Linné)



Kleine Roerdomp - Butor blongios
1. Volwassen - Adulte - 2. Jong - Jeune

N° 216 - KLEINE ROERDOMP

Ixobrychus minutus minutus (Linné). - 1/3.

Orde CICONIIFORMES. - Familie ARDEIDÆ.

Bewoont het Noorden van Afrika, het Zuiden en het midden van Europa, in het Noorden tot de breedte van Zuid-Scandinavië en van de golf van Bothnië, in Azië, van Klein-Azië tot het Noord-Westen van Hindoestan. Overwintert in Afrika en het Zuiden van Azië.

Zoekt moerassige plaatsen op die wel voorzien zijn van riet, struiken en andere schuilplaatsen. Nest in struiken of andere gewassen, zelden op bomen; 5-6 witte eieren; misschien soms twee broedsels.

Voedt zich voornamelijk met kerfdieren, bij gelegenheid met kleine zoogdieren, hagedissen, kikvorsen, weekdieren, schaaldieren. Verscheidene roepgeluiden werden waargenomen: « wroe », « rroe », « moerr », « gait », « aark », « wouw, wouw ». Deze laatste roep wordt het meest gehoord en daaraan dankt hij zijn Nederlandse naam « Wouwaapje », ten onrechte in « Woudaapje » gewijzigd.

N° 216 - BUTOR BLONGIOS

Ixobrychus minutus minutus (Linné). - 1/3.

Ordre CICONIIFORMES. - Familie ARDEIDÆ.

Habite le nord de l'Afrique, le sud et le centre de l'Europe, au nord jusqu'à la latitude du sud de la Scandinavie et du golfe de Bothnie; en Asie, de l'Asie Mineure jusqu'au nord-ouest de l'Hindoustan. Hiverne en Afrique et au sud de l'Asie.

Recherche les endroits marécageux, bien pourvus de roseaux, buissons ou autres refuges. Nid dans les roseaux ou autre végétation, rarement sur les arbres; 5-6 œufs, blancs; peut-être parfois deux nichées.

Se nourrit principalement d'insectes, occasionnellement de petits mammifères, lézards, grenouilles, mollusques, crustacés. Différents cris ont été notés: « wrou », « rrou », « mourr », « gait », « aark », « wouw, wouw ». Ce dernier s'entend le plus fréquemment et lui a valu son nom néerlandais de « Wouwaapje », modifié erronément en « Woudaapje ».

217. - *Botaurus stellaris stellaris* (Linné)



Roerdomp - Butor étoilé

N° 217 - ROERDOMP

Botaurus stellaris stellaris (Linné). - 1/6.

Orde CICONIIFORMES. - Famille ARDEIDÆ.

Nestelt in het Noorden van Afrika, in Europa tot de breedte van het Zuiden van Finland, in het Westen van Siberië tot Mongolië, in het Westen van Azië tot Turkestan. De meest noordelijke bewoners trekken naar Afrika, Arabië en Indië.

Leeft op moerassige plaatsen, wateroevers met veel riet en struiken. Nestelt in het riet, waar hij een hoop oude rietstengels, biezen en gras verzamelt; 4-6 olijfbuine eieren; één broedsel.

Voedsel : vissen, kikvorsachtigen, schaaldieren, weekdieren, kerfdieren en larven; bij gelegenheid kleine zoogdieren en jonge vogels.

Zijn gewone roep is « kow kow » of een hees « aark, aark ». Zijn bijzonder geroep gedurende de voortplantingstijd klinkt als « oe-woemb », van 3 tot 5 en 6 maal, soms meer, herhaald. Deze klinkende roep, die men aan het geloei van een stier vergeleken heeft, brengt de vogel niet uit wijl hij zijn snavel in het water dompelt, zoals men lange tijd geloofd heeft.

N° 217 - BUTOR ETOILE

Botaurus stellaris stellaris (Linné). - 1/6.

Ordre CICONIIFORMES. - Famille ARDEIDÆ.

Niche dans le nord de l'Afrique, en Europe jusqu'à la latitude du sud de la Finlande, dans l'ouest de la Sibérie jusqu'à la Mongolie, dans l'ouest de l'Asie jusqu'au Turkestan. Les habitants les plus nordiques émigrent en Afrique, en Arabie et aux Indes.

Vit dans les endroits marécageux, bords des eaux avec large couvert de roseaux et de buissons. Niche dans les roseaux, où il accumule un tas de vieilles tiges de roseaux, joncs, herbes; 4-6 œufs, de couleur brun olive; une nichée.

Nourriture : poissons, batraciens, crustacés, mollusques, insectes et larves; occasionnellement de petits mammifères et jeunes oiseaux.

Son cri ordinaire est « kow kow » ou un rauque « aark, aark ». Son cri spécial pendant la saison de reproduction sonne comme « oe-woumb » répété 3 à 5 et 6 fois, parfois plus. Ce cri, très sonore et qu'on a comparé au beuglement du taureau, n'est pas produit par l'oiseau en enfonceant le bec dans l'eau, comme on l'a cru pendant longtemps.

218. - *Phoenicopterus ruber roseus* Pallas



Roze Steltzwaan - Flamant rose
1. Volwassen - Adulte - 2. Jong - Jeune

N° 218 - ROZE STELTZWAAN

Phoenicopterus ruber roseus Pallas. - 1/10.

Orde PHENICOPTERIFORMES. - Famille PHENICOPTERIDÆ.

Nestelt plaatselijk en dikwijls onregelmatig in de streken van de Middellandse Zee, het Noorden van Afrika, het Zuiden van Spanje en het Zuiden van Frankrijk; in de streken van de Kaspische Zee, de Aralzee, het Baïkal-meer, in zekere waters van het binnenland en de kusten van het Zuiden van Azië. Zwerft soms hier en daar in het Zuiden en het midden van Europa; zeer zeldzaam in België.

Houdt zich op in uitgestrekte zoet- en brakwaters, op de kusten, delta's, lagunen, inhammen, meren, enz. Nestelt in het ondiep water waar de vogel tot boven de hoogte der tijen een kegelvormige hoop slijk opstapelt waarop hij zijn twee witte eieren legt; één broedsel.

Voedt zich met gras en waterplanten die hij verzamelt aan de oppervlakte of op de bodem van het water, ook met kleine vissen, kleine weekdieren in grote hoeveelheid, schaaldieren, insecten en larven. Zijn stem gelijkt op deze van de Ganzen en luidt als « kawoek » en « aahonck ».

N° 218 - FLAMANT ROSE


Phoenicopterus ruber roseus Pallas. - 1/10.

Ordre PHENICOPTERIFORMES. - Famille PHENICOPTERIDÆ.

Niche localement et souvent irrégulièrement dans les régions de la Méditerranée, le nord de l'Afrique, le sud de l'Espagne et le sud de la France; dans les régions de la mer Caspienne, de la mer d'Aral, du lac Baïkal, dans certaines eaux de l'intérieur et des côtes du sud de l'Asie. Erre parfois çà et là dans le sud et le centre de l'Europe; très rarement en Belgique. Se tient dans les grandes étendues d'eaux douces ou saumâtres, sur les côtes, deltas, lagunes, estuaires, lacs, etc. Niche dans l'eau peu profonde où l'oiseau élève, jusqu'au-dessus du niveau des marées, un tas conique de boue sur lequel il dépose ses deux œufs, blancs; une nichée.

Se nourrit d'herbes et de plantes aquatiques qu'il recueille à la surface ou au fond de l'eau, également de petits poissons, petits mollusques en grande quantité, crustacés, insectes et larves. Sa voix ressemble à celle des Oies et est représentée par « kawoek » et « aahonck ».

219. - *Anser anser anser* (Linné)



Grauwe Gans - Oie cendrée

N° 219 - GRAUWE GANS

Anser anser anser (Linné). - 1/8.

Orde ANSERIFORMES.

Familie ANATIDÆ.

Bewoont vooral het Noorden, minder het midden en het Oosten van Europa; plaatselijk in Spanje; Mesopotamië door het midden van Azië tot Mantsjoerije. Overwintert in zuidelijk Europa en het Noorden van Afrika.

Zoekt de grazige vlakten op, in de nabijheid der grote waters omboord met riet en waterplanten. Nestelt in heide, biezen en riet; het nest is een hoop dode stengels, planten uit de omgeving met inbegrip van mos, het midden met pluimen en dons gevoerd; 4-6 roomkleurige eieren; één broedsel.

Voedt zich vooral met gras, jonge graanscheuten, graan en zaden van alle slag; eet zee gras en andere zeeplanten op de oever der zee. Geroep: «gak, gak, gak» en «gnong-ong-ong». Vliegt in vorm van hoek. Trekt in benden in de winter. Van haar stammen de Huisganzen af.

N° 219 - OIE CENDREE

Anser anser anser (Linné). - 1/8.

Orde ANSERIFORMES. - Famille ANATIDÆ.

Habite principalement le nord, moins abondamment le centre et l'est de l'Europe; localement en Espagne; Mésopotamie par le centre de l'Asie jusqu'à la Mandchourie. Hiverne en Europe méridionale et dans le nord de l'Afrique.

Recherche les plaines herbeuses, dans le voisinage des grandes eaux garnies de roseaux et de plantes aquatiques. Niche dans les bruyères, les joncs, les roseaux; le nid est un tas de tiges mortes, de plantes du voisinage y compris de la mousse, le centre garni de plumes et de duvet; 4-6 œufs, blanc crème; une nichée.

Se nourrit principalement d'herbes, de jeunes pousses de blé, grains et graines de toutes sortes; au bord de la mer, mange du zostère et autres plantes marines. Cris: «gak, gak, gak» et «gnong-ong-ong». En vol se forme en angle. Emigre en hiver en bandes. Est la souche des Oies domestiques.

N° 220 - KOLGANS

Anser albifrons albifrons (Scopoli). - 1/10.


Orde ANSERIFORMES. - Famille ANATIDÆ.

Bewoont het Noorden van Europa, heel het Noorden van Azië en het Westen der noordpoollanden van Amerika, alsook het Oosten van Groenland. De ondersoort *Anser albifrons gambelli* bevindt zich in het Westen van Groenland en het Oosten van Canada. In Europa overwintert zij in de streken bij de Middellandse Zee.

Nestelt in de toendra en de moerassen aan de overkant van de grens der bomen; nest in een indieping van de grond, bestaande uit gras, mos, stengels van heidekruid, voorzien van pluimen en dons; 4 roomkleurige eieren; één broedsel.

Voedt zich met gras, jonge scheuten van paardestaarten en riet, alsook met andere planten der toendra. In haar winterverblijfplaatsen, insgelijks met klaver en andere gekweekte planten. Geroepen: «klek, klek», «klik, klik», «kiou-kiou», enz. Is zeer gezellig van aard, zelfs op de nestplaatsen.

220. - *Anser albifrons albifrons* (Scopoli)



Kolgans - Oie rieuse

1. Volwassen - Adulte - 2. Jong - Jeune

N° 220 - OIE RIEUSE

Anser albifrons albifrons (Scopoli). -

1/10.

Orde ANSERIFORMES.

Familie ANATIDÆ.

Habite le nord de l'Europe, tout le nord de l'Asie et l'ouest de l'Amerique arctique, ainsi que l'est du Groenland. La sous-espèce *Anser albifrons gambelli* se trouve dans l'ouest du Groenland et dans l'est du Canada. En Europe, hiverne dans les régions voisines de la Méditerranée.

Niche dans la toundra et les marécages au-delà de la limite des arbres; nid dans une dépression du sol, et composé d'herbes, mousse, tiges de bruyère, garni de plumes et de duvet; 4 œufs, blanc crème; une nichée.

Se nourrit d'herbes, jeunes pousses de prèles et de roseaux, ainsi que d'autres plantes de la toundra; dans ses quartiers d'hiver, aussi de trèfles et d'autres plantes cultivées. Cris: «klek, klek», «klik, klik», «kiou-kiou», etc. Est de caractère très sociable, même aux lieux de nidification.

221. - *Anser erythropus* (Linné)



Dwerggans - Oie naine
1. Volwassen - Adulte - 2. Jong - Jeune

N° 221 - OIE NAINE

Anser erythropus (Linné). - 1/7.

Ordre ANSERIFORMES. - Famille ANATIDÆ.

Habite le nord de l'Europe et de la Sibérie. En hiver jusqu'en Europe centrale et orientale, en Asie tempérée. Rare dans l'ouest de l'Europe, exceptionnellement en Belgique.

Niche plus au nord que d'autres Oies; nid placé dans petite fosse sous les touffes de saules et de bouleaux nains; construit d'herbes, mousse, brindilles, mélangées de plumes et de duvet; 4-5 œufs, blanc jaunâtre; une couvée.

Nourriture: herbes et autres plantes; dans les quartiers d'hiver aussi des grains et pousses de céréales. Son cri est exprimé par « ku-yu-yu », « hou-i-lío », « kchi-a-iac », « tio tio », « ko ko », « kaa », « klaü », « klek », « klik ». Se réunit en grandes bandes en hiver.

N° 222 - RIETGANS

Anser fabalis fabalis (Latham). - 1/8.

Ordre ANSERIFORMES. - Famille ANATIDÆ.

Bewoont het Noorden van Europa en van Siberië tot de Ienisseï. Overwintert in Europa tot de Middellandse Zee, de Zwarte en de Kaspische Zee en het Westen van Azië. Andere ondersoorten worden gevonden in Groenland, IJsland en Spitsbergen, in Siberië en in het Oosten van Azië.

Leeft in de open toendra, bij de moerassen, meren en rivieren, evenals in de moerassen van de beboste toendra; nest bestaande uit gras, bladeren, mos, korstmos, met dons vermengd; 4-6 witte eieren; één broedsel.

Eet gras en waterplanten van de toendra, in de winter ook klaver en graangewassen. Overwintert in benden en vliegt in vorm van hoek. Schreeuwen: « kajak, kajak », « rad rad », « gok », « treng ».

222. - *Anser fabalis fabalis* (Latham)



Rietgans - Oie des moissons

N° 221 - DWERGGANS

Anser erythropus (Linné). - 1/7.

Ordre ANSERIFORMES.

Famille ANATIDÆ.

Bewoont het Noorden van Europa en van Siberië. In de winter tot Midden- en Oost-Europa, in gematigd Azië. Zeldzaam in het Westen van Europa, bij uitzondering in België.

Nestelt meer noordwaarts dan andere Ganzen; nest geplaatst in een kleine kuil onder de dichte dwergwilgen- en berkenstruiken; gebouwd met gras, mos, twijgjes gemengd met pluimen en dons; 4-5 geelwitte eieren; één broedsel.

Voedsel: gras en andere planten; in de winterverblijfplaatsen ook graan en scheuten van graangewassen. Haar schreeuw luidt « ku-ju-ju », « hoe-i-lío », « ksji-a-ïak », « tjo-tjo », « ko ko », « kaa », « klu », « klek », « klik ». Vergadert in grote benden in de winter.

N° 222 - OIE DES MOISSONS

Anser fabalis fabalis (Latham). - 1/8.

Ordre ANSERIFORMES.

Famille ANATIDÆ.

Habite le nord de l'Europe et de la Sibérie jusqu'à l'Iénisséï. Hiverne en Europe jusqu'à la Méditerranée, les mers Noire et Caspienne et l'ouest de l'Asie. D'autres sous-espèces se rencontrent dans le Groenland, l'Islande et le Spitsberg, en Sibérie et dans l'est de l'Asie.

Vit dans la toundra ouverte, près des marécages, lacs et rivières, ainsi que sur les marais de la toundra boisée; nid composé d'herbes, feuilles, mousse, lichens, mélangés de duvet; 4-6 œufs, blancs; une couvée.

Mange des herbes et des plantes aquatiques de la toundra, en hiver également des trèfles et des céréales cultivées. Hiverne en bandes et vole en angle.

Cris: « kajak, kajak », « rad rad », « gok », « treng ».

223. - *Anser fabalis brachyrhynchus* Baillon



Kleine Rietgans - Oie à bec court

N° 223 - OIE A BEC COURT

Anser fabalis brachyrhynchus Baillon. - 1/7.

Ordre ANSERIFORMES. - Famille ANATIDÆ.

Niche dans le nord-est du Groenland, en Islande et au Spitsberg; hiverne aux Iles Britanniques, en France, en Belgique, Hollande, Allemagne, rarement dans les autres pays de l'Europe.

Vit dans les toundras et les plaines herbeuses du nord; en hiver se tient aux bords des eaux et fréquente les prairies et champs environnants. Niche souvent dans les endroits rocheux sur quelque terrasse ou corniche inaccessible au Renard polaire, son plus grand ennemi; parfois sur les îlots des lacs ou rivières, rarement en pleine toundra. Nid établi dans une excavation du sol, remplie d'herbes, mousse et autres plantes et une couche supérieure de duvet; 4-5 œufs, blanc sale; une nichée.

Se nourrit de toutes espèces de végétaux; aux lieux d'hivernage, recherche les grains perdus dans les éteules et les jeunes pousses de céréales. Sa voix ressemble à celle d'*Anser fabalis fabalis*. Comme les autres Oies, vit en bandes et vole en angle.

N° 224 - ROTGANS

Branta bernicla bernicla (Linné). - 1/8.

Ordre ANSERIFORMES. - Famille ANATIDÆ.

Woont vanaf Kolgouiev en Nova-Zembla in het Westen van Siberië tot de Lena. Trekt langs het Noorden van Rusland en Scandinavië om te overwinteren op de kusten van de Noordzee: Denemarken, Holland, België, de Britse Eilanden, Frankrijk, soms nog meer naar het Zuiden. Andere ondersoorten bevinden zich in het Oosten van Siberië en in het Noorden van Amerika.

Houdt zich in de zomer op in de nabijheid van de zee; in de winter vooral op de zee bij de kusten, waar zij zeeplanten te eten vindt; begeeft zich ook op het land in de inhammen, lagunen en riviermondingen. Nestelt op de rotsige plaatsen van de toendra, tussen de stenen; nest van mos en dons; 3-5 roomkleurige eieren; één broedsel.

Voedt zich met zee- en landplanten, bijkomstig met schaaldieren en weekdieren. Haar roepgeluiden zijn hees: « rott rott rott », « krrowk », « kronk », « kwok », « rroek », « honk ». Leeft ook in banden.

224. - *Branta bernicla bernicla* (Linné)



Rotgans - Bernache cravant

1. Volwassen - Adulte - 2. Jong - Jeune

N° 223 - KLEINE RIETGANS

Anser fabalis brachyrhynchus Baillon.

-1/7.

Orde ANSERIFORMES.

Familie ANATIDÆ.

Nestelt in het Noord-Oosten van Groenland, in IJsland en op Spitsbergen; overwintert op de Britse Eilanden, in Frankrijk, België, Holland, Duitsland, zelden in de andere landen van Europa.

Leeft in de toendra's en de grazige vlakten van het Noorden; houdt zich in de winter op aan de oevers van het water en bezoekt de omliggende velden en weiden. Nestelt dikwijls op rotsige plaatsen op een terras of een kornis die voor de Poolvos, haar grootste vijand, ongenaakbaar is; soms op de eilandjes der meren en rivieren, zelden in volle toendra. Nest geplaatst in een uitholling van de grond, bekleed met gras, mos en andere planten en een bovenlaag dons; 4-5 vuilwitte eieren; één broedsel.

Voedt zich met allerlei soorten planten; zoekt in de overwinteringsplaatsen de zaden op die in de stoppels verloren gingen en de jonge graanscheuten. Haar stem gelijkt op die van *Anser fabalis fabalis*. Leeft, als de andere Ganzen, in banden en vliegt in vorm van hoek.

N° 224 - BERNACHE CRAVANT

Branta bernicla bernicla (Linné). - 1/8.

Ordre ANSERIFORMES.

Familie ANATIDÆ.

Habite à partir de Kalgouiev et la Nouvelle-Zemble dans l'ouest de la Sibérie jusqu'à la Léna. Emigre par le nord de la Russie et la Scandinavie pour hiverner sur les côtes de la mer du Nord: Danemark, Hollande, Belgique, Iles Britanniques, France, parfois plus au sud encore. D'autres sous-espèces se trouvent dans l'est de la Sibérie et au nord de l'Amérique.

En été se tient dans le voisinage de la mer; en hiver surtout sur la mer près des côtes, où il trouve à manger des plantes marines; se rend aussi à terre dans les estuaires, lagunes et bouches des rivières. Niche dans les endroits rocheux de la toundra, entre les pierres; nid de mousse et de duvet; 3-5 œufs, de couleur crème; une nichée.

En dehors de plantes marines, se nourrit aussi de plantes terrestres, accessoirement de crustacés et de mollusques. Ses cris sont rauques: « rott rott rott », « krrowk », « kronk », « kwok », « rrouk », « honk ». Vit aussi en bandes.

225. - *Branta leucopsis* (Bechstein)



Brandgans - Bernache nonnette

N° 225 - BERNACHE NONNETTE

Branta leucopsis (Bechstein). - 1/6.

Ordre ANSERIFORMES. - Famille ANATIDÆ.

Niche dans le nord-est du Groenland, Spitsberg, la Nouvelle-Zemble et le nord-ouest de la Sibérie. Hiverne sur les côtes sud de la mer Baltique, de la mer du Nord et de la Manche. Assez régulièrement, mais en petit nombre, en Belgique.

Se tient dans les endroits herbeux et marécageux, non loin de la mer. Niche en colonies, presque toujours sur les terrasses et corniches de rochers, à l'abri des atteintes du Renard polaire, parfois sur des îlots des côtes et estuaires. Nid dans quelque petite fosse, avec un peu de mousse et de lichens et beaucoup de duvet; 3-5 œufs, blanc grisâtre; une couvée.

Se nourrit d'herbes, de feuilles et châtons de saule, de feuilles et tiges de plantes arctiques. Dans ses quartiers d'hiver: herbes, prêles, trèfles et autres plantes de terre ou de marais. Cris: « ark », « kak, kakakak » et un rauque « gragra » ou « hoog », « hogoog », « wrack ».

N° 226 - ROODHALSGANS

Branta ruficollis (Pallas). - 1/8.

Ordre ANSERIFORMES. - Famille ANATIDÆ.

Bewoont in de zomer het Noord-Westen van Siberië; in de winter het Zuiden, Hongarije en Zuid-Rusland; in Azië de streken van het Oosten der Kaspische Zee tot het Noorden van Iran. Verdwaalt zelden in het Westen van Europa, bij uitzondering in België.

Houdt zich op in de grazige toendra, niet ver van de meren en rivieren; nestelt op de steile hellingen van de oevers der rivieren; het nest wordt gebouwd met gras en dons in een kleine kuil opgehoopt; 4-5 roomkleurige eieren; één legsel.

Voedt zich bijna uitsluitend met grasscheuten. Haar roepgeluiden gelijken op « kik-kwa », « kik-wik », « ti-tjik ».

226. - *Branta ruficollis* (Pallas)



Roodhalsgans - Bernache à cou roux

N° 225 - BRANDGANS

Branta leucopsis (Bechstein). - 1/6.

Ordre ANSERIFORMES.

Famille ANATIDÆ.

Nestelt in het Noord-Oosten van Groenland, Spitsbergen, Nova-Zembla en het Noord-Westen van Siberië. Overwintert op de zuidelijke kusten van de Baltische Zee, de Noordzee en het Kanaal. Vrij regelmatig, doch in klein getal in België. Houdt zich op in de grazige en moerasige plaatsen, niet ver van de zee. Nestelt in koloniën, bijna altijd op de terrassen en kornissen der rotsen, buiten het bereik van de Poolvos, soms op de eilanden der kusten en inhammen. Nest in een kleine kuil, met een weinig mos en korstmos en veel dons; 3-5 grijswitte eieren; één broedsel.

Voedt zich met gras, wilgenbladeren en -katjes, bladeren en stengels van noordse planten. In haar winterverblijfplaatsen: gras, paardestaarten, klaver en andere land- of moerasplanten. Roepen: « ark », « kak, kakakak » en een hees « gragra » of « hoog », « ho-goog », « wrak ».

N° 226 -

BERNACHE A COU ROUX

Branta ruficollis (Pallas). - 1/8.

Ordre ANSERIFORMES.

Famille ANATIDÆ.

Habite en été le nord-ouest de la Sibérie; en hiver le sud, la Hongrie et le sud de la Russie; en Asie dans les régions de l'est de la mer Caspienne jusqu'au nord de l'Iran. S'égare rarement dans l'ouest de l'Europe, exceptionnellement en Belgique.

Se tient dans la toundra herbeuse, non loin des lacs et rivières; niche sur les pentes raides du bord des rivières; le nid est construit d'herbes accumulées dans une petite fosse, avec adjonction de duvet; 4-5 œufs, blanc crème; une ponte.

Se nourrit presque exclusivement de pousses d'herbes. Ses cris ressemblent à « kik-kwa », « kik-wik », « ti-tchic ».

227. - *Alopochen ægyptiaca* (Linné)



Nijlgans - Oie d'Egypte

N° 227 - OIE D'EGYPTE

Alopochen ægyptiaca (Linné). - 1/8.

Ordre ANSERIFORMES. - Famille ANATIDÆ.

Habite en Afrique au sud du Sahara, plus rare à l'ouest, plus commun à l'est, dans la vallée du Nil, près de la mer Morte en Palestine. Jadis, habitait aussi le sud-est de l'Europe; les sujets capturés dans l'ouest de l'Europe ne sont que bien rarement des égarés sauvages, mais plutôt des échappés de captivité.

Vit dans des endroits marécageux, près des lacs et rivières; niche à terre dans la haute végétation au bord des eaux, mais aussi à peu de hauteur sur les arbres, dans de vieux nids d'autres oiseaux et dans des cavités d'arbres; 4-6 œufs, blancs.

Nourriture: herbes, jeunes céréales, feuilles et tiges molles de plantes aquatiques, accessoirement des vers, insectes, larves, crustacés, mollusques. Cri: un rauque « kuuk kuuk » et une éclatante sonnerie: « tengteng terengtengtengteng ».

N° 228 - BERGEEND

Tadorna tadorna (Linné). - 1/7.

Ordre ANSERIFORMES. - Famille ANATIDÆ.

Bewoont bijna geheel Europa, het Westen van Azië doorheen de gematigde streken tot Mantsjoerije. Standvogel; in de winter zwerven sommige Bergeenden vrij ver, vooral bij koud weder.

Zoekt zout- en brakwater, de zee en binnenmeren op. Nestelt gewoonlijk, op korte afstand van het water, in een gat in de grond, dikwijls in konijnenholten, zoniet in kunstmatige hopen waar de mens haar eieren roofde zoals bij de huisvogels. Nest zelden onder een bos planten of een dichte struik; gevormd met een weinig gras, bladeren, mos en een laag dons en pluimen; 7-12 roomkleurige eieren; één broedsel.

Voedt zich vooral met kleine weekdieren, kleine schaaldieren, kerfdieren en larven, wormen, een weinig gras, wieren en andere planten. Roepen: « korr korr korr », « ark ark », « koewek », « kwi kwi kwi », « dju, dju », « kwier », « arra », « gagaga », « gaak ».

228. - *Tadorna tadorna* (Linné)



Bergeend - Tadorne de Belon

1. Volwassen - Adulte - 2. Jong - Jeune

N° 227 - NIJLGANS

Alopochen ægyptiaca (Linné). - 1/8.

Ordre ANSERIFORMES.

Famille ANATIDÆ.

Woont in Afrika ten Zuiden van de Sahara, zeldzamer in het Westen, gemener in het Oosten, in de Nijlvallei, bij de Dode Zee in Palestina. Bewoonde vroeger ook het Zuid-Oosten van Europa; de in het Westen van Europa gevangen exemplaren zijn slechts zelden wilde verdwaalde vogels, doch eerder gasten uit de gevangenschap ontsnapt.

Leeft op moerassige plaatsen, bij meren en rivieren; nestelt op de grond in de hoge plantengroei aan de oever der waters, doch ook laag in de bomen, in oude nesten van andere vogels en in boomholten; 4-6 witte eieren.

Voedsel: gras, jonge graangewassen, bladeren en weke stengels van waterplanten, ook wormen, kerfdieren, larven, schaaldieren, weekdieren. Roep: een hees « kuuk kuuk » en een luidruchtig geschel: « tengteng, terengtengtengteng ».

N° 228 - TADORNE DE BELON

Tadorna tadorna (Linné). - 1/7.

Ordre ANSERIFORMES.

Famille ANATIDÆ.

Habite à peu près toute l'Europe, l'ouest de l'Asie à travers les régions tempérées jusqu'à la Mandchourie.

Sédentaire; en hiver, certains individus errent assez loin, surtout par temps froid.

Recherche les eaux salées et saumâtres, la mer et les lacs intérieurs. Niche généralement à peu de distance de l'eau, dans quelque trou en terre, souvent dans les terriers de lapins, sinon dans des terriers artificiels où l'homme exploite sa ponte d'œufs comme chez les oiseaux domestiques. Nid rarement sous quelque touffe de végétaux ou buisson dense; composé d'un peu d'herbes, feuilles, mousse et une bonne couche de duvet et de plumes; 7-12 œufs, blanc crème; une couvée.

Se nourrit principalement de petits mollusques, petits crustacés, insectes et larves, vers, un peu d'herbes, algues et autres plantes. Cris: « korr korr korr », « ark ark », « koewek », « qui qui qui », « dju dju », « quirr », « arra », « gagaga », « gaak ».

229. - *Anas platyrhynchos platyrhynchos* Linné



Blokeend - Canard col-vert
1 ♂ 2 ♀

N° 229 - CANARD COL-VERT

Anas platyrhynchos platyrhynchos Linné. - 1/6.

Ordre ANSERIFORMES. - Famille ANATIDÆ.

Habite le nord de l'Afrique, l'Europe jusqu'au cercle polaire, en Sibérie, en Chine, au Japon et en Amérique septentrionale. Les habitants du nord émigrent vers le sud en hiver, à mesure que le froid devient plus intense.

Fréquente toutes espèces d'eaux douces, mais recherche les bois et broussailles pour nicher, même assez loin de l'eau. Nid entre les buissons, parfois sur les arbres, dans vieux nid de Pie ou de Corbeau, ou sur saule têtard, surtout aux endroits menacés d'inondation. Nid d'herbes, feuilles, avec couche de duvet; 7-10 œufs, ordinairement vert roussâtre; une nichée chez les oiseaux sauvages.

Se nourrit principalement de matières végétales, de plantes aquatiques; mange aussi des insectes et larves, vers, crustacés, mollusques. Partiellement nocturne. La voix du mâle s'exprime par « kwerk, kwerk », celle de la femelle : « kwaark, kwaark ».

Comme la plupart des Canards dont le régime végétal prédomine, ce Canard est un gibier fort estimé; c'est la principale victime des canardières; il est la souche des Canards domestiques et semi-domestiques.

N° 230 - WINTERTALING

Anas crecca crecca Linné. - 1/4.

Ordre ANSERIFORMES. - Famille ANATIDÆ.

Woont in Europa, ten Zuiden tot de Middellandse Zee, in Sibirië en vanaf de Caucasus door gematigd Azië tot Japan. Overwintert in de streek van de Middellandse Zee, in Afrika en het Zuiden van Azië.

Houdt zich op in zoetwater, zelden in de zee. Nestelt in het kreupelgewas, bij uitzondering in een oud kraainest op de bomen; nest van gras, bladeren, dons en pluimen; 10-12 eieren, gewoonlijk rosgroen; één broedsel.

Vooraf plantaardig voedsel: zaden, bladeren van vele water- en landplanten, ook kerfdieren, weekdieren, schaaldieren, wormen, enz. Gedeeltelijk nachtdier. Goed wild.

De stem van het mannetje klinkt « krik krik »; die van het wijfje: « kwak kwak » of « kwek kwek ».

230. - *Anas crecca crecca* Linné



Wintertaling - Sarcelle d'hiver
1 ♂ 2 ♀

N° 229 - BLOKEEND

Anas platyrhynchos platyrhynchos Linné.
- 1/6.

Orde ANSERIFORMES.

Familie ANATIDÆ.

Bewoont het Noorden van Afrika, Europa tot de poolkring, Sibirië, China, Japan en Noord-Amerika. De bewoners van het Noorden trekken in de winter naar het Zuiden, naarmate de koude heviger wordt.

Bezoekt alle soorten zoetwater, doch verkiest de bossen en het kreupelhout om te nestelen, zelfs vrij ver van het water. Nest tussen de struiken, soms op de bomen, in een oud ekster- of kraainest, of op een knotwilg, vooral op plaatsen die met overstroming bedreigd zijn. Nest van gras, bladeren, met een laag dons; 7-10 eieren, doorgaans rosgroen; één broedsel bij de wilde vogels. Voedt zich vooral met plantaardige stoffen, waterplanten; eet ook kerfdieren en larven, wormen, schaaldieren, weekdieren. Gedeeltelijk nachtdier. De stem van het mannetje klinkt « kwerk, kwerk », die van het wijfje: « kwaark, kwaark ». Zoals de meeste Eenden bij wie het plantenvoedsel overheerst, is deze Eend een zeer gewaardeerd stuk wild; zij is het voornaamste slachtoffer der eendenkooien; zij is de stamsoort van de huizen halftamme Eenden.

N° 230 - SARCELLE D'HIVER

Anas crecca crecca Linné. - 1/4.

Ordre ANSERIFORMES.

Familie ANATIDÆ.

Habite l'Europe, au sud jusqu'à la Méditerranée, la Sibérie et depuis le Caucase, à travers l'Asie tempérée, jusqu'au Japon. Hiverné dans la région de la Méditerranée, en Afrique et au sud de l'Asie.

Se tient dans les eaux douces, rarement en mer. Niche dans les broussailles, exceptionnellement dans un vieux nid de Corvidé sur les arbres; nid d'herbes, feuilles, duvet et plumes; 10-12 œufs, ordinairement vert roussâtre; une couvée.

Régime principalement végétal: semences, feuilles de beaucoup de plantes aquatiques et terrestres, accessoirement des insectes, mollusques, crustacés, vers, etc. Partiellement nocturne. Bon gibier. La voix du mâle s'entend comme « krik krik », celle de la femelle: « kwak kwak » ou « kwek kwek ».

231. - *Anas formosa* Georgi



Baïkaltaling - Sarcelle formose
1 ♂ 2 ♀

N° 231 - BAÏKALTALING

Anas formosa Georgi. - 1/4.

Orde ANSERIFORMES.

Familie ANATIDÆ.

Bewoont het Oosten van Siberië ten Oosten van de Lena, tot de bergen van het Noord-Oosten van Azië; overwintert in Japan, het Zuiden van China, Formosa. Verdwaalt zelden in Europa; bij uitzondering in België.

Houdt zich op bij zoetwater en in moerassen. Nest op de grond, tussen de hoge plantengroei; bestaande uit gras en andere planten der omgeving en uit een laag dons en pluimen; 6-8 licht olijfbuin-roomkleurige eieren.

Voedt zich vooral met plantaardige stoffen, gras en andere planten. Wordt vaak gevangen gehouden als siervogel. Zijn stem klinkt « klo klo klo » en « roek roek ».

N° 231 - SARCELLE FORMOSE

Anas formosa Georgi. - 1/4.

Ordre ANSERIFORMES. - Famille ANATIDÆ.

Habite l'est de la Sibérie à l'est de la Léna, jusqu'aux montagnes du nord-est de l'Asie; hiverne au Japon, dans le sud de la Chine, à Formose. S'égare rarement en Europe; exceptionnellement en Belgique.

Se tient sur les eaux douces et les marais. Nid à terre, parmi la haute végétation; composé d'herbes et autres plantes du voisinage avec une couche de duvet et de plumes; 6-8 œufs, couleur crème légèrement brun olive.

Se nourrit principalement de matières végétales, herbes et autres plantes. Est souvent tenu en captivité comme oiseau d'ornement. Son cri est représenté par « klo klo klo » et « rouck rouck ».

N° 232 - ZOMERTALING

Anas querquedula Linné. - 1/4.


Orde ANSERIFORMES. - Famille ANATIDÆ.

Woont in Europa, in het Zuiden tot de Middellandse Zee en de Caucasus, in Azië tot de Stille Oceaan, en van de Aralo-Kaspische streek door Azië tot Mantsjoerijë. Overwintert in het Noorden en de keerkringstreken van Afrika en in het Zuiden van Azië.

Bezoekt zoetwater, moerassige plaatsen, zelden de zee-kusten. Nestelt in het hoge gras en andere planten, niet ver van het water, dikwijls op de gras-pollen die boven het water uitsteken. Nest van gras en dons; 7-10 ros-roomkleurige eieren; één broedsel.

Eet planten en dieren: gras en waterplanten, schaaldieren, weekdieren, kerfdieren, wormen, enz. Gewaardeerd wild. De roep van het mannetje gelijkt op « tiek tiek »; die van het wijfje op: « kwek kwek ».

232. - *Anas querquedula* Linné



Zomertaling - Sarcelle d'été
1 ♂ 2 ♀

N° 232 - SARCELLE D'ÉTÉ

Anas querquedula Linné. - 1/4.

Orde ANSERIFORMES.

Familie ANATIDÆ.

Habite l'Europe, au sud jusqu'à la Méditerranée et le Caucase, en Asie dans la Sibérie jusqu'au Pacifique, et de la région Aralo-Caspienne à travers l'Asie jusqu'à la Mandchourie. Hiverne en Afrique septentrionale et tropicale et dans le sud de l'Asie.

Fréquente les eaux douces, les endroits marécageux, rarement les côtes. Niche dans les hautes herbes et autres végétaux, non loin de l'eau, souvent sur les touffes d'herbe qui émergent de l'eau. Nid d'herbes et de duvet; 7-10 œufs, crème roussâtre; une nichée.

Régime végétal et animal: herbes et plantes aquatiques, crustacés, mollusques, insectes, vers, etc. Gibier recherché. Le cri du mâle ressemble à « tick tick », celui de la femelle: « kwek kwek ».

233. - *Anas strepera* Linné



Krakeend - Canard chipeau
1 ♂ 2 ♀

N° 233 - KRAKEEND

Anas strepera Linné. - 1/6.

Orde ANSERIFORMES.

Familie ANATIDÆ.

Woont in Europa, buiten het hoge Noorden, in Siberië, van Transcaucië door gematigd Azië tot de eilanden van de Beringzee, en in een groot deel van noordelijk Amerika. Overwintert in het Noorden van Afrika, in het Zuiden van gematigd Azië en het Zuiden van Noord-Amerika.

Verkeert op zoetwater, meren en rivieren die een hoge plantengroei bezitten; zelden in de zee. Nest bij het water, tussen de hoge waterplanten, gebouwd met gras, zegge, pluimen en dons; 8-12 ros-roomkleurige eieren; één broedsel.

Voedt zich voornamelijk met plantaardige stoffen: gras, zaad, bladeren, wortels; dieren in kleine hoeveelheden: weekdieren, schaaldieren, wormen, insecten, enz. Zeer goed wild. Roepgeluiden: «rab», «kak», «kwerrrr», «kwuk-uk-uk-uk», «rek rek rek piep piep rek rek».

N° 233 - CANARD CHIPEAU

Anas strepera Linné. - 1/6.

Orde ANSERIFORMES. - Familie ANATIDÆ.

Habite l'Europe, sauf le haut nord, la Sibérie, de la Transcaucasie à travers l'Asie tempérée jusqu'aux îles de la mer Behring, et dans une grande partie de l'Amérique septentrionale. Hiverne au nord de l'Afrique, au sud de l'Asie tempérée et au sud de l'Amérique du Nord.

Fréquente les eaux douces, lacs et rivières possédant de la haute végétation; rarement en mer. Nid près de l'eau, parmi les hautes plantes aquatiques, construit d'herbes, laïches, plumes et duvet; 8-12 œufs, crème roussâtre; une nichée.

Se nourrit principalement de végétaux: herbes, semences, feuilles, racines; animaux en petite quantité: mollusques, crustacés, vers, insectes, etc. Très bon gibier. Cris: «rab», «kak», «kwerrrr», «kwuk-uk-uk-uk», «rek rek rek pihp pihp rek rek».

N° 234 - SMIEËEND

Anas penelope Linné. - 1/6.

Orde ANSERIFORMES. - Familie ANATIDÆ.

Bewoont het Noorden van Europa tot Engeland, Holland, Duitsland, Polen, Rusland, en het Noorden, het midden en het Westen van Azië. Overwintert in Afrika, in het Zuiden van Azië en op de oostelijke en westelijke kusten van Noord-Amerika.

Bezoekt zoetwater, moerassen, toendra's, zelfs met kreupelhout, doch houdt zich buiten de broeitijd ook op in zee. Nest op de grond, tussen de plantengroei, vervaardigd met gras, mos, varens, pluimen en dons; 7-8 ros-roomkleurige eieren; één broedsel.

Bijna uitsluitend plantaardig voedsel: gras, waterplanten, zelfs zeeplanten; soms enige weekdieren en kerfdieren. Gezocht wild. De stem van het mannetje klinkt «wiew» en «wiwi», die van het wijfje «rerr», «knarr» of «terr».

234. - *Anas penelope* Linné



Smieëend - Canard siffleur
1 ♂ 2 ♀

N° 234 - CANARD SIFFLEUR

Anas penelope Linné. - 1/6.

Orde ANSERIFORMES.


Familie ANATIDÆ.

Habite le nord de l'Europe jusqu'à l'Angleterre, Hollande, Allemagne, Pologne, Russie, et le nord, le centre et l'ouest de l'Asie. Hiverne en Afrique, dans le sud de l'Asie et sur les côtes est et ouest de l'Amérique du Nord.

Recherche les eaux douces, marais, toundras, même broussailleux, mais se tient aussi sur mer en dehors du temps de nidification. Nid à terre, parmi la végétation, construit d'herbes, mousse, fougères, plumes et duvet; 7-8 œufs, de couleur crème roussâtre; une nichée.

Régime presque entièrement végétal: herbes, plantes aquatiques, même marines; parfois quelques mollusques et insectes. Gibier recherché. La voix du mâle est désignée par «wiew» et «wiwi», celle de la femelle par «rerr», «knarr» ou «terr».

235. - *Anas acuta acuta* Linné



Pijlstaarteend - Canard pilet

1 ♂ 2 ♀

N° 235 - PIJLSTAARTEEND

Anas acuta acuta Linné. - 1/5.

Orde ANSERIFORMES.

Familie ANATIDÆ.

Bewoont heel Europa en het grootste deel van koud en gematigd Azië; overwintert in het Zuiden tot Midden-Afrika en Zuid-Azië. Een welgelijkend gewestelijk ras bewoont het Westen van Noord-Amerika.

Bezoekt in de zomer bij voorkeur zoetwater; houdt zich in de winter dikwijls op de kusten van de zee en verwijderd zich niet ver in het binnenland. Nestelt in de hoge plantengroei in de nabijheid van meren en moerassen; nest van gras, pluimen en dons; 7-9 eieren, groenroomkleurig; één broedsel.

Voedt zich vooral met plantaardige stoffen, zoetwaterplanten en met zee gras in de winter; daarbij kerfdieren, wormen, weekdieren, enz. Uitstekend wild. Stem van het mannetje: « kjuuk kjuuk » of « kruk »; van het wijfje: « kwaak », als ook « rerrerrerr », en « prrrr prrrr ».

N° 235 - CANARD PILET

Anas acuta acuta Linné. - 1/5.

Orde ANSERIFORMES. - Familie ANATIDÆ.

Habite toute l'Europe et la plus grande partie de l'Asie froide et tempérée; hiverne au sud jusqu'à l'Afrique centrale et le sud de l'Asie. Une race géographique voisine habite l'ouest de l'Amérique septentrionale.

En été, fréquente de préférence les eaux douces, en hiver se tient souvent sur les côtes de la mer et ne s'éloigne pas fort loin à l'intérieur des terres. Niche dans la haute végétation dans le voisinage des lacs et marais; nid d'herbes, plumes et duvet; 7-9 œufs, crème verdâtre; une nichée.

Se nourrit principalement de matières végétales, plantes d'eau douce et de zostère marin en hiver; au surplus, des insectes, vers, mollusques, etc. Excellent gibier. Voix du mâle: « kjuuk kjuuk » ou « kruk »; de la femelle: « kwaak » et encore « rerrerrerr » et « prrrr prrrr ».

N° 236 - SLOBEEND

Spatula clypeata (Linné). - 1/6.

Orde ANSERIFORMES. - Familie ANATIDÆ.

Bewoont bijna geheel Europa, Siberië en gematigd Azië, het Westen van Noord-Amerika. Overwintert meer naar het Zuiden, tot in de keerkringstreken van Afrika, in Zuid-Azië en Midden-Amerika.

Bezoekt zoetwater omboord met gras en riet; houdt zich zelden op in de zee, zelfs in de winter. Nestelt in gras en andere plantengroei in de nabijheid van het water. Nest van gras, riet, enz., pluimen en dons; 8-12 groenroze eieren; één broedsel.

Plantaardig en dierlijk voedsel, waarin bladeren, knoppen en zaden van waterplanten overwegend zijn; in mindere hoeveelheid: kerfdieren, wormen, weekdieren, schaaldieren, enz. Hooggeprezen wild. Stem van het mannetje: « toek toek » en « rro rro »; van het wijfje: « kwak kwak » of « kwek kwek ».

236. - *Spatula clypeata* (Linné)



Slobeend - Canard souchet

1 ♂ 2 ♀

N° 236 - CANARD SOUCHET

Spatula clypeata (Linné). - 1/6.

Orde ANSERIFORMES.

Familie ANATIDÆ.

Habite presque toute l'Europe, la Sibérie et l'Asie tempérée, l'ouest de l'Amérique du Nord. Hiverne plus au sud, jusqu'en Afrique tropicale, le sud de l'Asie et en Amérique centrale.

Fréquente les eaux douces bordées d'herbes et de roseaux; se tient rarement en mer, même en hiver. Niche dans l'herbe et autre végétation dans le voisinage de l'eau. Nid d'herbes, roseaux, etc., plumes et duvet; 8-12 œufs, roux verdâtre; une nichée.

Régime végétal et animal, avec prépondérance de feuilles, boutons et semences de plantes aquatiques; en moindre quantité: insectes, vers, mollusques, crustacés, etc. Gibier recherché. Voix du mâle: « touk touk » et « rro rro »; de la femelle: « kwak kwak » ou « kwek kwek ».

237. - *Netta rufina* (Pallas)



Krooneend - Nette à huppe rousse
1 ♂ 2 ♀

N° 237 - KROONEEND

Netta rufina (Pallas). - 1/5.

Orde ANSERIFORMES.

Familie ANATIDÆ.

Woont plaatselijk in het Oosten van Spanje, het Zuiden van Frankrijk en enige landen van het midden en het Oosten van Europa en gematigd Azië. Overwintert meer in het Zuid-Oosten van Europa en het Zuiden van Azië. Wordt van tijd tot tijd in België gevonden.

Bezoekt zoetwater, met riet en andere waterplanten omhoog, evenals brak- en zelfs zoutwater. Nestelt tussen gras, zegge en kreupelhout, waar het nest door de plantengroei wel verborgen is. Nest van gras, stengels, riet, twijgjes van struiken, enz., met pluimen en dons; 6-12 eieren van verschillende kleuren, van grijs- roomachtig tot bleekgroen; één broedsel.

Plantaardig en dierlijk voedsel : blade- ren, wortels en zaden van waterplanten, kleine vissen en kikvorsen, schaaldieren, weekdieren, kerfdieren en larven. De stem klinkt « kurrr » of « karr » en « rerrr ».

N° 237 - NETTE A HUPPE ROUSSE

Netta rufina (Pallas). - 1/5.

Orde ANSERIFORMES. - Familie ANATIDÆ.

Habite localement dans l'est de l'Espagne, dans le sud de la France et dans quelques pays du centre et de l'est de l'Europe et de l'Asie tempérée. Hiverne plus au sud-est de l'Europe et au sud de l'Asie. Se rencontre de temps en temps en Belgique.

Fréquente les eaux douces, bien garnies de roseaux et autres plantes aquatiques et également les eaux saumâtres et même salées. Niche parmi les herbes, laïches et broussailles, où le nid est bien caché par la végétation. Nid d'herbes, tiges, roseaux, brindilles de buissons, etc., avec plumes et duvet; 6-12 œufs, de couleur variable, du crème grisâtre au vert pâle; une nichée.

Régime végétal et animal: feuilles, racines et graines de plantes aquatiques, petits poissons et grenouilles, crustacés, mollusques, insectes et larves. La voix est représentée par « kurrr » ou « karr » et « rerrr ».

N° 238 - TAFELEEND

Aythya ferina (Linné). - 1/7.

Orde ANSERIFORMES. - Familie ANATIDÆ.

Bewoont Zuid-Europa vanaf de breedte van Zuid-Zweden; Algerië en Tunesië; in Azië de Aralo-Kaspische streek door Azië tot Mongolië en Kamtchatka. Brengt de winter door in het Zuiden van Europa, Egypte en het Zuiden van Azië.

Bezoekt zoetwater met beschutting van hoge planten; in de winter alle soorten water, doch zelden zout- of brakwater. Nestelt zeer dicht bij het water, zoniet er in; nest dikwijls vlottend, gevormd van oude rietstengels, pluimen en dons; 6-11 eieren, groengrijs of rosachtig; één broedsel.

Haar voedsel bestaat hoofdzakelijk uit waterplanten die onder water groeien en die zij al duikend bemachtigt; ook uit kleine schaaldieren, weekdieren, wormen, kerfdieren, enz. Nogal welbekaamd wild. Haar roep gelijkt op « karr » of koerr », « woek », « woek koe-koek », « glrrr », « gagagagag grei grei », « bibi », « piuk piuk ».

238. - *Aythya ferina* (Linné)



Tafeleend - Fuligule milouin
1 ♂ 2 ♀

N° 238 - FULIGULE MILOUIN

Aythya ferina (Linné). - 1/7.

Orde ANSERIFORMES.

Familie ANATIDÆ.

Habite l'Europe au sud de la latitude du sud de la Suède; l'Algérie et la Tunisie; en Asie, de la région Aralo-Caspienne à travers l'Asie jusqu'à la Mongolie et le Kamtchatka. Passe l'hiver au sud de l'Europe, en Egypte et dans le sud de l'Asie.

Recherche les eaux douces offrant des refuges de hautes plantes; en hiver, toutes espèces d'eaux, mais rarement les eaux salées ou saumâtres. Niche très près de l'eau, sinon dans l'eau; nid souvent flottant, formé de vieilles tiges de roseaux, plumes et duvet; 6-11 œufs, gris verdâtre ou roussâtre; une couvée. Sa nourriture consiste principalement de plantes aquatiques croissant sous l'eau et que l'oiseau recueille en plongeant, puis aussi de petits crustacés, mollusques, vers, insectes, etc. Gibier assez estimé. Son cri ressemble à « carr » ou « courr », « wouc », « wouc coucou », « glrrr », « gagagagag grai grai », « bibi », « piuc piuc ».

239. - *Aythya nyroca nyroca* (Güldenstädt)



Witoogeend - Fulignle nyroca
1 ♂ 2 ♀

N° 239 - WITOOGEEND

Aythya nyroca nyroca (Güldenstädt).

- 1/4.

Orde ANSERIFORMES.

Familie ANATIDÆ.

Bewoont het Noord-Westen van Afrika, het Zuiden van Europa, in het Noorden tot Duitsland, Polen door Rusland tot het Zuid-Westen van Siberië, en het Westen tot het midden van Azië. Overwintert in de gewesten van de Middellandse Zee, in de keerkringstreken van Afrika en in Zuid-Azië. Wordt zelden in België gevonden.

Houdt zich doorgaans op in zoetwater; in haar winterverblijfplaatsen in Azië, soms in de zee. Nestelt in de rietvelden en andere grote waterplanten; nest van gras, zegge, pluimen en dons; 7-11 bleekrosachtige eieren; één legsel.

Overwegend plantaardig voedsel, planten die onder water groeien, al duikende ingezameld; dierlijk voedsel bestaande uit soorten die gewoonlijk door de eenden geëten worden. Gewaardeerd wild. Roep gelijkt op « kek, kek », « kurr kurr » en « gerrr gerrr ».

N° 239 - FULIGULE NYROCA

Aythya nyroca nyroca (Güldenstädt). - 1/4.

Orde ANSERIFORMES. - Familie ANATIDÆ.

Habite le nord-ouest de l'Afrique, le sud de l'Europe, au nord jusqu'à l'Allemagne, la Pologne à travers la Russie jusqu'au sud-ouest de la Sibérie, et l'ouest jusqu'au centre de l'Asie. Hiverné dans les régions de la Méditerranée, en Afrique tropicale et dans le sud de l'Asie. Se rencontre rarement en Belgique.

Se tient généralement sur les eaux douces; dans ses quartiers d'hiver en Asie, parfois sur mer. Niche dans les champs de roseaux et autres grandes plantes aquatiques; nid d'herbes, laïches, plumes et duvet; 7-11 œufs, roussâtre pâle; une ponte.

Régime végétal prépondérant, plantes croissant sous l'eau, récoltées en plongeant; nourriture animale consistant en espèces généralement mangées par les canards. Gibier estimé. Cri ressemble à « kek, kek », « kurr kurr » et « gherrr gherrr ».

N° 240 - KUIFEEND

Aythya fuligula (Linné). - 1/5.

Orde ANSERIFORMES. - Familie ANATIDÆ.

Bewoont het Noorden van Europa en Azië; in Europa in het Zuiden tot Engeland en Holland, van Duitsland tot Roemenië en Rusland; in Azië van de Kaspische streek tot Mongolië. Overwintert in het Zuiden van Europa tot in de keerkringstreken van Afrika, in het Zuiden van Azië en in Maleisië. In België overvloedig bij de doortochten, dikwijls in grote benden.

Bezoekt zoetwater, bij voorkeur omboord met hoge plantengroei; gaat zelden op zee. Nest bij het water, verborgen tussen de hoge moerasplanten, gevormd van gras, pluimen en dons; 7-10 eieren, groengrijs of bleek-bruingeel; één broedsel.

Eet meer dieren dan planten: kleine kikvorsen, weekdieren, kerfdieren, gras en planten van de bodem, al duikende verzameld. Wild van weinig aantrekkelijke smaak. Roep klinkt: « koerr koerr » of « karr karr », « kwork kork », « kwerkokork », « gu gu », « goï goïa ».

N° 240 - FULIGULE MORILLON

Aythya fuligula (Linné). - 1/5.

Orde ANSERIFORMES.

Familie ANATIDÆ.

Habite le nord de l'Europe et de l'Asie; en Europe au sud jusqu'à l'Angleterre et la Hollande, de l'Allemagne à la Roumanie et la Russie; en Asie, de la région Caspienne à la Mongolie. Hiverné au sud de l'Europe jusqu'en Afrique tropicale, dans le sud de l'Asie et en Malaisie. En Belgique, abondant aux passages, souvent en grosses bandes.

Recherche les eaux douces, de préférence garnies de haute végétation; va rarement en mer. Nid près de l'eau, caché entre les hautes plantes de marais, formé d'herbes, plumes et duvet; 7-10 œufs, gris verdâtre ou jaune pâle brunâtre; une nichée.

Régime plus animal que végétal: petites grenouilles, mollusques, insectes, herbes et plantes du fond de l'eau recueillies en plongeant. Gibier de goût médiocre. Cri s'exprime par « courr courr » ou « carr carr », « quorc corc », « quercorc », « gu gu », « ghoï ghoïa ».

240. - *Aythya fuligula* (Linné)



Kuifeend - Fulignle morillon
1 ♂ 2 ♀

241. - *Aythya marila marila* (Linné)



Toppereend - Fuligule milouinan

1 ♂ 2 ♀

N° 241 - FULIGULE MILOUINAN

Aythya marila marila (Linné). - 1/7.

Orde ANSERIFORMES. - Famille ANATIDÆ.

Habite le nord de l'Europe et de l'Asie, au sud jusqu'à la latitude de Bornholm, à travers la Russie. Hiverne plus au sud jusqu'aux rives nord de la Méditerranée, en Asie, au golfe Persique, en Chine, au Japon, aux îles Philippines. D'autres formes géographiques se trouvent dans l'est de l'Asie et en Amérique.

En été fréquente les eaux douces, lacs, marais et toundras; en hiver se tient en mer dans baies et estuaires, bouches de fleuves non loin des côtes. Niche près de l'eau, souvent en petites colonies; nid plus ou moins caché par la végétation, construit d'herbes et autres plantes, plumes et duvet; 7-11 œufs, gris olivâtre; une couvée.

Canard plongeur. Nourriture principalement animale: mollusques, crustacés, vers, insectes, puis du zostère et, surtout en été, d'autres plantes aquatiques. Gibier de réputation douteuse.

Oiseau silencieux: on entend rarement son cri: « karr karr karr ».

N° 242 - BRILEEND

Bucephala clangula clangula (Linné). - 1/5.


Orde ANSERIFORMES. - Famille ANATIDÆ.

Bewoont het Noorden en plaatselijk het midden en het Oosten van Europa, Siberië en de steppen der Kirghizen tot Mongolië. Overwintert in het Westen en het Zuiden van Europa en in het Zuiden van Azië.

Leeft in de meren en rivieren met oude bossen omhoog; houdt zich veel in zee na de voortplantingstijd. Nestelt in de holten van oude bomen; aanvaardt gemakkelijk de nesten die door de mensen aangelegd werden met het doel een zeker aantal eieren weg te nemen die het wijfje tot een bepaalde grens vervangt; nest alleen met dons gevoerd; 6-15 blauwgroene eieren; één broedsel.

Bijna uitsluitend dierlijk voedsel: weekdieren, schaaldieren, wormen, kerfdieren, enz., al duikende gevangen. Haar vlees heeft de walgelijke smaak van visolie. Zwijgzame vogel; zijn roep luidt als « krria » of « knirrr », of nog « wah wah ».

242. - *Bucephala clangula clangula* (Linné)



Brileend - Garrot à œil d'or

1 ♂ 2 ♀

N° 241 - TOPPEREEND

Aythya marila marila (Linné). - 1/7.

Orde ANSERIFORMES.

Famille ANATIDÆ.

Bewoont het Noorden van Europa en Azië, in het Zuiden tot de breedte van Bornholm, door Rusland. Overwintert meer naar het Zuiden tot de noordoeveren van de Middellandse Zee, in Azië, de Perzische golf, China, Japan, de Philipijnen. Andere gewestelijke vormen bevinden zich in het Oosten van Azië en in Amerika.

Bezoekt in de zomer zoetwater, meren, moerassen en toendra's; houdt zich in de winter in baaien en inhammen, riviermondingen niet ver van de kust. Nestelt bij het water, dikwijls in kleine koloniën; nest min of meer door de plantengroei verborgen, gebouwd met gras en andere planten, pluimen en dons; 7-11 olivagrijze eieren; één broedsel.

Duikend. Vooral dierlijk voedsel: weekdieren, schaaldieren, wormen, kerfdieren, dan zeegras en, vooral in de zomer, andere waterplanten. Als wild weinig befaamd.

Zwijgzame vogel; zijn roep: « karr karr karr » wordt zelden gehoord.

N° 242 - GARROT A ŒIL D'OR

Bucephala clangula clangula (Linné).

- 1/5.

Orde ANSERIFORMES.

Famille ANATIDÆ.

Habite le nord et localement le centre et l'est de l'Europe, la Sibérie et les steppes Kirghises jusqu'à la Mongolie. Hiverne dans l'ouest et le sud de l'Europe et au sud de l'Asie.

Vit dans les lacs et rivières bordés de vieilles forêts; après la saison de reproduction se tient beaucoup en mer. Niche dans les cavités de vieux arbres; adopte facilement les nids artificiels placés par l'homme pour prélever un certain nombre d'œufs que la femelle continue à remplacer jusqu'à une certaine limite; nid seulement garni de duvet; 6-15 œufs, vert bleuâtre; une nichée.

Nourriture presque exclusivement animale: mollusques, crustacés, vers, insectes, etc., pris en plongeant. Sa chair a le goût détestable de l'huile de poisson. Oiseau silencieux; son cri sonne comme « krria » ou « knirrr », encore « wah wah ».

243. - *Clangula hyemalis* (Linné)



IJseend - Harelde de Miquelon
1 ♂ 2 ♀

N° 243 - IJSEEND

Clangula hyemalis (Linné). - 1/6.

Orde ANSERIFORMES.

Familie ANATIDÆ.

Bewoont de Noordpoolstreken van Europa, Azië en Amerika. Overwintert meer naar het Zuiden, tot de Noordzee, de Oostzee, de Zwarte Zee, het Noorden van Perzië, China en Japan, het midden der Verenigde Staten.

Bezoekt in de zomer zoetwater, zeldzamer op zoutwater; verblijft, buiten de broedtijd, bijna altijd op zee, dikwijls ver van de kusten, zelden op binnenwaters. Nest gelegen op de eilandjes der meren, in de toendra, soms in de rotsen; gevormd van gras dat opgehoopt is in een putteke en overdekt met een laag dons; 6-8 olijfgroene eieren; één legsel. Bijna uitsluitend dierlijk voedsel, al dui-kende bemachtigd: weekdieren, schaaldieren, wormen, kerfdieren; enige wieren en waterplanten. Luidruchtige vogel; stemgeluiden: « kah kah koraloewee », « aa ooliek » of « a a ooliek », « a oewe-lee a oewelee », « kalo-kaloo », « er-vee », « ved », « vahd » of « vood ».

N° 243 - HARELDE DE MIQUELON

Clangula hyemalis (Linné). - 1/6.

Ordre ANSERIFORMES. - Famille ANATIDÆ.

Habitè les régions arctiques de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique. Hiverne plus au sud, jusqu'à la mer du Nord, la mer Baltique, la mer Noire, le nord de la Perse, la Chine et le Japon, le centre des Etats-Unis.

En été recherche les eaux douces, plus rare sur les eaux salées; en dehors du temps de la nidification, réside presque toujours en mer, souvent loin des côtes, rarement sur des eaux intérieures. Nid situé sur les îlots des lacs, dans la toundra, parfois dans les rochers; formé d'herbes entassées dans quelque dépression et recouvertes d'une couche de duvet; 6-8 œufs, roux olive; une ponte.

Nourriture presque complètement animale, prise en plongeant: mollusques, crustacés, vers, insectes; quelques algues et plantes aquatiques. Oiseau bruyant; cris: « cah cah coraloué », « aa aulic » ou « a a aulic », « a ouélé a ouélé », « calo-caloo », « èrvé », « ved », « vahd » ou « vood ».

N° 244 - BRUINE ZEEËEND

Melanitta fusca fusca (Linné). - 1/7.

Orde ANSERIFORMES. - Famille ANATIDÆ.

Bewoont het Noorden van Europa en het Westen van Siberië. Overwintert in het Zuiden tot de Noordzee, de Oostzee, de Zwarte Zee en de Kaspische Zee. Andere ondersoorten bevinden zich in het Oosten van Siberië en het Noorden van Amerika.

Bezoekt in de zomer zoetwater, meren, rivieren, zowel in de beboste streken als in de open toendra; houdt zich na de zomer op zee, aan de riviermondingen, in de inhammen. Nestelt in de hoge plantengroei der moerassen, tussen de struiken, aan de voet van de bomen der beboste streken van het Noorden; nest gevormd van een hoop gras, met een laag dons en pluimen; 5-8 roomkleurige of rosachtige eieren; één broedsel.

Uitsluitend zeevoedsel, vooral weekdieren, schaaldieren. Stem: « kraa kraa » of « koarr koarr ».

244. - *Melanitta fusca fusca* (Linné)



Bruine Zeeëend - Macreuse brune
1 ♂ 2 ♀

N° 244 - MACREUSE BRUNE

Melanitta fusca fusca (Linné). - 1/7.

Orde ANSERIFORMES.

Familie ANATIDÆ.

Habite le nord de l'Europe et l'ouest de la Sibérie. Hiverne au sud jusqu'à la mer du Nord, la mer Baltique, la mer Noire et la mer Caspienne. D'autres sous-espèces se trouvent à l'est de la Sibérie et au nord de l'Amérique.

En été, recherche les eaux douces, lacs, rivières, aussi bien dans les régions boisées que dans la toundra ouverte; après l'été se tient en mer, aux bouches des fleuves, dans les estuaires. Niche dans la haute végétation des marais, entre les buissons, au pied des arbres des régions boisées du nord; nid formé d'un tas d'herbes, avec couche de duvet et plumes; 5-8 œufs, couleur crème ou rous-sâtre; une couvée.

Nourriture exclusivement marine, sur-tout mollusques, crustacés. Cri: « kraa kraa » ou « koarr koarr ».

245. - *Melanitta perspicillata* (Linné)



Brilzeeënd - Macreuse à lunettes
1 ♂ 2 ♀

N° 245 - MACREUSE A LUNETTES

Melanitta perspicillata (Linné). - 1/5.

Orde ANSERIFORMES. - Famille ANATIDÆ.

Habite le nord de l'Amérique; hiverne sur les côtes des Etats-Unis, à l'est dans l'Atlantique jusqu'à la Floride, à l'ouest dans le Pacifique jusqu'à la Californie; accidentellement sur les côtes de l'ouest de l'Europe; exceptionnellement en Belgique.

En été recherche les eaux douces, aussi bien dans la toundra que dans les régions boisées du nord. Nid caché dans la végétation des plaines, sous les buissons ou les branches pendantes des conifères, dans les endroits boisés; établi dans quelque dépression du sol, garni d'herbes et de duvet; 5-7 œufs, blanc crème ou roussâtre; une ponte.

La nourriture est presque totalement animale et se trouve en plongeant: mollusques, crustacés, étoiles, concombres et anémones de mer, du zostère et des algues. Oiseau silencieux. Cris: «pouc pouc» et «clouc clouc».

N° 245 - BRILZEEËND

Melanitta perspicillata (Linné). - 1/5.

Orde ANSERIFORMES.

Famille ANATIDÆ.

Bewoont het Noorden van Amerika; overwintert op de kusten van de Verenigde Staten, in het Oosten langs de Atlantische Oceaan tot Florida, in het Westen langs de Stille Oceaan tot Californië; toevallig op de kusten van West-Europa; bij uitzondering in België. Bezoekt in de zomer zoetwater, zowel in de toendra als in de beboste streken van het Noorden. Nest verborgen in de plantengroei der vlakten, onder de struiken of de hangende takken der kegelvruchtbomen, in de beboste plaatsen; geplaatst in een holte van de grond, bekleed met gras en dons; 5-7 roomwitte of rosachtige eieren; één legsel.

Het voedsel is bijna geheel dierlijk en wordt al duikende gevangen: weekdieren, schaaldieren, zeesterren, zeekommers, anemonen, zeegras en wieren. Zwijgzame vogel. Roep: «poek poek» en «kloek kloek».

N° 246 - ZWARTE ZEEËEND

Melanitta nigra nigra (Linné). - 1/4.


Orde ANSERIFORMES. - Famille ANATIDÆ.

Bewoont het Noorden van Europa en Siberië, tot de Lena. Overwintert aan de Oostzee, de Noordzee en de westelijke kusten van Europa tot Afrika. Een andere ondersoort bezet het Oosten van Siberië en het Noorden van Amerika.

Bezoekt in de zomer het zoetwater van de toendra's en de moerassen van het Noorden; houdt zich na de kweektijd uitsluitend op in zee. Nestelt in de moerassen, soms op rotsige of beboste plaatsen. Nest gebouwd met gras en dons op een droge plaats niet ver van het water; 5-7 roomkleurige of rosachtige eieren; één broedsel.

Het bij voorkeur dierlijk voedsel wordt al duikende gevangen: weekdieren, vooral mosselen, schaaldieren en, in zoetwater, ook kerfdieren, wormen en enige planten die in het water groeien. De Zeeëenden zijn als wild te versmaden. Geroepen: «kurr», «korrr», «toek toek», «skruk-luk», «tu tu tu tu», «re re re re».

246. - *Melanitta nigra nigra* (Linné)



Zwarte Zeeëend - Macreuse noire
1 ♂ 2 ♀

N° 246 - MACREUSE NOIRE

Melanitta nigra nigra (Linné). - 1/4.


Orde ANSERIFORMES.

Famille ANATIDÆ.

Habite le nord de l'Europe et de la Sibérie, jusqu'à la Léna. Hiverne à la mer Baltique, la mer du Nord et les côtes ouest de l'Europe jusqu'en Afrique. Une autre sous-espèce occupe l'est de la Sibérie et le nord de l'Amérique. En été fréquente les eaux douces des toundras et marais du nord; après la nidification, se tient exclusivement en mer. Niche dans les marais, parfois dans des endroits rocheux ou boisés. Nid construit d'herbes et de duvet sur un endroit sec non loin de l'eau; 5-7 œufs, de couleur crème ou roussâtre; une couvée.

La nourriture, principalement animale, est prise en plongeant: mollusques, surtout moules, crustacés et, dans les eaux douces, aussi des insectes, vers et quelques plantes croissant dans l'eau. Les Macreuses sont un gibier détestable. Cris: «kurr», «korrr», «touc touc», «scruck-luk», «tū tū tū tū», «re re re re».

247. - *Somateria mollissima mollissima* (Linné)



Eidereend - Eider à duvet

1 ♂ 2 ♀

N° 247 - EIDER A DUVET

Somateria mollissima mollissima (Linné). - 1/6.

Ordre ANSERIFORMES. - Famille ANATIDÆ.

Niche au nord de l'Europe, localement en Ecosse, Bretagne, Hollande, Danemark, dans quelques îles de la Baltique. En hiver erre sur les côtes sud de la Baltique, jusqu'au sud de la France; exceptionnellement plus au sud, rarement à l'intérieur des terres. D'autres sous-espèces se trouvent dans le nord-est de la Sibérie et dans le nord de l'Amérique.

Même en été, ne s'éloigne pas de la mer. Niche dans des îlots, dans les dunes, sur des côtes rocheuses, souvent en colonies. Nid dans quelque cavité du sol, à l'abri de la végétation ou d'une saillie de roche; construit d'herbes et abondamment garni de duvet; 4-6 œufs, olive pâle ou roux verdâtre; une ponte.

Nourriture récoltée en plongeant, principalement mollusques, étoiles de mer, etc.; un peu d'algues et autres plantes marines. Voix du mâle: « ou-hou », « ah-ha », « aw aw », « ah ou », « ouw ouw »; de la femelle: « korr korr korr », ou « krrr krrr krrr ».

N° 248 - GROTE ZAAGBEK

Mergus merganser merganser Linné. - 1/8.

Ordre ANSERIFORMES. - Famille ANATIDÆ.

Woont in geheel Europa, vooral in het Noorden, doch afwezig in het Westen vanaf de Oostzee; in Azië in het Noorden en van Turkestan tot Mongolië. Overwintert meer in het Zuiden, met inbegrip van het Westen van Europa, in het Noorden van Afrika, het Zuid-Westen van Azië. Andere ondersoorten worden gevonden in zekere streken van Azië en Amerika.

In de zomer zoekt hij zoetwater op, zelfs op beboste plaatsen; na de nesttijd wordt hij in zee gevonden, zowel als in de binnenwaters. Nestelt bij voorkeur in een boomholte, bij ontbreken daarvan in een rotspleet, tussen stenen, in een hol in de grond; nest bestaande uit gras, pluimen en dons; 7-12 groenroze eieren; één legsel.

Uitsluitend dierlijk voedsel, bijna alleenlijk vis, enige schaaldieren en kerfdieren. Het vlees van de Zaagbekken heeft een slechte smaak. Vrij gezellig, dikwijls in kleine gezelschappen; uitstekende duiker. Roepen van het mannetje: « ba-o-bab », « darr-dorr-darr », « gagaga »; van het wijfje: « karr karr », « kèrr kèrr », « èkèkèk ».

248. - *Mergus merganser merganser* Linné



Grote Zaagbek - Harle bièvre

1 ♂ 2 ♀

N° 247 - EIDEREEND

Somateria mollissima mollissima

(Linné). - 1/6.

Orde ANSERIFORMES.

Familie ANATIDÆ.

Nestelt in het Noorden van Europa, plaatselijk in Schotland, Bretagne, Holland, Denemarken, op enige eilanden van de Oostzee. Zwerft in de winter op de zuidelijke kusten der Oostzee, tot het Zuiden van Frankrijk; bij uitzondering meer in het Zuiden, zelden in het binnenland. Andere ondersoorten bevinden zich in het Noord-Oosten van Siberië en het Noorden van Amerika.

Verwijdert zich zelfs in de zomer niet van de zee. Nestelt op de eilandjes, in de duinen, op de rotsige kusten, dikwijls in koloniën. Nest in een holte van de grond, onder de plantengroei of een rotsuitstek; gebouwd met gras en overvloedig met dons bekleed; 4-6 bleek-olijfachtige of groenroze eieren; één legsel.

Voedsel al duikende gevangen, vooral weekdieren, zeesterren, enz.; een weinig wieren en andere zeeplanten. Stem van het mannetje: « oe hoe », « ah-ha », « aw aw », « ah oe », « ouw ouw »; van het wijfje: « korr korr korr » of « krrr krrr krrr ».

N° 248 - HARLE BIEVRE

Mergus merganser merganser Linné.

- 1/8.

Ordre ANSERIFORMES.

Familie ANATIDÆ.

Habite toute l'Europe, surtout le nord, mais absent de l'ouest à partir de la mer Baltique; en Asie dans le nord et depuis le Turkestan jusqu'à la Mongolie. Hiverné plus au sud, y compris l'ouest de l'Europe, dans le nord de l'Afrique, le sud-ouest de l'Asie. D'autres sous-espèces se rencontrent dans certaines régions de l'Asie et de l'Amérique.

En été recherche les eaux douces, même dans des endroits boisés; après la saison des nids se rencontre en mer aussi bien que sur les eaux intérieures. Niche de préférence dans cavité d'arbre, à défaut, dans crevasse de rocher, entre les pierres, dans un terrier; nid composé d'herbes, plumes et duvet; 7-12 œufs, roux verdâtre; une couvée.

Nourriture complètement animale, presque exclusivement du poisson, un peu de crustacés et d'insectes. La chair des Harles a un mauvais goût. Assez sociable, souvent en petites compagnies; excellent plongeur. Cris du mâle: « ba-o-bab », « darr-dorr-darr », « gagaga »; de la femelle: « karr karr », « kèrr kèrr », « èkèkèk ».

249. - *Mergus serrator* Linné



Middelste Zaagbek - Harle huppé
1 ♂ 2 ♀ 3 Donskleed - En duvet

N° 249 - MIDDELSTE ZAAGBEK

Mergus serrator Linné. - 1/6.

Orde ANSERIFORMES.

Familie ANATIDÆ.

Bewoont het Noorden van Europa, van Azië en Amerika, in het Zuiden tot de Britse eilanden, Holland, Duitsland, door Rusland. Overwintert meer in het Zuiden, tot de kusten van de Middellandse Zee in het Noorden van Afrika, het Zuiden van gematigd Azië en het Zuiden van Noord-Amerika.

Bezoekt in de zomer het zoetwater van het hoge Noorden en soms de kusten van de zee. Nestelt op de grond niet ver van het water, verborgen onder de plantengroei, dikwijls tussen stenen, soms in een ondiep hol; nest van gras, bladeren, pluimen en dons; 7-12 groenroze eieren; één broedsel.

Voedt zich bijna uitsluitend met vis, al duikende gevangen, dan enige schaaldieren, wormen en kerfdieren. Vergaderen dikwijls in kleine groepen. Stem: «karr», «korrr» of «kerr», «kwark», «da-ah», «gerr», «gragrag».

N° 249 - HARLE HUPPE

Mergus serrator Linné. - 1/6.

Orde ANSERIFORMES. - Familie ANATIDÆ.

Habite le nord de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique, au sud jusqu'aux Iles Britanniques, la Hollande, l'Allemagne, à travers la Russie. Hiverne plus au sud, jusqu'aux côtes de la Méditerranée au nord de l'Afrique, au sud de l'Asie tempérée et au sud de l'Amérique du Nord.

En été, fréquente les eaux douces du haut nord et parfois les côtes de la mer. Niche à terre, non loin de l'eau, caché sous la végétation, souvent entre des pierres, parfois dans un terrier peu profond; nid d'herbes, feuilles, plumes et duvet; 7-12 œufs, roux verdâtre; une nichée.

Se nourrit presque exclusivement de poisson, capturé en plongeant, ensuite quelques crustacés, vers et insectes. Se réunissent souvent en petits groupes. Cris: «karr», «korrr» ou «kerr», «kwark», «da-ah», «gerr», «gragrag».

N° 250 - NONNETJEZAAGBEK

Mergus albellus Linné. - 1/5.

Orde ANSERIFORMES. - Familie ANATIDÆ.

Woont in het Noorden van Europa en Azië, plaatselijk in de Dobroedja. Overwintert meer in het Zuiden tot de Middellandse Zee, de Zwarte Zee en het midden van Azië.

Houdt zich in de zomer op in het zoetwater van de beboste streken; na de kweektijd in alle soorten zoetwater, soms in de zee bij de kusten; dikwijls in kleine benden. Nestelt niet ver van het water in een boomholte, zoniet in de nestkassen door de mensen vervaardigd met het doel hem een zeker aantal eieren te ontnemen. Nest van mos, pluimen en dons; 6-9 rosachtig-rooinkleurige eieren; één broedsel.

Voedt zich bijna uitsluitend met vissen al duikende gevangen; bijkomstig met schaaldieren, zoetwater-weekdieren, kerfdieren. Roepen: «karr», «korrr», «krrr», «kek», «kurriek», «rroh».

250. - *Mergus albellus* Linné



Nonnetjezaagbek - Harle piette
1 ♂ 2 ♀

N° 250 - HARLE PIETTE

Mergus albellus Linné. - 1/5.

Orde ANSERIFORMES.

Familie ANATIDÆ.

Habite dans le nord de l'Europe et de l'Asie, localement dans la Dobroudja. Hiverne plus au sud jusqu'à la mer Méditerranée, la mer Noire et le centre de l'Asie.

En été se tient dans les eaux douces dans des régions boisées; après la reproduction, dans toutes espèces d'eaux douces, parfois dans la mer près des côtes; souvent en petites bandes. Niche non loin de l'eau dans une cavité d'arbre, sinon dans des nichoirs artificiels placés à son intention pour lui soustraire un certain nombre d'œufs. Nid de mousse, plumes et duvet; 6-9 œufs, crème roussâtre; une ponte.

Se nourrit presque exclusivement de poissons capturés en plongeant; accessoirement de crustacés, de mollusques d'eau douce, d'insectes. Cris: «karr», «korrr», «krrr», «kek», «currique», «rroh».

251. - *Phalacrocorax carbo sinensis* (Shaw & Nodder)



Grote Aalscholver - Grand Cormoran
1. Volwassen - Adulte - 2. Jong - Jeune

N° 251 - GROTE AALSCHOLVER

Phalacrocorax carbo sinensis (Shaw en Nodder). - 1/9.

Orde PELECANIFORMES. - Familie PHALACROCORACIDÆ.

Bewoont het midden en het Zuiden van Europa, in het Noorden tot de Noordzee, in het Zuiden tot de Middellandse Zee; ook in Azië, in het Zuiden van Siberië. De bewoners van het Noorden overwinteren in het Zuiden, voornamelijk in de streek van de Middellandse Zee. Zoekt, vooral in de nesttijd, eerder zoetwater op dan de zee; nestelt bij voorkeur op de bomen, zo nodig op de grond in riet of op rotsen; doorgaans in koloniën. Nest van lichte takken, met van binnen riet, stro, gras, biezen, enz.; 4-5 groenblauwe eieren; één broedsel. Eet uitsluitend vissen. Roepen : « kroak kroak », « kro-kro-kro », « gorrr », « gei gei gei ». Heel het lichaam van de vogel verspreidt een sterk onaangename geur, die zelfs bij de opgevolde exemplaren aanhoudt. Wordt in China op de visvangst afgericht, evenals een nabijstaande ondersoort in Japan.

N° 251 - GRAND CORMORAN

Phalacrocorax carbo sinensis (Shaw et Nodder). - 1/9.

Ordre PELECANIFORMES. - Famille PHALACROCORACIDÆ.

Habite le centre et le sud de l'Europe, au nord jusqu'à la mer du Nord et la mer Baltique, au sud jusqu'à la Méditerranée; également en Asie au sud de la Sibérie. Les habitants du nord hivernent au sud, notamment dans la région de la Méditerranée. Surtout en temps de nidification, recherche plutôt les eaux douces que la mer; niche de préférence sur des arbres, au besoin sur le sol dans les roseaux ou sur des rochers; généralement en colonies. Nid de légères branches, l'intérieur garni de roseaux, paille, herbes, joncs, etc.; 4-5 œufs, bleu verdâtre; une nichée. Régime exclusivement piscivore. Cris : « kroak kroak », « cro-cro-cro », « gorrr », « gai gai gai ». Tout le corps de l'oiseau répand une odeur pénétrante, désagréable, qui perdure même chez les individus naturalisés. Est dressé pour la pêche en Chine, de même qu'une sous-espèce voisine au Japon.

252. - *Phalacrocorax aristotelis aristotelis* (Linné)



Kuifaalscholver - Cormoran huppé

N° 252 - KUIFAALSCHOLVER

Phalacrocorax aristotelis aristotelis (Linné). - 1/5.

Orde PELECANIFORMES. - Famille PHALACROCORACIDÆ.

Bewoont IJsland, de Feroë-eilanden en de westelijke kusten van Europa vanaf Noorwegen tot Portugal. Nabijstaande ondersoorten zijn beschreven voor de Zwarte en de Middellandse Zee en voor de westelijke kust van Marokko. Houdt zich alleen op aan de kusten van de zee; vertoont zich zelden in het binnenland, tenzij hij er door stormen heengevoerd wordt. Verdwaalt slechts zelden op onze kust. Nestelt in de holten of op de uitsteken der rotsen; nest van zeeplanten; voegt er soms stengels van heidekruid of gras bij; 3 bleekblauwe eieren; één broedsel. Voedt zich uitsluitend met zeevis, bij het zwemmen onder water gevangen. Roep : « krok krok ».

N° 252 - CORMORAN HUPPE

Phalacrocorax aristotelis aristotelis (Linné). - 1/5.

Ordre PELECANIFORMES. - Famille PHALACROCORACIDÆ.

Habite l'Islande, les îles Féroë et les côtes ouest de l'Europe depuis la Norvège jusqu'au Portugal. Des sous-espèces voisines sont décrites des mers Noire et Méditerranée et de la côte ouest du Maroc. Ne se tient que sur les côtes de la mer; se montre rarement à l'intérieur des terres, à moins d'y être porté par les tempêtes. Ne s'égare que rarement sur notre côte. Niche dans des cavités ou sur des saillies de rocher; nid de plantes marines; y ajoute parfois des tiges de bruyère ou des herbes; 3 œufs, bleu pâle; une nichée. Se nourrit exclusivement de poissons de mer, capturés à la nage sous l'eau. Cri : « croc croc ».

253. - *Sula bassana* (Linné)



Zeezot - Fou de Bassan
1. Volwassen - Adulte - 2. Jong - Jeune

N° 253 - ZEEZOT

Sula bassana (Linné). - 1/9.

Orde PELECANIFORMES.

Familie SULIDÆ.

Bewoont IJsland, de Feroë-eilanden, de Britse eilanden evenals de Atlantische kust van het Noorden van Amerika. Overwintert meer in het Zuiden, langs de kusten van Europa en Afrika. Uitsluitend zeevogel. Nestelt in koloniën op de rotsige onbewoonde eilandjes die moeilijk genaakbaar zijn. Nest voornamelijk gevormd van zeeplanten; één bleekblauw ei; één legsel.

Eet alleen vis die hij al duikende vangt, dikwijls van een grote hoogte, waar hij zweeft om zijn prooi te bespieden. Bezoekt niet dikwijls onze kusten; wordt somtijds door hevige stormen op het binnenland geworpen. Zijn kreet klinkt « orre orre » of « ie-orrrr », dan nog « ak », « rabrabrab », « kirra kirra karra karra grog grog ».

N° 253 - FOU DE BASSAN

Sula bassana (Linné). - 1/9.

Orde PELECANIFORMES. - Familie SULIDÆ.

Habite l'Islande, les îles Féroë, les Iles Britanniques ainsi que la côte Atlantique du nord de l'Amérique. Hiverné plus au sud, le long des côtes de l'Europe et de l'Afrique.

Oiseau exclusivement marin. Niche en colonies sur des îlots rocheux inhabités et d'accès difficile. Nid formé principalement de plantes marines; 1 œuf, bleu pâle; une ponte.

Ne mange que du poisson qu'il capture en plongeant, souvent de grande hauteur où il plane pour épier sa proie. Ne visite pas souvent nos côtes; est parfois jeté à l'intérieur des terres par fortes tempêtes. Son cri résonne comme « orre orre » ou « yie-orrrr », puis encore « ack », « rabrabrab », « kirra kirra karra karra grog grog ».

N° 254 - KLEINE STORMVOGEL

Hydrobates pelagicus pelagicus (Linné). - 1/2.

Orde PROCELLARIIFORMES. - Familie PROCELLARIIDÆ.

Bewoont de kleine eilanden bij IJsland, de Feroë-eilanden en de Britse eilanden, tot de Middellandse Zee. Een plaatselijke vorm werd op de Pityusen herkend. Trekt in de winter meer naar het Zuiden.

Onvermoeibare vlucht; zwemt goed, doch moeilijke gang. Komt slechts bij het nestelen aan land; blijft overdag in het nest en gaat 's avonds naar de zee. Nest in een holte in de grond, tussen stenen, in een rotsspleet, enz.; nest zonder of met een weinig gras; één wit ei, soms aan het dik uiteinde licht gestippeld; één legsel.

Voedt zich met kleine zeedieren aan de oppervlakte gevangen, kleine stukjes dode vis en andere afval. Als men hem wil vatten, bespuut hij zijn aanvaller met een slechtriëkende olie. De muskusgeur der Stormvogels blijft het nest en de eieren lang bij. Roep: « kou-aa », « eouch-aa », « ti ti tiitiik ».

254. - *Hydrobates pelagicus pelagicus* (Linné)



Kleine Stormvogel - Pétrel tempête

N° 254 - PETREL TEMPETE

Hydrobates pelagicus pelagicus (Linné).

- 1/2.


Orde PROCELLARIIFORMES.

Familie PROCELLARIIDÆ.

Habite les petites îles voisines de l'Islande, les Féroë, les Iles Britanniques, jusqu'à la Méditerranée. Une forme locale a été reconnue aux Pityuses. Se porte plus au sud en hiver.

Vol infatigable, nage bien, mais marche difficilement. Ne vient à terre que pendant la nidification; se tient au nid pendant le jour, se rend en mer vers la nuit. Nid dans quelque trou en terre, entre les pierres éboulées, dans crevasse de rocher, etc.; nid sans ou avec un peu d'herbes; 1 œuf, blanc ou légèrement pointillé au gros bout; une ponte.

Se nourrit de petits animaux marins pris à la surface, de petits morceaux de poisson mort et d'autres détrit. Quand on veut le saisir, il asperge son agresseur d'une huile malodorante. L'odeur musquée des Pétrels s'attache longtemps au nid et aux œufs. Cri: « cou-aa », « eouch-aa », « ti ti tiitiik ».



Vorkstaartstormvogel - Pétrel cul-blanc

N° 255 - VORKSTAARTSTORMVOGEL

Oceanodroma leucorhoa leucorhoa (Vieillot). - 1/3.

Orde PROCELLARIIFORMES. - Familie PROCELLARIIDÆ.

Bewoont het Noorden van de Atlantische en van de Stille Oceaan. Nestelt in koloniën op het Westmann-eiland, bij IJsland, op de Britse eilanden en in het Noorden van Amerika. Zwerft op de zeeën van de westelijke kusten van Europa, soms in het binnenland, verdwaald in de mist of door de storm gedreven. Vertoont zich zelden in België. Graaft een nest in de veengrond, benuttigt de holten tussen stenen of een rotsspleet. Eén enkel wit ei, aan het dik uiteinde licht rood gestippeld, wordt op de grond of op een weinig gras gelegd; één legsel. Op de nestplaatsen toont hij zich vooral 's nachts bedrijvig en men hoort aanhoudend zijn zachte roep : « pioeroewiet ». Voedt zich met kleine zeedieren aan de oppervlakte gevangen, vette stoffen en afval die op de zee drijven.

N° 255 - PETREL CUL-BLANC

Oceanodroma leucorhoa leucorhoa (Vieillot). - 1/3.

Ordre PROCELLARIIFORMES. - Familie PROCELLARIIDÆ.

Habite le nord de l'Atlantique et du Pacifique. Niche en colonies dans l'île Westmann, près de l'Islande, aux îles Britanniques et dans le nord de l'Amérique. Erre sur les mers des côtes occidentales de l'Europe, parfois à l'intérieur des terres, égaré dans le brouillard ou porté par les tempêtes. Se montre rarement en Belgique. Se creuse un trou dans le sol tourbeux, utilise les cavités entre les pierres éboulées ou quelque crevasse de rocher. Un seul œuf, blanc, légèrement pointillé de rouge au gros bout, est déposé à terre ou sur un peu d'herbes; une ponte. Aux lieux de nidification, se montre surtout actif la nuit et l'on entend continuellement son cri doux : « piourouït ». Se nourrit de petits animaux marins capturés à la surface, de matières grasses et de détritits flottant sur la mer.

N° 256 - NOORDSE PIJLSTORMVOGEL

Puffinus puffinus puffinus (Brünnich). - 1/4.

Orde PROCELLARIIFORMES. - Familie PROCELLARIIDÆ.

Bewoont de Westmann-eilanden bij IJsland, de Feroë-eilanden, de westelijke kusten van Groot-Britannië en Ierland, de Madera-eilanden en de Azoren. Een welgelijkend gewestelijk ras bewoont het Westen en een ander het Oosten van de Middellandse Zee. Vertoont zich zeer zelden in België. Leeft in benden op de zee; nestelt in koloniën in holen die in de veengrond gegraven worden, soms in grazige hellingen van rotsen; nest bestaande uit een weinig gras en bladeren; één wit ei; één legsel. Voedt zich met vissen, schaaldieren, koppotigen, enz., aan de oppervlakte van de zee gevangen; is vooral 's avonds bedrijvig en 't is vooral 's nachts dat men op de nestplaatsen zijn geroepen hoort : « kitti-koe-roe », « kok-a-kok », « kok-a-roeroe ».

256. - *Puffinus puffinus puffinus* (Brünnich)



Noordse Pijlstormvogel - Puffin des Anglais

N° 256 - PUFFIN DES ANGLAIS

Puffinus puffinus puffinus (Brünnich).

- 1/4.

Ordre PROCELLARIIFORMES.

Familie PROCELLARIIDÆ.

Habite les îles Westmann près de l'Islande, les Féroé, les côtes ouest de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, les îles Madères et Açores. Une race géographique voisine habite l'ouest et une autre l'est de la Méditerranée. Se montre très rarement en Belgique. Vit en troupes sur la mer; niche en colonies dans des terriers creusés dans le sol tourbeux, parfois dans les pentes herbeuses des rochers; nid composé de quelques herbes et feuilles; 1 œuf, blanc; une ponte. Se nourrit de poissons, crustacés, céphalopodes, etc., capturés près de la surface de la mer; est surtout actif le soir et l'on entend surtout la nuit, sur les lieux de nidification, ses cris : « kitti-kou-rou », « coq-a-coq », « coq-a-rourou ».

257. - *Fulmarus glacialis glacialis* (Linné)



Noordse Stormvogel - Pétrel glacial

N° 257 - NOORDSE STORMVOGEL

Fulmarus glacialis glacialis (Linné). - 1/5.

Orde PROCELLARIIFORMES. - Familie PROCELLARIIDÆ.

Nestelt in de noordpoolstreken van Amerika en Europa, IJsland, Feroë, Britse eilanden. Een andere soort bewoont de noordpoolstreken van de Stille Oceaan.

Komt slechts zelden aan land buiten de kweektijd. Nestelt in koloniën op de kornissen en uitsteken der rotsen op de boord van de zee; nest begrensd door enige stenen die het afrollen van het enig wit ei beletten; één broedsel.

Voedt zich met schaaldieren, koppotigen, afval en krengen. Deze vogels, vooral de jonge, leveren een voedsel dat door de bewoners van het Noorden gewaardeerd wordt; hun vet en hun olie — die zij bij gelegenheid op hun aanvallers uitspuwen — leveren een uitmuntende brandolie. Zwijgzame vogel die slechts op de nestplaatsen zijn knorrende stem laat horen : « kaw », « kaw kaw », « gagagaga ».

N° 257 - PETREL GLACIAL

Fulmarus glacialis glacialis (Linné). -1/5.

Orde PROCELLARIIFORMES. - Familie PROCELLARIIDÆ.

Niche dans les régions arctiques de l'Amérique et de l'Europe, Islande, Féroë, Iles Britanniques. Une autre espèce habite les régions arctiques du Pacifique.

Ne vient que rarement à terre en dehors du temps de la nidification. Niche en colonies sur des corniches et saillies de rocher au bord de la mer; nid délimité par quelques pierres qui empêchent l'écartement de l'œuf unique, blanc; une couvée.

Se nourrit de crustacés, céphalopodes, détritiques et cadavres. Ces oiseaux, surtout les jeunes, fournissent une nourriture recherchée par les habitants du nord; leur graisse et leur huile — qu'ils crachent à l'occasion sur leurs agresseurs — sont une excellente huile à brûler. Oiseau silencieux qu'on entend seulement aux lieux de nidification, exprimant en grognant : « kaw », « kaw kaw », « gagagaga ».

258. - *Podiceps cristatus cristatus* (Linné)



Kuiffuut - Grèbe huppé

1. Paarkleed - Nuptial - 2. Voorkleed - Prénuptial

N° 258 - KUIFFUUT

Podiceps cristatus cristatus (Linné). - 1/5.

Orde COLYMBIFORMES. - Familie PODICIPIDÆ.

Bewoont Europa ten Zuiden van de 60° breedtegraad tot de Middellandse Zee, het Noorden van Afrika, het Noorden en het midden van Azië tot Mantsjoerije. Overwintert meer naar het Zuiden, in de streek van de Middellandse Zee en in Azië tot Hindoestan. Zeldzame broedvogel in België, gemener op doortocht.

Houdt zich in de zomer op zoetwater dat met een hoge plantengroei omboord is; na het nestelen bezoekt hij meer zout- of brakwater. Het nest bestaat uit een hoop verschillende waterplanten die gedeeltelijk ontbonden zijn en op het water drijven te midden van grote planten die het ter plaatse houden; 3-5 vuilwitte eieren; misschien soms twee broedsels. Voedt zich vooral met vissen onder het water gevangen, enige weekdieren, schaaldieren, kerfdieren. Roepgeluiden : « kek kek », « wark wark », « arr » of « awgrr », « greuk greuk » of « keuk keuk »; de jongen : « bili bili ».

N° 258 - GREBE HUPPE


Podiceps cristatus cristatus (Linné). - 1/5.

Orde COLYMBIFORMES. - Familie PODICIPIDÆ.

Habite l'Europe au sud du 60° degré de latitude jusqu'à la Méditerranée, le nord de l'Afrique, le nord et le centre de l'Asie jusqu'à la Mandchourie. Hiverne plus au sud, dans la région de la Méditerranée et en Asie jusqu'en Hindoustan. Nidificateur rare en Belgique, plus commun aux passages. En été, se tient sur les eaux douces bordées de haute végétation; après la nidification, fréquente plus souvent les eaux salées ou saumâtres. Le nid est un tas de diverses plantes aquatiques partiellement décomposées flottant sur l'eau au milieu de grandes plantes qui le retiennent sur place: 3-5 œufs, blanc sale; peut-être parfois deux nichées.

Se nourrit principalement de poissons capturés sous l'eau, quelques mollusques, crustacés, insectes. Cris : « kek kek », « wark wark », « arr », ou « awgrr », « greuk greuk » ou « keuk keuk »; les jeunes : « bili bili ».

259. - *Podiceps griseigena griseigena* (Boddaert)



Roodhalsfuut - Grèbe à joues grises
1. Paarkleed - Nuptial - 2. Voorkleed - Prénuptial

N° 259 - ROODHALSFUUT

Podiceps griseigena griseigena
(Boddaert). - 1/3.

Orde COLYMBIFORMES.

Familie PODICIPIDÆ.

Bewoont de oostelijke helft van Europa en het Westen van Azië. Overwintert in de streken van de Middellandse Zee en in het Noorden van Afrika. Vertoont zich vrij zelden in België. Een ander gewestelijk ras bewoont het Oosten van Azië en Noord-Amerika.

Nestelt in de lagunen en in het brakwater der riviermonden; nest van oude waterplanten die op het water drijven, te midden van de hoge plantengroei die het verbergt en weerhoudt; 4-5 vuilwitte eieren; één broedsel.

Eet kleine vissen, kikvorsen, schaaldieren, kerfdieren. Roep : « kek kek kek », « tchap »; jong : « bi bi bi ».

Bij de verschillende soorten Futen vindt men dikwijls ballen van pluimen in de maag.

N° 259 - GREBE A JOUES GRISES

Podiceps griseigena griseigena (Boddaert). - 1/3.

Orde COLYMBIFORMES. - Familie PODICIPIDÆ.

Habite la moitié est de l'Europe et l'ouest de l'Asie. Hiverne dans les régions de la Méditerranée et au nord de l'Afrique. Se montre assez rarement en Belgique. Une autre race géographique habite l'est de l'Asie et en Amérique du Nord.

Niche dans les lagunes et eaux saumâtres des bouches des rivières; nid de vieilles plantes aquatiques flottant sur l'eau, au milieu de la haute végétation qui le cache et le retient; 4-5 œufs, blanc sale; une nichée.

Mange de petits poissons, grenouilles, crustacés, insectes. Cris : « keck keck keck », « tchap »; jeune : « bi bi bi ».

Chez les différentes espèces de Grèbes on trouve souvent des pelotes de plumes dans l'estomac.

N° 260 - HOORNFUUT

Podiceps auritus (Linné). - 1/3.

Orde COLYMBIFORMES. - Familie PODICIPIDÆ.

Bewoont het Noorden van Europa, Azië en Amerika; in Europa, ten Zuiden tot Denemarken, de Baltische landen. Overwintert meer in het Zuiden, in Europa tot de Middellandse Zee. Op regelmatige doorgang in België, hoewel niet overvloedig.

Verblijft op zoetwater. Nest als de andere soorten : een hoop oude rottende waterplanten die op het water drijven, in een rietveld of in andere hoge planten die het aan het zicht onttrekken en beletten weg te drijven; 4 vuilwitte eieren; waarschijnlijk één broedsel.

Voedt zich vooral met kleine vissen, schaaldieren, weekdieren, kerfdieren, zeer weinig plantaardige stoffen. Roepen : « bibibibibib », « guwi », « giow », « girt », « grrr ».

Als zij het nest verlaten, bedekken de verschillende soorten Futen hun eieren met stoffen van de rand van het nest.

260. - *Podiceps auritus* (Linné)



Hoornfuut - Grèbe esclavon
1. Paarkleed - Nuptial - 2. Voorkleed - Prénuptial

N° 260 - GREBE ESCLAVON

Podiceps auritus (Linné). - 1/3.

Orde COLYMBIFORMES.

Familie PODICIPIDÆ.

Habite le nord de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique; en Europe, au sud jusqu'au Danemark, les Pays Baltes. Hiverne plus au sud, en Europe, jusqu'à la Méditerranée. De passage régulier en Belgique, quoique peu abondant.

Fréquente les eaux douces. Nid comme les autres espèces : un tas de vieilles plantes aquatiques en décomposition, flottant sur l'eau, dans un massif de roseaux ou autres grosses plantes qui le soustraient aux regards et l'empêchent d'aller à la dérive; 4 œufs, blanc sale; probablement une nichée.

Se nourrit principalement de petits poissons, crustacés, mollusques, insectes, très peu de matières végétales. Cris : « bibibibibib », « gui », « ghiow », « ghirt », « grrr ».

Les différentes espèces de Grèbes, quand ils quittent le nid, recouvrent les œufs avec des matières du bord du nid.

261. - *Podiceps nigricollis nigricollis* Brehm



Zwarthalsfuut - Grèbe à cou noir
1. Paarkleed - Nuptial - 2. Voorkleed - Prénuptial

N° 261 - GREBE A COU NOIR

Podiceps nigricollis nigricollis Brehm. - 1/3.

Orde COLYMBIFORMES. - Famille PODICIPIDÆ.

Niche en Irlande, Angleterre, Hollande, Danemark, Allemagne, milieu de la Russie, à travers l'Asie tempérée jusqu'en Chine et au Japon. Niche parfois en Belgique, assez rare aux passages, parfois en hiver. D'autres sous-espèces ont été reconnues en Afrique au sud du Sahara et en Amérique du Nord.

Habite les eaux douces. Se construit un nid comme les autres Grèbes : un tas de vieilles plantes aquatiques flottant sur l'eau, généralement au milieu d'un dense couvert de plantes élevées; 4 œufs, blanc souillé; probablement une nichée.

Nourriture : petits poissons capturés en plongeant, beaucoup d'insectes, quelques crustacés, mollusques. Cris : « pie-p », « bidder vidder », « bidewidewide... », « wa-ït wa-ït »; jeune : « toui toui ».

N° 262 - KLEINE FUUT

Podiceps ruficollis ruficollis (Pallas). - 1/2.

Orde COLYMBIFORMES. - Famille PODICIPIDÆ.


Nestelt in Europa, in het Noorden tot Zuid-Scandinavië, in het Oosten tot de Oeral, in het Zuiden over de Middellandse Zee tot het Noorden van Afrika. Andere gewestelijke vormen bevinden zich in het Zuiden van Afrika, in Azië, in Australië.

Leeft in zoetwater; nest min of meer verborgen tussen het riet en andere grote planten, bestaat uit een hoop drijvende afval van waterplanten; 4-6 roomwitte eieren; misschien twee broedsels.

Zelfde voedsel als de andere Futen : kleine vissen onder het water gevangen, schaaldieren, weekdieren, insecten en een weinig planten. Roep : « bibibibi » en « witwitwit ».

In geval van achtervolging trachten de Futen zich eerder door duiken dan door vliegen te redden.

262. - *Podiceps ruficollis ruficollis* (Pallas)



Kleine Fuut - Grèbe castagneux
1. Paarkleed - Nuptial - 2. Voorkleed - Prénuptial

N° 262 - GREBE CASTAGNEUX

Podiceps ruficollis ruficollis (Pallas).

- 1/2.

Orde COLYMBIFORMES.

Famille PODICIPIDÆ.

Niche en Europe, au nord jusqu'au sud de la Scandinavie, à l'est jusqu'à l'Oural, au sud dépasse la Méditerranée jusqu'au nord de l'Afrique. D'autres races géographiques se trouvent au sud de l'Afrique, en Asie, en Australie.

Vit dans les eaux douces; nid plus ou moins caché entre les roseaux ou autres grandes plantes, consiste en un tas de débris végétaux aquatiques flottant sur l'eau; 4-6 œufs, blanc crème; peut-être deux nichées.

Même régime que les autres Grèbes : petits poissons capturés sous l'eau, crustacés, mollusques, insectes et un peu de nourriture végétale. Cris : « bibibibi » et « witwitwit ».

En cas de poursuite les Grèbes tâchent de se sauver en plongeant, plutôt qu'en volant.

263. - *Colymbus immer immer* Brünnich



IJsduiker - Plongeon imbrin
1. Paarkleed - Nuptial - 2. Tussenkleed - Internuptial

N° 263 - IJSDUIKER

Colymbus immer immer Brünnich.

- 1/6.

Orde COLYMBIFORMES.

Familie COLYMBIDÆ.

Nestelt in IJsland, Groenland en in het Noorden van Amerika. Overwintert meer in het Zuiden, in Europa tot de Middellandse Zee.

Leeft uitsluitend op het water. Houdt zich gedurende de broeitijd op in zoetwater, meren, hoeken van stille rivieren. Verblijft na dit tijdstip ook dikwijls op zee. Nest bij het water gevestigd, dikwijls verborgen door een dichte bos planten; bestaat uit een kuil in de grond, min of meer met gras gevuld; twee olijf- of roskleurige gevlekte eieren; één broedsel.

Eet vooral vissen onder het water gevangen, ook schaaldieren, weekdieren, koptogen, soms een weinig plantaardig voedsel. Uitstekend duiker; vliegt goed, doch gaat moeilijk. Geroepen: « hoe hoe hoe », « gek gek » en « jap jap jap ».

N° 263 - PLONGEON IMBRIN

Colymbus immer immer Brünnich. - 1/6.

Ordre COLYMBIFORMES. - Famille COLYMBIDÆ.

Niche en Islande, au Groenland et dans le nord de l'Amérique. Hivernent plus au sud, en Europe jusqu'à la Méditerranée.

Oiseau vivant exclusivement sur l'eau. Pendant la saison de reproduction, se tient sur les eaux douces, lacs, coins de rivières tranquilles. Après cette période, réside aussi souvent sur la mer. Nid établi près de l'eau, souvent caché par une grosse touffe de plantes; consiste en une cavité du sol, plus ou moins garnie d'herbes; 2 œufs, olivâtres ou roussâtres, tachetés; une nichée.

Mange principalement des poissons capturés sous l'eau, aussi crustacés, mollusques, céphalopodes, parfois un peu de nourriture végétale. Les Plongeurs sont d'excellents plongeurs; ils volent bien, mais marchent péniblement. Cris: « hou hou hou », « ghec ghec » et « yap yap yap ».

264. - *Colymbus arcticus arcticus* Linné



Parelduiker - Plongeon à gorge noire
1. Paarkleed - Nuptial - 2. Tussenkleed - Internuptial

N° 264 - PARELDUIKER

Colymbus arcticus arcticus Linné. - 1/4.

Orde COLYMBIFORMES. - Famille COLYMBIDÆ.

Nestelt in het Noorden van Europa, in het Zuiden tot de Britse eilanden en Duitsland; gaat in de winter tot de Middellandse Zee en de Zwarte Zee. Andere ondersoorten bewonen Siberië en Noord-Amerika. Winterbezoeker, weinig talrijk in België.

Bewoont zoetwater in de zomer; houdt zich ook op in zee na de kweektijd. Nest bij het water, gebouwd met gras, mos en andere planten, doch soms worden de eieren in een naakt putteke in de grond of tussen stenen gelegd; twee olijfgroene gevlekte eieren; één broedsel.

Voedt zich vooral met vissen al duikende gevangen; daarbij schaaldieren, kerfdieren. Zijn roep luidt: « kraw kraw », « kruu kruu », « waoewa waoewa » en « hie hie hie ».

N° 264 - PLONGEON A GORGE NOIRE

Colymbus arcticus arcticus Linné. - 1/4.

Ordre COLYMBIFORMES. - Famille COLYMBIDÆ.

Niche dans le nord de l'Europe, au sud jusqu'aux Iles Britanniques et l'Allemagne; en hiver descend jusqu'à la mer Méditerranée et la mer Noire. D'autres sous-espèces habitent la Sibérie et l'Amérique du Nord. Visiteur d'hiver, peu nombreux en Belgique.

En été, fréquente les eaux douces; après la saison de nidification, se tient aussi en mer. Nid près de l'eau, construit d'herbes, mousse et autres plantes, mais parfois les œufs sont déposés dans une cavité du sol ou entre les pierres, sans litière; 2 œufs, vert olive, tachetés; une couvée.

Se nourrit principalement de poissons capturés en plongeant; en plus, des crustacés, des insectes. Son cri s'exprime par « kraw kraw », « kruu kruu », « waoewa waoewa » et « hy hy hy ».

265. - *Colymbus stellatus* Pontoppidan



Roodkeelduiker - Plongeon à gorge rousse
1. Paarkleed - Nuptial - 2. Tussenkleed - Internuptial

N° 265 - PLONGEON A GORGE ROUSSE

Colymbus stellatus Pontoppidan. - 1/5.

Orde COLYMBIFORMES. - Famille COLYMBIDÆ.

Habite le haut nord de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique. En hiver, jusqu'à la mer Méditerranée, les mers Noire et Caspienne, en Chine et au Japon, ainsi que dans le sud de l'Amérique du Nord. Se montre régulièrement en hiver en Belgique. En été, vit sur les eaux douces; après la saison de reproduction, se tient souvent en mer. Nid près de l'eau dans une petite fosse du sol garnie ou non d'herbes, feuilles de roseaux, etc.; parfois, amasse un tas de végétaux dans l'eau, près du bord; 2 œufs, olivâtres, généralement tachetés; une nichée.

Se nourrit presque exclusivement de poissons capturés à la nage sous l'eau, d'un peu de crustacés, mollusques et insectes. Cris: « ga ga gak » et « waw waw » ou « gouaw aw ».

La chair des Plongeurs est détestable.

N° 266 - STEPPENHOEN

Syrhaptus paradoxus (Pallas). - 1/3.

Orde COLUMBIFORMES. - Famille PTEROCLIDÆ.

Bewoont de woestijnen en steppen van het Zuid-Oosten van Rusland en het Westen van Azië, tot Mongolië. Zwerft, bij onregelmatige tussenpozen, in de westelijke en oostelijke streken, zelfs tot in het Westen van Europa. In België werden drie invallen waargenomen.

Nestelt in een kleine kuil die in het zand van de woestijnen gegraven wordt; 3 dicht gevlekte eieren; waarschijnlijk één legsel.

Voedt zich met zaden van alle soorten planten, evenals met jonge scheuten en bladeren. Loopt snel, vliegt machtig. Begeeft zich 's morgens en 's avonds naar de plaatsen waar het drinkwater vindt, dikwijls op grote afstand gelegen. Roepen: « kokki kokki », « tok tik tik », « kokrik », « kwik kwik » of « gjuk », « gelouk gelouk ».

266. - *Syrhaptus paradoxus* (Pallas)



Steppenhoen - Syrrhapte paradoxal
1 ♂ 2 ♀

N° 265 - ROODKEELDUIKER

Colymbus stellatus Pontoppidan. - 1/5.

Orde COLYMBIFORMES.

Famille COLYMBIDÆ.

Bewoont het hoge Noorden van Europa, Azië en Amerika. In de winter tot de Middellandse Zee, de Zwarte Zee en de Kaspische Zee, in China en Japan, evenals in het Zuiden van Noord-Amerika. Vertoont zich regelmatig in België in de winter.

Leeft in de zomer op zoetwater; houdt zich na de voortplantingstijd dikwijls op in zee. Nest bij het water in een kleine kuil in de grond, gevoerd of niet met gras, rietbladeren, enz.; stapelt soms een hoop planten op in het water, bij de boord; twee olijfvachtige, doorgaans gevlechte eieren; één broedsel.

Voedt zich bijna uitsluitend met vissen al zwemmende onder het water gevangen; een weinig schaaldieren, weekdieren en kerfdieren. Geroepen: « ga ga gak » en « waw waw » of « goewaw aw ». Het vlees van de Duikers is slecht van smaak.

N° 266 - SYRRHAPTE PARADOXAL

Syrhaptus paradoxus (Pallas). - 1/3.

Orde COLUMBIFORMES.

Famille PTEROCLIDÆ.

Habite les régions désertiques et steppiques du sud-est de la Russie et de l'ouest de l'Asie, jusqu'à la Mongolie. A intervalles irréguliers, erre dans les régions occidentales et orientales, même jusque dans l'ouest de l'Europe. Trois invasions ont été observées en Belgique.

Niche dans une petite fosse grattée dans le sable des déserts; 3 œufs, fortement tachetés; probablement une ponte.

Se nourrit de graines de toutes espèces de plantes, ainsi que de jeunes pousses et feuilles. Course rapide, vol puissant. Le matin et le soir, se rend aux endroits où il trouve de l'eau à boire, situés souvent à grande distance. Cris représentés par « kocki kocki », « tock tik tik », « kockrick », « quick quick » ou « gjuck », « gelouck gelouck ».

267. - *Burhinus ædicens ædicens* (Linné)



Griel - *Ædicnème criard*

N° 267 - GRIEL

Burhinus ædicens ædicens (Linné).

- 1/4.

Orde CHARADRIIFORMES.

Familie BURHINIDÆ.

Bewoont het midden en het Zuiden van Europa; die van het Noorden overwinteren in het Oosten van Afrika. Andere gewestelijke vormen zijn beschreven voor het Noorden van Afrika en Azië. Hij is een zeldzame verschijning in België.

Zoekt de woestijnachtige vlakten op, de steppen, de onbebouwde stenige en zandige gronden, de heide, en legt er zijn eieren in een naakt in de grond gekrabb putteke; 2-3 gevlekte roomkleurige eieren; één legsel.

Voedt zich met slakken, aardwormen, kleine kruipdieren. Vergadert in kleine benden na de nesteltijd. Is bijzonder bedrijvig bij de schemering. Roepen: « krie krie », « koerliet », « koerliwi », « kiurili », « deluwi »; jongen: « goewit » en « diek diek ».

N° 267 - *ÆDICNEME CRIARD*

Burhinus ædicens ædicens (Linné). - 1/4.

Ordre CHARADRIIFORMES. - Famille BURHINIDÆ.

Habite le centre et le sud de l'Europe; ceux du nord hivernent dans l'est de l'Afrique. D'autres formes géographiques sont décrites du nord de l'Afrique et de l'Asie. Rares apparitions en Belgique.

Recherche les plaines désertiques, steppes, terres incultes pierreuses et sablonneuses, bruyères, et dépose ses œufs dans une dépression nue, grattée dans le sol; 2-3 œufs, couleur crème, tachetés; une ponte.

Se nourrit de limaces, vers de terre, petits reptiles; après la nidification se réunit en petites bandes. Est surtout actif au crépuscule. Cris: « krie krie », « courliit », « courliwi », « kiurili », « dellui »; jeunes: « gouit » et « dick dick ».

268. - *Cursorius cursor cursor* (Latham)



Renvogel - Courvite gaulois
1. Volwassen - Adulte - 2. Jong - Jeune

N° 268 - RENVOGEL

Cursorius cursor cursor (Latham). - 1/3.

Orde CHARADRIIFORMES. - Familie CURSORIIDÆ.

Bewoont de woestijnen van het Noorden van Afrika en van het Zuid-Westen van Azië. Verdwaalt soms in het Zuiden van Europa; bij uitzondering in België waargenomen.

Bouwt geen nest, legt zijn eieren tussen de stenen of in een klein in het zand gekrabb kuiltje; 2 gevlekte rosachtige eieren; misschien meer dan één broedsel.

Loopt bijzonder vlug; leeft dikwijls in kleine benden. Voedt zich met kerfdieren, vooral met schildvleugeligen. Roept dikwijls: « kwit kwit » en « ngark ngark ».

N° 268 - COURVITE GAULOIS


Cursorius cursor cursor (Latham). - 1/3.

Orde CHARADRIIFORMES. - Familie CURSORIIDÆ.

Habite les déserts du nord de l'Afrique et du sud-ouest de l'Asie. S'égare parfois dans le sud de l'Europe; rencontré exceptionnellement en Belgique. Ne construit pas de nid; dépose ses œufs parmi les pierres ou dans une petite fosse grattée dans le sable; 2 œufs, roussâtres, tachetés; peut-être plus d'une nichée.

D'une agilité exceptionnelle à la course; vit souvent en petites bandes. Se nourrit d'insectes, principalement de coléoptères. Crie souvent: « kwit kwit » et « ngark ngark ».

269. - *Glareola pratincola pratincola* (Linné)



Vorkstaartplevier - Glaréole à collier
1. Volwassen - Adulte - 2. Jong - Jeune

N° 269 - GLAREOLE A COLLIER

Glareola pratincola pratincola (Linné). - 2/5.

Ordre CHARADRIIFORMES. - Famille CURSORIIDÆ.

Habite le sud de l'Europe, le nord de l'Afrique et le sud-ouest de l'Asie jusqu'à l'Hindoustan. Ne dépasse que rarement le sud de la France et la Hongrie; visiteur exceptionnel en Belgique.

Recherche les lagunes, estuaires et marais, de préférence salés; niche en colonies au bord des eaux; les 2-3 œufs, gris, tachetés et marbrés, sont déposés dans une dépression du sol, sans matériaux de garniture; une couvée.

Se nourrit d'insectes, surtout coléoptères et sauterelles, qu'il capture en partie au vol, comme les Hirondelles. Son cri ressemble à « kirriah kirriah ».

N° 269 - VORKSTAARTPLEVIER

Glareola pratincola pratincola (Linné).

- 2/5.

Ordre CHARADRIIFORMES.

Famille CURSORIIDÆ.

Bewoont het Zuiden van Europa, het Noorden van Afrika en het Zuid-Westen van Azië tot Hindoestan. Gaat zelden verder dan het Zuiden van Frankrijk en Hongarije; bezoekt bij uitzondering België.

Zoekt de lagunen op, de inhammen en de moerassen, bij voorkeur met zoutwater; nestelt in koloniën op de rand van het water; 2-3 grijze gevlekte en gemarmerde eieren worden gelegd in een naakte uitholling van de grond; één broedsel.

Voedt zich met kerfdieren, vooral schildvleugeligen en sprinkhanen, die hij gedeeltelijk in de vlucht vangt, zoals de Zwaluwen. Zijn roep gelijkt op « kirriah kirriah ».

270. - *Charadrius hiaticula major* Seebohm



Westerse Bontbekplevier - Gravelot à collier occidental

N° 270 - WESTERSE BONTBEKPLEVIER

Charadrius hiaticula major Seebohm. - 1/2.

Ordre CHARADRIIFORMES. - Famille CHARADRIIDÆ.

Bewoont Groot-Brittannië en België. Andere gewestelijke vormen worden gevonden in het hoge Noorden van Europa, het Noorden van Azië en Amerika, de oeverlanden van het Zuiden der Oostzee en van de Noordzee. Overwintert in het Zuiden, die van Europa aan Middellandse Zee en in Afrika.

Bewoont bij voorkeur de zeekusten, minder de oevers der meren, rivieren en binnenwaters. Nestelt dikwijls in kleine gezelschappen op de zandige stranden boven de grens der tijen of bij de binnenwaters. Het nest bestaat uit een eenvoudige uitholling van de grond, tussen stenen en schelpen; de nesten van het binnenland zijn soms gevoerd met plantenstengels waarop de 4 gevlekte rosgele eieren gelegd worden; soms twee broedsels. Voedt zich met insecten, wormen, schaaldieren, kleine weekdieren. Roept: « tuwie », « druwie », « du-iep » en « trrr »; laat in de paartijd een kleine zang horen: « troewie troewie » zacht trillend, of « tuleutuleu... djudjueu ».

N° 270 - GRAVELOT A COLLIER OCCIDENTAL

Charadrius hiaticula major Seebohm. - 1/2.


ORDRE CHARADRIIFORMES. - Famille CHARADRIIDÆ.

Habite la Grande-Bretagne et la Belgique. D'autres formes géographiques se trouvent dans le haut nord de l'Europe, le nord de l'Asie et l'Amérique, les pays riverains du sud de la mer Baltique et de la mer du Nord. Hivernent au sud, ceux de l'Europe à la Méditerranée et en Afrique.

Affectionne les côtes de la mer, plus rarement les bords des lacs, rivières et eaux intérieures. Niche souvent en petites compagnies, sur les plages sablonneuses au-dessus de la limite des marées ou près des eaux intérieures. Nid ne consiste qu'en une simple dépression du sol, parmi les pierres et les coquillages; les nids à l'intérieur des terres sont parfois garnis de tiges de plantes sur lesquelles sont déposés les 4 œufs, jaune roussâtre, tachetés; parfois deux nichées.

Se nourrit d'insectes, vers, crustacés, petits mollusques. Cris: « tuï », « druï », « du-ïp » et « trrr »; au temps de la reproduction, fait entendre un petit chant: « trouï trouï » en trille doux, ou « tuleutuleu...djudjueu ».

271. - *Charadrius dubius curonicus* Gmelin



Kleine Plevier - Petit Gravelot

N° 271 - KLEINE PLEVIER

Charadrius dubius curonicus Gmelin. - 1/2.

Orde CHARADRIIFORMES. - Familie CHARADRIIDÆ.

Nestelt in Europa, het Noorden van Afrika en het Noorden van Azië. Overwintert in Afrika, Indië en Maleisië. Andere ondersoorten worden in het Zuiden en het Oosten van Azië en in Maleisië erkend. Nestelt op de zee-kusten en dikwijls op oevers van waters in het binnenland. Legt zijn eieren in een kleine kuil in het zand; 4 gevlekte geelrosse eieren; één broedsel.

Voedt zich vooral met kerfdieren en larven. Roepen : « die-up », « wié-er », « dièè » en « grigrigri »; zang : een klankverbuiging van « du du duhl lulul lulul ».

N° 271 - PETIT GRAVELOT

Charadrius dubius curonicus Gmelin. - 1/2.

Ordre CHARADRIIFORMES. - Famille CHARADRIIDÆ.

Niche en Europe, dans le nord de l'Afrique et le nord de l'Asie. Hivernent en Afrique, aux Indes et en Malaisie. D'autres sous-espèces sont reconnues dans le sud et l'est de l'Asie et en Malaisie.

Niche sur les côtes de la mer et fréquemment au bord des eaux à l'intérieur des terres. Dépose ses œufs dans une petite fosse dans le sable; 4 œufs, roux jaunâtre, tachetés; une nichée.

Se nourrit principalement d'insectes et de larves. Cris : « di-up », « wié-er », « dièè » et « grigrigri »; chant : une modulation de « dü dü duhl lüll lülülül ».

N° 272 - STRANDPLEVIER

Charadrius alexandrinus alexandrinus Linné. - 3/5.

Orde CHARADRIIFORMES. - Familie CHARADRIIDÆ.

Bewoont Europa tot het Zuiden van Scandinavië, de noordelijke helft van Afrika, het Noorden van Azië en de Soenda-eilanden. Andere gewestelijke vormen worden gevonden in het Oosten van Azië en in Amerika.

Vereist zout- of brakwater, de oevers van de zee, zoute meren in het binnenland. Nestelt in een lichte uitholling van de grond op de zee-stranden; in het binnenland is het nest soms gevoerd met enige grasstengels; 3 gevlekte geelachtige eieren; één broedsel.

Voedt zich vooral met kerfdieren en larven, ook met enige kleine weekdieren en wormen. Roepen : « püi », « tirr tirr », « toewiet toewiet »; zang : « trit tritritritirri ».

De verschillende soorten Plevieren vormen een zeer geprezen wild.

272. - *Charadrius alexandrinus alexandrinus* Linné



Strandplevier - Gravelot à collier interrompu

N° 272 - GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU

Charadrius alexandrinus alexandrinus Linné. - 3/5.

Ordre CHARADRIIFORMES.

Famille CHARADRIIDÆ.

Habite l'Europe jusqu'au sud de la Scandinavie, la moitié nord de l'Afrique, le nord de l'Asie et les îles de la Sonde. D'autres formes géographiques se rencontrent dans l'est de l'Asie et en Amérique.

Exige des eaux salées ou saumâtres, bords de la mer, lacs salés de l'intérieur. Niche dans une légère cavité du sol sur les plages de la mer; à l'intérieur des terres, le nid est parfois garni de quelques tiges d'herbes; 3 œufs, jaunâtres, tachetés; une nichée.

Se nourrit principalement d'insectes et larves, ainsi que de quelques petits mollusques et vers. Cris : « püi », « tirr tirr », « touit touit »; chant : « trit-tritritritirri ».

Les diverses espèces de Limicoles (Pluviers) sont du gibier très apprécié.

273. - *Charadrius morinellus* Linné



Morinelplevier - Pluvier guignard

1. Paarkleed - Nuptial - 2. Voorkleed - Prénuptial

N° 273 - MORINELPLEVIER

Charadrius morinellus Linné. - 2/5.

Orde CHARADRIIFORMES. - Famille CHARADRIIDÆ.

Bewoont het Noorden van Europa en van Azië, in het Zuiden tot Bohemen en Zevenbergen. Overwintert in het Zuiden van Afrika en het Zuid-Westen van Azië. Trekt regelmatig, hoewel weinig talrijk, over België.

Bewoont de toendra's, de hellingen en hoogvlakten van bergen waar slechts kort gras groeit; op trek, in de moerassen, weiden en bouwgronden; op de overwinteringsplaats in de weilanden, hoge gronden, braaklanden. Het nest is slechts een kuultje in het gras of het mos, soms gevoeid met gras of bladeren; 3 gevlekte, olijfbroine eieren, door het mannetje alleen bebroed; één broedsel.

Is buitengewoon vertrouwend op de broedplaatsen. Op trek en in de winter, dikwijls in kleine benden. Voedt zich met kerfdieren, wormen en kleine weekdieren. Geroepen : « durr », « drru », « urrr », « wit-wit », « oewit-e-wie », « diwirie ».

N° 273 - PLUVIER GUIGNARD

Charadrius morinellus Linné. - 2/5.

Orde CHARADRIIFORMES. - Famille CHARADRIIDÆ.

Habite le nord de l'Europe et de l'Asie, au sud jusqu'à la Bohême et la Transylvanie. Hiverne dans le sud de l'Afrique et le sud-ouest de l'Asie. Passe régulièrement en Belgique, quoiqu'en nombre assez restreint.

Habite les toundras, les flancs et hauts plateaux de montagnes à une altitude où ne poussent que des herbes courtes; en migration, dans les marais, prairies et terres cultivées; au lieu d'hivernage, dans les pâtures, terres hautes, jachères. Le nid n'est qu'une dépression dans l'herbe ou la mousse, parfois garnie de quelques herbes ou feuilles; 3 œufs, brun olive, tachetés, couvés par le mâle seul; une nichée.

Est extraordinairement confiant aux lieux de reproduction. En migration et en hiver, souvent en petites bandes. Se nourrit d'insectes, vers et petits mollusques. Cris : « dürr », « drru », « urrr », « wit-wit », « ouit-e-wie », « diwirii ».

274. - *Charadrius apricarius apricarius* Linné



Goudplevier - Pluvier doré

1. Paarkleed - Nuptial - 2. Voorkleed - Prénuptial

N° 274 - GOUDPLEVIER

Charadrius apricarius apricarius Linné. - 1/3.

Orde CHARADRIIFORMES. - Famille CHARADRIIDÆ.

Bewoont het Zuiden van Scandinavië, Denemarken, het Noord-Westen van Duitsland, Holland, de Britse eilanden. Gedeeltelijk trekker naar de streken van de Middellandse Zee en het Noorden van Afrika, op regelmatige door-tocht en gemeen in België.

Bewoont in de zomer de hooggelegen moerassen en vochtige heide, de hellingen der bergen met korte plantengroei. Zoekt na de broedtijd de bebouwde vlakten en zeekusten op, die hij in kleine benden bezoekt. Nestelt in een uitholling van de grond, gevoeid met enige grassstengels, heidekruid en andere planten; 4 bruingele gevlekte eieren; één broedsel.

Voedt zich met kerfdieren, wormen, weekdieren, schaaldieren en soms een weinig gras, zeeplanten, bessen, enz. Roep : « tuuu tuuu », « turu turu », « tluu »; zang van de paartijd : « taludl taludl taludl »; klare, zachte, fluitende stem.

N° 274 - PLUVIER DORÉ

Charadrius apricarius apricarius Linné. - 1/3.

Orde CHARADRIIFORMES. - Famille CHARADRIIDÆ.

Habite le sud de la Scandinavie, le Danemark, le nord-ouest de l'Allemagne, la Hollande, les Iles Britanniques. Partiellement migrateur vers les régions de la Méditerranée et le nord de l'Afrique, passant régulier et commun en Belgique.

En été habite les bruyères humides et les marécages situés en altitude, les flancs des montagnes avec courte végétation. Après la saison des nids recherche les plaines cultivées, côtes de la mer, qu'il fréquente en petites bandes. Niche dans une dépression du sol garnie de quelques tiges d'herbes, bruyères ou autres plantes; 4 œufs, jaune brunâtre, tachetés; une nichée.

Se nourrit d'insectes, vers, mollusques, crustacés et parfois d'un peu d'herbes, plantes marines, baies, etc. Cris : « tuuu-tuuu », « turu turu », « tluu »; chant de piriade : « taludl taludl taludl »; voix claire, douce et flûtée.

275. - *Squatarola squatarola* (Linné)



Zilverplevier - Pluvier argenté
1. Paarkleed - Nuptial - 2. Voorkleed - Prénuptial

N° 275 - ZILVERPLEVIER

Squatarola squatarola (Linné). - 1/3.

Orde CHARADRIIFORMES.

Familie CHARADRIIDÆ.

Bewoont de noordpoolstreken van Europa en van het Noord-Westen van Azië, Groenland en het Oosten der noordpoollanden van Amerika. Een andere ondersoort wordt in het Noord-Oosten van Siberië gevonden. Overwintert in het Zuiden, op de kusten van Europa, van Afrika en Zuid-Amerika.

Nestelt in de toendra's van het Noorden, in een kuiltje in het mos van de grond, gevoerd met enige stengels gras en korstmoss; 4 sterk gevlekte olijfgrijze eieren; één broedsel.

Eet schaaldieren, weekdieren, slakken, wormen, kerfdieren, alsook enige zaden van planten. Bezoekt in de winter niet alleen de zee-kusten, doch ook de binnenwaters. Zoals de meeste watervogels vergadert hij dikwijls in kleine benden. Zijn roep luidt: « tli-é-ie », « ti-u-ïe ».

N° 275 - PLUVIER ARGENTE

Squatarola squatarola (Linné). - 1/3.

Ordre CHARADRIIFORMES. - Famille CHARADRIIDÆ.

Habite les régions arctiques de l'Europe et du nord-ouest de l'Asie, le Groenland et l'est de l'Amérique arctique. Une autre sous-espèce se trouve dans le nord-est de la Sibérie. Hiverné au sud, sur les côtes de l'Europe, de l'Afrique et de l'Amérique du Sud.

Niche dans les toundras du nord, dans une dépression dans la mousse du sol, garnie de quelques tiges d'herbes et de lichens; 4 œufs, gris-olive, fort tachetés; une nichée.

Mange des crustacés, des mollusques, limaces, vers, insectes, ainsi que quelques rares graines de plantes. En hiver, fréquente non seulement les côtes de la mer, mais également les eaux intérieures. Comme la plupart des oiseaux d'eau, se tient souvent en petites bandes. Son cri s'exprime par « tli-é-i », « ti-u-iii ».

276. - *Vanellus vanellus* (Linné)



Kievit - Vanneau huppé
1. Paarkleed - Nuptial - 2. Voorkleed - Prénuptial
3. Jong - Jeune

N° 276 - KIEVIT

Vanellus vanellus (Linné). - 1/4.

Orde CHARADRIIFORMES. - Famille CHARADRIIDÆ.

Bewoont Europa ten Zuiden van de poolkring, het gehele Noorden en een deel van het Westen van Azië, en plaatselijk in het Noorden van Afrika. Overwintert in het Zuiden, in de streken van de Middellandse Zee, in het Noorden van Afrika en het Zuiden van Azië.

Verblijft in lage weiden, heide, bouwgronden, weilanden. Nestelt in de lage gronden op een verhevenheid; nest gevormd met enige plantenstengels in een kleine kuil van de grond bijeengebracht; 4 leemgele sterk gevlekte eieren; één broedsel.

In zekere streken rapen de bewoners de eieren der Kieviten achtereenvolgens op met uitzondering van één, in het nest gehouden om tot het leggen aan te zetten, dat voortgaat tot een zeker aantal, bij ondervinding gekend. De laatste eieren worden voor het broeden gelaten.

Heel gezellig in alle jaargetijden; een zeker aantal verlaten onze streken alleen bij koud weder. Voedt zich met wormen, weekdieren, slakken, kerfdieren. Roep: « pie-wit » of « kie-wit »; zang: « wie-willoc-willoc-koewie ».

N° 276 - VANNEAU HUPPE

Vanellus vanellus (Linné). - 1/4.

Orde CHARADRIIFORMES. - Famille CHARADRIIDÆ.

Habite l'Europe au sud du cercle polaire, tout le nord et une partie de l'ouest de l'Asie et localement dans le nord de l'Afrique. Hiverné au sud, dans les régions de la mer Méditerranée, dans le nord de l'Afrique et le sud de l'Asie.

Fréquente les prairies basses, les bruyères, les terres cultivées, les pâtures. Dans les terrains bas, niche sur quelque éminence; nid formé par quelques tiges de plantes réunies dans une petite fosse du sol; 4 œufs, couleur jaune limon, fort tachetés; une nichée.

Dans certaines régions, les habitants ramassent successivement les œufs des Vanneaux, à l'exception d'un œuf maintenu au nid pour stimuler la ponte qui continue jusqu'à un certain nombre connu par expérience. Les derniers œufs sont laissés pour la couvaison.

Fort sociable en toute saison; un certain nombre n'abandonnent nos régions que par temps froid. Se nourrit de vers, mollusques, limaces, insectes. Voix: « pie-wit »; ou « kie-wit »; chant: « wie-willoc-willoc-couwie ».

277. - *Arenaria interpres interpres* (Linné)



Steenloper - Tournepierre à collier
1. Paarkleed - Nuptial - 2. Voorkleed - Prénuptial

N° 277 - STEENLOPER

Arenaria interpres interpres (Linné). - 2/5.

Orde CHARADRIIFORMES. - Famille CHARADRIIDÆ.

Bewoont Groenland, IJsland, Spitsbergen, de noordpoollanden van Europa tot het Zuiden van Scandinavië en heel het Noorden van Azië. Overwintert op de kusten van Europa, Afrika, Azië, Oceanië. Een nabijstaande ondersoort bewoont de noordpoolgewesten van Amerika.

Leeft op de oevers der zee op de stenen van ingestorte rotsen, op de met stenen bezaaide zandstranden; zelden op de randen der binnenwaters. Nestelt bij de kusten of op de eilanden in een in de grond gekrabde holte, die met enige plantenstengels gevoerd wordt; 4 groen-bruine gevlekte eieren; één broedsel.

Bezoekt regelmatig België in de winter; gemeen op doortocht; houdt zich dikwijls in gezelschap van Bonte Strandlopers. Voedt zich vooral met kerfdieren, kleine weekdieren en schaaldieren, afval van vis, enz. Geroepen : « tje tje », « tjak tjak », « hie hie », « tjuk tjuk rurrurrurr »; zang : « tjiewæa tjiewæa tjiewiekikikiki ».

N° 277 - TOURNEPIERRE A COLLIER

Arenaria interpres interpres (Linné). - 2/5.

Orde CHARADRIIFORMES. - Famille CHARADRIIDÆ.

Habite le Groenland, l'Islande, le Spitsberg, l'Europe arctique jusqu'au sud de la Scandinavie et tout le nord de l'Asie. Hivernent sur les côtes de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Océanie. Une sous-espèce voisine habite l'Amérique arctique.

Vit aux bords de la mer sur les pierres de rochers éboulés, sur les plages sablonneuses parsemées de pierres; rarement sur les bords des eaux intérieures. Niche près des côtes ou sur des îles dans quelque cavité grattée dans le sol et garnie de quelques tiges de plantes; 4 œufs, brun verdâtre, tachetés; une nichée.

Visite régulièrement la Belgique en hiver; commun aux passages; se tient souvent en compagnie de Bécasseaux variables. Se nourrit principalement d'insectes, de petits mollusques et crustacés, de détritus de poisson, etc. Cris : « tchie tchie », « tchac tchac », « hie hie », « tchuc tchuc rurrurrurr »; chant : « tchiewæa tchiewæa tchiewiekikikiki ».

278. - *Calidris ferruginea* (Pontoppidan)



Krombekstrandloper - Bécasseau cocorli
1. Paarkleed - Nuptial - 2. Voorkleed - Prénuptial

N° 278 - KROMBEKSTRANDLOPER

Calidris ferruginea (Pontoppidan). - 2/5.

Orde CHARADRIIFORMES. - Famille CHARADRIIDÆ.

Nestelt in de noordpoolstreken van Azië; overwintert in Afrika, Hindoestan, Maleisië, Australië. Op regelmatige doortocht en gemeen in België. Nestelt in de toendra's van het Noorden; bezoekt na de nesttijd de oevers van de zee en van de inhammen, soms de binnenwaters. Nest bestaat uit een holte in het gras of het mos op een verhevenheid, landhoogte of heuvel van de toendra; 4 groengrijze gevlekte eieren; één legsel.

Zeer gezellig. Voedt zich met kleine schaaldieren, wormen en kerfdieren. Stem : « wick wick wick », « wies wies », « twiet twiet twiet twiet twiet », « djurri, dru-it durritit dirrit ».

N° 278 - BECASSEAU COCORLI

Calidris ferruginea (Pontoppidan). - 2/5.


Orde CHARADRIIFORMES. - Famille CHARADRIIDÆ.

Niche dans les régions arctiques de l'Asie; hivernent en Afrique, dans l'Hindoustan, en Malaisie, en Australie. De passage régulier et commun en Belgique.

Niche dans les toundras du nord; après la saison des nids, fréquente les bords de la mer et des estuaires, parfois les eaux intérieures. Nid consiste en une cavité dans l'herbe ou dans la mousse sur une éminence, tertre ou colline de la toundra; 4 œufs, gris verdâtre, tachetés; une ponte.

Très sociable. Se nourrit de petits crustacés, vers et insectes. Voix : « wick wick wick », « wies wies », « twiet twiet twiet twiet twiet », « djurri, dru-it », « durritit dirrit ».

279. - *Calidris alpina alpina* (Linné)



Bonte Strandloper - Bécasseau variable
1. Paarkleed - Nuptial - 2. Voorkleed - Prénuptial

N° 279 - BECASSEAU VARIABLE

Calidris alpina alpina (Linné). - 1/2.

Ordre CHARADRIIFORMES. - Famille CHARADRIIDÆ.

Habite le haut nord de l'Europe et la Sibérie jusqu'à la Léna. Hiverne à la Méditerranée, en Afrique et au sud-ouest de l'Asie. En été, fréquente les marécages et prairies basses, pâtures pauvres, marais salés; après la nidification, est commun sur les côtes de la mer, les bords boueux des fleuves et rivières. Nid construit dans bruyères, marais non loin de l'eau, caché entre la végétation, formé d'herbes, mousse, garni de feuilles et autres matériaux fins; 4 œufs, jaunâtre à roussâtre, plus ou moins tachetés; une nichée. Très sociable, surtout après la reproduction. Nourriture: vers, crustacés, mollusques, insectes. Cris: « trui » ou « tlu » flûté, « drrri », « tirie », « purr »; chant: « trii trii trurururu » émis en trille.

N° 279 - BONTE STRANDLOPER

Calidris alpina alpina (Linné). - 1/2.

Ordre CHARADRIIFORMES.

Famille CHARADRIIDÆ.

Bewoont het hoge Noorden van Europa en Siberië tot de Lena. Overwintert aan de Middellandse Zee, in Afrika en het Zuid-Westen van Azië.

Verblijft in de zomer in de moerassen en lage weiden, arme weilanden, zoute moerassen; is na de broedtijd gemeen op de zeekusten, de slijkerige oevers der stromen en rivieren. Nest gebouwd in heide en moerassen niet ver van het water, tussen de plantengroei verborgen, gevormd van gras, mos, gevoerd met bladeren en andere fijne bouwstoffen; 4 min of meer gevlekte geelachtige tot rosachtige eieren; één broedsel.

Zeer gezellig, vooral na de voortplanting. Voedsel: wormen, schaaldieren, weekdieren, kerfdieren. Roepen: « trui » of « tlu » gefloten, « driji », « tirie », « purr »; zang: « triji triji trurururu », op trillende wijze.

280. - *Calidris minuta* (Leisler)



Kleine Strandloper - Bécasseau minute
1. Paarkleed - Nuptial - 2. Voorkleed - Prénuptial

N° 280 - KLEINE STRANDLOPER

Calidris minuta (Leisler). - 1/2.

Ordre CHARADRIIFORMES. - Famille CHARADRIIDÆ.

Bewoont de toendra's van het Noorden van Rusland en van Siberië. Overwintert in Afrika en in het Westen van Hindoestan. Op regelmatige doortocht in België.

Na de nesttijd bezoekt hij de oevers van de zee, de modderige plaatsen van de inhammen en rivieren; zeldzaam in het binnenland. Nestelt op een hoogte in de toendra, tegen het water beschut; holt een klein schaalpje in het mos uit en belegt het met bladeren van de dwergwilg; 4 groengele gevlekte eieren; één legsel.

Voedt zich met kleine weekdieren, wormen, kleine schaaldieren, kerfdieren. Zeer gezellig. Stem: een zacht « wik wik wik », « drrrt », « tri-tri », « pit pitee pit, bit bit... ».

N° 280 - BECASSEAU MINUTE

Calidris minuta (Leisler). - 1/2.

Ordre CHARADRIIFORMES. - Famille CHARADRIIDÆ.

Habite les toundras du nord de la Russie et de la Sibérie. Hiverne en Afrique et dans l'ouest de l'Hindoestan. De passage régulier en Belgique. Après la saison des nids fréquente les bords de la mer, les endroits vaseux des estuaires et rivières; rare à l'intérieur des terres. Niche sur une hauteur dans la toundra à l'abri de l'eau; se pratique une petite coupe dans la mousse et la garnit de feuilles de saule nain; 4 œufs, jaune verdâtre, tachetés; une ponte.

Se nourrit de petits mollusques, vers, petits crustacés, insectes. Très sociable. Voix: un doux « wick wick wick », « drrrt », « tri-tri », « pit pité pit, bit bit... ».

281. - *Calidris temminckii* (Leisler)



Temminck's Strandloper - Bécasseau de Temminck
1. Paarkleed - Nuptial - 2. Voorkleed - Prénuptial

N° 281 - TEMMINCK'S STRANDLOPER

Calidris temminckii (Leisler). - 2/3.

Orde CHARADRIIFORMES. - Famille CHARADRIIDÆ.

Nestelt in Schotland, het Noorden van Scandinavië, het Noorden van Rusland en van Siberië. Overwintert in het Zuiden van Europa, het Noorden van Afrika, het Zuiden en het Oosten van Azië.

Bewoont in de zomer het uiterste Noorden van het woudgebied onmiddellijk ten Zuiden van het gebied der toendra's. Het nest bevindt zich niet ver van het water, van meren, rivieren, en is een eenvoudig kuiltje in de grond, met gras en mos belegd; 4 rosgrijze gevlekte eieren; één broedsel. Bezoekt na de broedtijd de oevers van de zee en wordt soms in het binnenland gevonden. Zeer gezellig. Voedt zich vooral met kerfdieren en met wormen. Stem : « tirrr » of « trri »; de trillende zang « tirr... », die hij uitbrengt in de paartijd, herinnert aan die van de Sprinkhaanzanger (n° 28).

N° 281 - BECASSEAU DE TEMMINCK

Calidris temminckii (Leisler). - 2/3.

Orde CHARADRIIFORMES. - Famille CHARADRIIDÆ.

Niche en Ecosse, dans le nord de la Scandinavie, le nord de la Russie et de la Sibérie. Hiverne dans le sud de l'Europe, le nord de l'Afrique, le sud et l'est de l'Asie.

En été habite l'extrémité nord de la zone des forêts, immédiatement au sud de la zone des toundras. Le nid se trouve non loin de l'eau, lacs, rivières, et est une simple petite fosse dans le sol, garnie d'herbes et de mousse; 4 œufs, gris roussâtre, tachetés; une nichée.

Après la nidification, fréquente les bords de la mer et se rencontre parfois à l'intérieur des terres. Très sociable. Se nourrit principalement d'insectes, ainsi que de vers. Voix : « tirrr » ou « trri »; en temps de parade, émet un chant, espèce de trille, « tirrr... », qui rappelle le chant de la Locustelle tachetée (n° 28).

282. - *Calidris canutus canutus* (Linné)



Kanoetstrandloper - Bécasseau maubèche
1. Paarkleed - Nuptial - 2. Voorkleed - Prénuptial
3. Jong - Jeune

N° 282 - KANOETSTRANDLOPER

Calidris canutus canutus (Linné). - 2/5.

Orde CHARADRIIFORMES. - Famille CHARADRIIDÆ.

Nestelt in de noordpoolstreken van Europa en Azië. Overwintert in Afrika, in het Zuiden van Azië. Een andere ondersoort wordt gevonden in het Noorden van Amerika; deze trekt in de winter tot het Zuiden van dit vasteland. Verblijft in de zomer in de buurt van de zee en de grote stromen; trekt na de kweektijd ook door het binnenland. Nestelt in de toendra's en op de stenige hoogvlakten met magere plantengroei. Het nest is een kleine holte in de grond, met korstmoss gevloeit; 4 groengrijze gevlekte eieren; één broedsel.

Zeer gezellig; bezoekt in benden de oevers van de zee en de slijkerige aanslibbingen der stromen en rivieren niet ver van de kusten; zeldzaam in het binnenland. Voedt zich met schaaldieren, weekdieren, wormen, kerfdieren. Trillend geroep : « tuwie » of knorrend : « knoet knoet », « kot-kot »; fluitend gezang : « toellawie toellawie wie wie ».

N° 282 - BECASSEAU MAUBECHÉ

Calidris canutus canutus (Linné). - 2/5.

Orde CHARADRIIFORMES. - Famille CHARADRIIDÆ.

Niche dans les régions arctiques de l'Europe et de l'Asie. Hiverne en Afrique, dans le sud de l'Asie. Une autre sous-espèce se trouve dans le nord de l'Amérique; celle-ci émigre jusqu'au sud de ce continent.

En été affectionne le voisinage de la mer et des grands fleuves; après la nidification, traverse aussi l'intérieur des terres. Niche dans les toundras et sur les hauts plateaux pierreux à maigre végétation. Le nid est un petit creux dans le sol, garni de lichens; 4 œufs, gris verdâtre, tachetés; une nichée.

Très sociable; visite en bandes les bords de la mer et les alluvions vaseuses des fleuves et rivières non loin des côtes; rare à l'intérieur des terres. Se nourrit de crustacés, mollusques, vers, insectes. Cri vibrant : « twei », ou grognant : « knout knout », « kot-kot »; chant flûté : « toullawie toullawie wie wie ».

283. - *Calidris maritima maritima* (Brünnich)



Paarse Strandloper - Bécasseau violet
1. Parkkleed - Nuptial - 2. Voorkleed - Prénuptial

N° 283 - PAARSE STRANDLOPER

Calidris maritima maritima
(Brünnich). - 1/2.

Orde CHARADRIIFORMES.

Familie CHARADRIIDÆ.

Bewoont de noordpoolstreken van de Oude en de Nieuwe Wereld. Overwintert meer in het Zuiden tot de Noordzee, de Oostzee en, in klein getal, tot de Middellandse Zee. Weinig gemene wintergast in België.

Houdt vooral van de zeekusten; zeldzaam in het binnenland. Nestelt in de toendra, zelfs in de bergen; het nest is een kleine holte in het mos, soms in de naakte grond; 4 groengele gevlekte eieren; één broedsel.

Gezellig en zeer vertrouwend. Voedt zich met kerfdieren, wormen, schaaldieren, weekdieren, evenals met een merklijke hoeveelheid plantaardige stoffen: gras, mos, wieren, bladeren van andere planten. Roepen: « wie-wit » of « tie-wit », « wedoewet », « tschrididi »; zang: « wut wut wut wut wit wit wit wit tru tri trie trie », « tekkerekkeck pli pli pli pli ».

N° 283 - BECASSEAU VIOLET

Calidris maritima maritima (Brünnich). - 1/2.

Ordre CHARADRIIFORMES. - Famille CHARADRIIDÆ.

Habite les régions arctiques de l'Ancien et du Nouveau Monde. Hiverné plus au sud jusqu'à la mer du Nord, la mer Baltique et, en petit nombre, jusqu'à la mer Méditerranée. Visiteur d'hiver peu commun en Belgique. Fréquente principalement les côtes de la mer; rare à l'intérieur des terres. Niche dans la toundra, même dans les montagnes; le nid est un petit creux dans la mousse, parfois dans le sol nu; 4 œufs, jaune verdâtre, tachetés; une nichée.

Sociale et très confiant. Se nourrit d'insectes, vers, crustacés, mollusques, ainsi que d'une quantité appréciable de matières végétales: herbes, mousse, algues, feuilles d'autres plantes. Cris: « wie-wit » ou « tie-wit », « wedoewet », « tschrididi »; chant: « wut wut wut wut wit wit wit wit tru tri trie trie », « tekkereckeck pli pli pli pli ».

N° 284 - WESTERSE KEMPHAAN

Philomachus pugnax occidentalis Verheyen. - 1/3.

Orde CHARADRIIFORMES. - Famille CHARADRIIDÆ.

Bewoont het Noorden van België en enige plaatsen in Frankrijk; overwintert in Afrika. Een andere gewestelijke vorm bewoont Europa en Azië. Zoekt de moerassige weiden op, de weilanden en de vochtige heide; bezoekt na de kweektijd zoetwater, zelden de zeekusten. Nest: een putteke in de grond, gevoerd met gras en zorgvuldig verborgen in weiden en heide; 4 groenroze gevlekte eieren; één broedsel.

Zeer gezellig. In de paartijd vergaderen de beide geslachten dagelijks op vaste plaatsen, waar de mannetjes, zonder elkaar te kwetsen, tot eigenaardige gevechten overgaan, waarbij zij al hun sierpluimen uitspreiden. Schijnen niet bij paren te leven.

De mannetjes zijn merklijk groter dan de wijfjes. De sierpluimen van de mannetjes verschillen zeer van kleur van het ene tot het andere, doch hetzelfde mannetje heeft iedere lente dezelfde kleuren.

Eet vooral kerfdieren, kleine schaaldieren, weekdieren. Zwijgzame vogel, laat zelden zijn roep horen: « toe-wit » en « kout kout », « gagaga » en « kie... ».

N° 284 - CHEVALIER COMBATTANT OCCIDENTAL

Philomachus pugnax occidentalis Verheyen. - 1/3.

Ordre CHARADRIIFORMES. - Famille CHARADRIIDÆ.

Habite le nord de la Belgique et quelques endroits de la France; hiverné en Afrique. D'autres formes géographiques habitent l'Europe et l'Asie. Recherche les prairies marécageuses, pâturages, bruyères humides; après la reproduction fréquente les eaux douces, rarement les plages de la mer. Nid: une dépression du sol garnie soigneusement d'herbes, bien caché dans prairies ou bruyères; 4 œufs, roux verdâtre, tachetés; une nichée. Très sociable. Au temps des amours les deux sexes se réunissent journellement en des endroits fixes où les mâles exécutent, sans se blesser, des combats singuliers, toutes plumes ornementales étalées. Ne paraissent pas vivre par couples.

Les mâles sont de taille notablement plus forte que les femelles. Les plumes ornementales des mâles sont de couleurs très variables d'un sujet à l'autre, mais le même mâle revêt les mêmes couleurs à chaque printemps. Mange principalement des insectes, vers, petits crustacés, mollusques. Oiseau silencieux, fait entendre rarement son cri: « tou-wit » et « kaut kaut », « gagaga » et « kie... ».

284 - *Philomachus pugnax occidentalis* Verheyen



Westerse Kemphaan - Chevalier combattant occidental
1. Parkkleed - Nuptial - 2. Voorkleed - Prénuptial

285. - *Crocethia alba* (Pallas)



Drieteenstrandloper - Bécasseau Sanderling
1. Paarkleed - Nuptial - 2. Voorkleed - Prénuptial
3. Jong - Jeune

N° 285 - DRIETEENSTRANDLOPER

Crocethia alba (Pallas). - 1/3.

Orde CHARADRIIFORMES. - Famille CHARADRIIDÆ.

Nestelt in de noordpoolstreken van Europa, Azië en Amerika; trekt zuidwaarts naar alle landen, tot het Zuiden van Afrika en van Azië, Oceanië, het Zuiden van Amerika. Trek- en wintervogel in België.

Nestelt in de zomer in de noordelijke toendra's, dikwijls op stenige plaatsen. Nestelt in een kleine holte in de grond gekrabb en met wilgenbladeren gevoerd; 4 rosachtige tot groenachtige eieren, gestippeld en gevlekt; één legsel.

Zeer gezellig en weinig schuw. Leeft na de broedtijd in benden of vervoegt zich met andere soorten; bezoekt de zandige of modderige stranden, de riviermonden, zelden het binnenland. Voedt zich met alle soorten kleine dieren en afval, op het strand ingezameld; eet in de zomer ook enige knoppen en plantenzaden, stukjes mos, wieren. Roepen : « wik wik », « pitt pitt », « trr trr trr ».

N° 285 - BECASSEAU SANDERLING

Crocethia alba (Pallas). - 1/3

Orde CHARADRIIFORMES. - Famille CHARADRIIDÆ.

Niche dans les régions arctiques de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique; émigre au sud vers tous les pays, jusqu'au sud de l'Afrique et de l'Asie, l'Océanie, le sud de l'Amérique. Migrateur et oiseau d'hiver en Belgique. En été niche dans les toundras arctiques, souvent dans des endroits pierreux. Nid dans un petit creux gratté dans le sol et garni de feuilles de saule; 4 œufs, roussâtre à verdâtre, légèrement pointillés et tachetés; une ponte.

Très sociable et peu farouche. Après la nidification vit en bandes ou se joint à d'autres espèces de limicoles; fréquente les plages sablonneuses ou vaseuses, les bouches des fleuves, rarement l'intérieur des terres. Se nourrit de toutes espèces de petits animaux et débris récoltés sur la plage; en été, mange aussi quelques boutons et semences de plantes, parties de mousse, algues. Cris : « wik wik », « pitt pitt », « trr trr trr ».

N° 286 - BREEDBEKSTRANDLOPER

Limicola falcinellus falcinellus (Pontoppidan). - 1/2

Orde CHARADRIIFORMES. - Famille CHARADRIIDÆ.

Nestelt in de moerassen en weiden gelegen in de hoge bergen van Scandinavië, in het Noorden van Rusland, het Westen van Siberië. Bezoekt in de winter de zee-kusten en de oevers der waters van het binnenland, in het Zuiden tot de Middellandse Zee en de Zwarte Zee, in Azië tot Hindoestan. Een andere vorm bevindt zich in het Oosten van Siberië. Zeldzame en onregelmatige bezoeker van België.

Nest bestaande uit gras, met bladeren gevoerd en doorgaans gevestigd op de graspollen boven het waterpeil; 4 bleek- of groenbruine gevlekte eieren; één broedsel.

Voedt zich vooral met kerfdieren, wormen, weekdieren, alsook zaden van planten. Stem : « tirrr », « drruwid drrid », « tit », « toewoe ».

286. - *Limicola falcinellus falcinellus* (Pontoppidan)



Breedbekstrandloper - Bécasseau falcinelle
1. Paarkleed - Nuptial - 2. Voorkleed - Prénuptial

N° 286 - BECASSEAU FALCINELLE

Limicola falcinellus falcinellus

(Pontoppidan). - 1/2.

Orde CHARADRIIFORMES.

Famille CHARADRIIDÆ.

Niche dans les prairies et marécages situés dans les hautes montagnes de la Scandinavie, dans le nord de la Russie, l'ouest de la Sibérie. En hiver, visite les côtes de la mer et les rives des eaux à l'intérieur des terres, au sud jusqu'à la Méditerranée et la mer Noire, en Asie jusqu'à l'Hindoustan. Une autre forme se trouve dans l'est de la Sibérie. Visiteur rare et irrégulier en Belgique.

Nid construit d'herbes, l'intérieur garni de feuilles et placé généralement sur les touffes d'herbes dépassant le niveau de l'eau; 4 œufs, brun pâle ou verdâtre, tachetés; une nichée.

Se nourrit principalement d'insectes, vers, mollusques, ainsi que de graines de plantes. Voix : « tirrr », « drruid drrid », « tit », « tou-wou ».

287. - *Tringa erythropus* (Pallas)



Zwarte Ruiter - Chevalier arlequin

1. Paarkleed - Nuptial - 2. Voorkleed - Prénuptial - 3. Jong - Jeune

N° 287 - ZWARTE RUITER

Tringa erythropus (Pallas). - 1/3.

Orde CHARADRIIFORMES.

Familie CHARADRIIDÆ.

Nestelt in de noordpoolstreken van Europa en Azië ten Zuiden van de toendra; overwintert in de landen van de Middellandse Zee, in Afrika ten Noorden van de Evenaar, in Indië, China, Japan. Regelmatige trekker, vrij gemeen in België.

Zoekt in de zomer de open plaatsen der bossen op, de vlakten met wouden, de droge plaatsen van de moerassen met hier en daar bomen. Het nest bevindt zich doorgaans bij enkele bomen en bestaat uit een lichte indieping van de grond waarin enige pijnboomnaalden liggen; 4 groen- tot rosachtige sterk gevlekte eieren; één broedsel.

Bezoekt na broedtijd eerder de binnenwaters dan de oevers van de zee. Gezellig. Voedt zich met kerfdieren, larven, weekdieren, wormen, kleine schaaldieren, kikvorsachtigen, kruipdieren. Roepen: « toewiet tjoewiet », « tiek » of « tak », « ti-u-wit », « tji » of « tji-tjit », « tjeutie »; zang: « tjuwurru-wurru... wurruwit ».

N° 287 - CHEVALIER ARLEQUIN

Tringa erythropus (Pallas). - 1/3.

Orde CHARADRIIFORMES. - Familie CHARADRIIDÆ.

Niche dans les régions arctiques de l'Europe et de l'Asie au sud de la toundra; hiverne dans les pays de la Méditerranée, en Afrique au nord de l'équateur, aux Indes, en Chine, au Japon. Migrateur régulier assez commun en Belgique.

En été recherche les clairières des forêts, les plaines avec bois, les endroits secs des marais parsemés d'arbres. Le nid se trouve généralement près de quelques arbres et consiste en une légère dépression du sol garnie de quelques aiguilles de pin; 4 œufs, verdâtre à roussâtre, fort tachetés; une nichée. Après la saison de reproduction, fréquente plutôt les eaux de l'intérieur que les bords de la mer. Sociable. Se nourrit d'insectes, larves, mollusques, vers, petits crustacés, batraciens, reptiles. Cris: « touit, tchouit », « tick » ou « tack », « ti-u-itt », « tchi » ou « tchi-tchit »; « tcheuty »; chant: « tchu-wurruwuru... wurruit ».

N° 288 - ROODPOOTRUITER

Tringa totanus totanus (Linné). - 1/3.


Orde CHARADRIIFORMES. - Familie CHARADRIIDÆ.

Bewoont heel Europa en van Klein-Azië tot het Oosten van Siberië. Trekt tot het Zuiden van Afrika. Andere ondersoorten leven in IJsland en in het midden en het Oosten van Azië. Zeldzame en plaatselijke broedvogel in België, gemeen op de doortochten.

Houdt van de weiden in de nabijheid der rivieren, van moerassen en vochtige heide. Nest gebouwd met grasstengels en bladeren, doorgaans verborgen onder een dikke bos gras; 4 geel- of groenachtige min of meer gevlekte eieren; één broedsel.

Zodra de jongen kunnen vliegen, verlaat hij de nestplaatsen om zich naar de kust en de stroommonden te begeven. Voedt zich met kerfdieren, larven, wormen, weekdieren, kleine schaaldieren. Roepen: « tju-wu-wu », « tu tututu » of « tju »; zang: « dalidl, dlidl, dlidl, dlidl, dlidl » of « djulih, djulih, djulih, dli, dli, dli » of « tralidl, tralidl, tralidl ».

288. - *Tringa totanus totanus* (Linné)



Roodpootruiter - Chevalier gambette

1. Paarkleed - Nuptial - 2. Voorkleed - Prénuptial - 3. Jong - Jeune

N° 288 - CHEVALIER GAMBETTE

Tringa totanus totanus (Linné). - 1/3.


Orde CHARADRIIFORMES.

Familie CHARADRIIDÆ.

Habite toute l'Europe et de l'Asie Mineure à l'est de la Sibérie. Emigre jusqu'au sud de l'Afrique. D'autres sous-espèces vivent en Islande et dans le centre et l'est de l'Asie. Nicheur rare et local en Belgique, commun aux passages. Affectionne les prairies dans le voisinage des rivières, les marais et bruyères humides. Nid construit de tiges d'herbes et de feuilles, généralement caché sous une grosse touffe d'herbes; 4 œufs, jaunâtres ou verdâtres, plus ou moins tachetés; une nichée.

Dès que les jeunes peuvent voler, quitte les lieux de nidification pour se rendre au littoral et les bouches des fleuves. Se nourrit d'insectes, larves, vers mollusques, petits crustacés. Cris: « tchu-wu-wu », « tu tututu » ou « tchu »; chant: « dalidl, dlidl, dlidl, dlidl, dlidl » ou « djulih, djulih, djulih, dli, dli, dli », ou « tralidl, tralidl, tralidl ».

289. - *Tringa stagnatilis* (Bechstein)



Poelruiter - Chevalier stagnatile
1. Paarkleed - Nuptial - 2. Voorkleed - Prénuptial

N° 289 - POELRUITER

Tringa stagnatilis (Bechstein). - 2/5.

Orde CHARADRIIFORMES.

Familie CHARADRIIDÆ.

Bewoont het Zuid-Oosten van Europa, Turkestan, het Zuid-Westen en het midden van Siberië. Overwintert in Afrika, in het Zuiden van Azië tot Australië. Bezoekt bij uitzondering België. Zoekt de moerassen op, de lage weiden, de oevers van de meren en stilstaande waters. Nestelt op grazige plaatsen niet ver van het water; nest: een putteke in de grond met droog gras gevoerd; 4 roomwitte gevlekte eieren; één broedsel.

Voedt zich vooral met kerfdieren, larven, wormen en kleine weekdieren. Roep: « tja tja », « djidjidjidi ».

N° 289 - CHEVALIER STAGNATILE

Tringa stagnatilis (Bechstein). - 2/5.

Ordre CHARADRIIFORMES. - Famille CHARADRIIDÆ.

Habite le sud-est de l'Europe, le Turkestan, le sud-ouest et le centre de la Sibérie. Hiverne en Afrique, au sud de l'Asie jusqu'en Australie. Visite exceptionnellement la Belgique.

Recherche les marécages, prairies basses, les bords des lacs et eaux stagnantes. Niche dans les endroits herbeux non loin de l'eau; nid: une dépression du sol garnie d'herbes sèches; 4 œufs, blanc crème, tachetés; une couvée.

Se nourrit principalement d'insectes, larves, vers et petits mollusques. Cris: « tcha tcha », « djidjidjidi ».

290. - *Tringa nebularia* (Gunnerus)



Groenpootruiter - Chevalier à pattes vertes
1. Paarkleed - Nuptial - 2. Voorkleed - Prénuptial

N° 290 - GROENPOOTRUITER

Tringa nebularia (Gunnerus). - 2/7.

Orde CHARADRIIFORMES. - Famille CHARADRIIDÆ.

Verblijft in de zomer in de streken van het Noorden van Europa en Azië, ten Zuiden van de toendra; overwintert in Afrika, in de keerklinglanden van Azië, op de Maleise Archipel, in Australië. Regelmatige trekker, vrij gemeen in België; enkele exemplaren vertonen zich hier soms in de zomer, doch nestelen niet; andere vertoeven in ons land bij zachte winters.

Houdt van alle vochtige plaatsen, bij zoetwater of aan de kust. Nestelt in het binnenland, gewoonlijk bij de moerassen. Het nest is dikwijls geplaatst bij een herkenningsteken, zoals een grote steen, de voet van een gebroken boom, een stuk hout, enz; gebouwd in een holte van de grond, gevoerd met stengels en bladeren van planten; 4 rosachtige eieren met talrijke vlekken; één broedsel.

Voedsel: kerfdieren, larven, schaaldieren, wormen, weekdieren, dikkopen, enz. Geroepen: « tjoe-tjoe-tjoe », « kli kli », « tututu », « kru », « tje »; zang: « dowidl dowidl » of « dahudl dahudl » of « lowit lowit lowit ».

N° 290 - CHEVALIER A PATTES VERTES

Tringa nebularia (Gunnerus). - 2/7.

Ordre CHARADRIIFORMES. - Famille CHARADRIIDÆ.

En été, réside dans les régions du nord de l'Europe et de l'Asie, au sud de la toundra; hiverne en Afrique, en Asie tropicale, dans l'archipel Malais, en Australie. Migrateur assez commun en Belgique; quelques-uns montrent parfois ici en été, mais ne nichent pas; d'autres s'y attardent par hivers doux.

Se plaît dans tous les endroits humides, près des eaux douces ou au littoral. Niche à l'intérieur des terres, ordinairement près des marais. Le nid est souvent placé près d'un point de repère: grosse pierre, pied d'arbre cassé, morceau de bois, etc; construit dans un creux du sol, garni de tiges et feuilles de plantes; 4 œufs, roussâtres avec taches nombreuses; une nichée.

Nourriture: insectes, larves, crustacés, vers, mollusques, têtards, etc. Cris: « tjou-tjou-tjou », « kli kli », « tututu », « kru », « tchie »; chant: « dowidl dowidl » ou « dahudl dahudl » ou « lowit lowit lowit ».

291. - *Tringa ochropus* Linné



Witgatrutter - Chevalier cul-blanc

1. Paarkleed - Nuptial - 2. Voorkleed - Prénuptial

N° 291 - WITGATRUITER

Tringa ochropus Linné. - 1/3.

Orde CHARADRIIFORMES. - Familie CHARADRIIDÆ.

Bewoont het Noorden van Europa en Azië; in het Zuiden tot Duitsland door Rusland, Transcaspië tot Turkestan. Overwintert in Afrika, Indië, China, de Maleise Archipel.

Houdt van de slijkerige oevers der waters, meren, rivieren, grachten; vertoont zich zelden op de oever van de zee. Nestelt doorgaans in de moerasige wouden, soms op de grond, meest in oude nesten van een Merel, Lijster, Kraai, Eekhoorn, op een hoop pijnboomnaalden op de twijgen, in de brede vork van een dikke tak, enz.; 4 groen- of rosachtige weinig gemerkte eieren; één legsel.

Weinig gezellig. Eet vooral kerfdieren, larven en wormen. Geroepen: « tuwi-tuwi-tuwi », « sie sie » of « sik sik », « tluwi titit »; zang: een zuiver en welluidend « dluwie dluwie dluwie », « didludi didludi ».

N° 291 - CHEVALIER CUL-BLANC

Tringa ochropus Linné. - 1/3.

Ordre CHARADRIIFORMES. - Famille CHARADRIIDÆ.

Habite le nord de l'Europe et de l'Asie; au sud jusqu'à l'Allemagne à travers la Russie, la Transcaspië jusqu'au Turkestan. Hiverné en Afrique, aux Indes, en Chine, dans l'archipel Malais.

Affectionne les bords vaseux des eaux, lacs, rivières, fossés, se montre rarement au bord de la mer. Niche généralement dans les forêts marécageuses, parfois à terre, le plus souvent dans vieux nids de Merle, Grive, Corbeau, Ecureuil, sur une accumulation d'aiguilles de pin sur les rameaux, dans large fourche de grosse branche, etc.; 4 œufs, verdâtres ou roussâtres peu marqués; une ponte.

Peu sociable. Mange principalement des insectes, larves et vers de vase. Cris: « tui-tui-tui », « sie sie » ou « sic sic », « tluwi titit »; chant: un pur et mélodieux « dluwie dluwie dluwie », « didludi didludi ».

N° 292 - BOSRUITER

Tringa glareola Linné. - 2/3.

Orde CHARADRIIFORMES. - Famille CHARADRIIDÆ.

Bewoont het Noorden van Europa en Azië; overwintert in de streken van de Middellandse Zee, in Afrika, in het Zuiden van Azië tot Australië. Regelmatige trekker, vrij zeldzaam in België.

Leeft in de moerassen, op de vochtige en open vlakten, doch vestigt zich eveneens bij de meren en op de eilanden der rivieren in de beboste streken. Nest doorgaans op de grond in een putteke, verborgen onder gras, heidekruid of andere planten; benuttigt ook graag de oude nesten van andere vogels op een zekere hoogte in de bomen gevestigd; 4 roomkleurige of groenachtige eieren; één broedsel.

Na de broedtijd bezoekt hij de moerassen, vochtige weiden, poelen en zoetwaters. Zeldzaam op de kusten der zee. Voedt zich met kerfdieren en larven, wormen en kleine weekdieren. Kristalheldere stem; geroepen: « jif jif jif », « gibb-gibb... gibb-gibb-gibb »; zang: « titirli titirli » of « tilidl tilidl » en « hit hit hit tlia tlia tlia ».

N° 292 - CHEVALIER SYLVAIN

Tringa glareola Linné. - 2/3.

Ordre CHARADRIIFORMES. - Famille CHARADRIIDÆ.

Habite le nord de l'Europe et de l'Asie; hiverné dans les pays de la Méditerranée, en Afrique, au sud de l'Asie jusqu'en Australie. Migrateur régulier assez rare en Belgique.

Vit dans les marécages, les plaines humides et ouvertes, mais s'établit également près des lacs et sur les îles des rivières dans les régions boisées. Nid généralement à terre dans un creux du sol, caché entre les herbes, bruyères ou autre végétation; utilise aussi volontiers les vieux nids d'autres oiseaux établis à une certaine hauteur sur les arbres; 4 œufs, couleur crème ou verdâtre; une couvée.

Après la saison des nids, fréquente les marais, prairies humides, mares et eaux douces. Rare sur les côtes de la mer. Se nourrit d'insectes et larves, vers et petits mollusques. Voix claire et cristalline; cris: « jif jif jif », « gibb-gibb... gibb-gibb-gibb »; chant: « titirli titirli » ou « tilidl tilidl » et « hit hit hit tlia tlia tlia ».


292. - *Tringa glareola* Linné



Bosruiter - Chevalier sylvain

1. Paarkleed - Nuptial - 2. Voorkleed - Prénuptial

293. - *Tringa hypoleucos* Linné



Oeverloper - Chevalier guignette
1. Volwassen - Adulte - 2. Jong - Jeune

N° 293 - OEVERLOPER

Tringa hypoleucos Linné. - 1/2.

Orde CHARADRIIFORMES.

Familie CHARADRIIDÆ.

Bewoont Europa en Azië, in het Noorden tot de poolkring, in het Zuiden tot het midden van Spanje, Italië, Klein-Azië en in Azië tot de Himalaya-keten. Overwintert in Afrika, in het Zuiden van Azië tot Australië.

Nestelt liefst bij de waterlopen en rivieren der oneffen streken, bij de beken en vijvers tussen de heuvels; minder in de lage vlakten; na de broedtijd komt hij dichter bij de kust, en begeeft hij zich naar de inhammen, moerassen en vochtige plaatsen van de vlakten. Het nest, lichte uitholling van de grond met gras gevoerd, is niet ver van het water gevestigd, op een riviereiland, bij de beken, in de plantengroei verborgen; 4-5 rosachtige wel gevlekte eieren; één legsel. Niet zeer gezellig, dikwijls bij paren, zelden verscheidene samen. Verplaatst zich vaak 's avonds of 's nachts. Voedsel: kerfdieren, larven, wormen en kleine weekdieren. Roepen: « pi-wi-wi-pi-wi », « dididi »; zang: « tidididi » of « kiti nidi » al trillend herhaald, met een hoge en klare stem.

N° 293 - CHEVALIER GUIGNETTE

Tringa hypoleucos Linné. - 1/2.

Orde CHARADRIIFORMES. - Familie CHARADRIIDÆ.

Habite l'Europe et l'Asie, au nord jusqu'au cercle polaire, au sud jusqu'au milieu de l'Espagne, de l'Italie, l'Asie Mineure et en Asie jusqu'à la chaîne de l'Himalaya. Hiverne en Afrique, au sud de l'Asie jusqu'à l'Australie.

Pour la nidification, affectionne les cours d'eau et rivières des régions accidentées, les ruisseaux et pièces d'eau entre les collines; niche moins souvent dans les plaines basses; mais après la saison des nids se rapproche du littoral, se rend aux estuaires, marais et lieux humides des plaines. Le nid, légère excavation du sol garnie d'herbes, est situé non loin de l'eau, sur une île de rivière, près des ruisseaux, caché dans la végétation; 4-5 œufs, rous-sâtres, bien tachetés; une ponte.

Pas très sociable, souvent en couples, rarement à plusieurs. Se déplace souvent le soir ou la nuit. Nourriture: insectes, larves, vers et petits mollusques. Cris: « pi-wi-wi-pi-wi », « dididi »; chant: « tidididi » ou « kiti nidi » répété en trille, d'une voix haute et claire.

N° 294 - ROSSE FRANJEPOOT

Phalaropus fulicarius (Linné). - 1/2.

Orde CHARADRIIFORMES. - Familie CHARADRIIDÆ.

Bewoont de noordpoolstreken van Europa, Azië en Amerika; trekt in de winter naar het Zuiden in de gematigde streek. Vertoont zich zelden in België. Nestelt in de nabijheid van de zee, in de inhammen, fjorden, moerassen. Nest gebouwd met gras in de plantengroei der moerassen; stelt zich in het hoge Noorden tevreden met een holte aangebracht in het mos van de rotsige grond; 4 olivbruine gevlekte eieren, uitsluitend door het mannetje bebroed; één legsel.

Houdt zich meestal op in het water; flink zwemmer; voedt zich aan de oppervlakte, vooral met schaaldieren; eet ook wormen, slakken, insecten en larven. Na de broedtijd bezoekt hij ook de zoetwaters van het binnenland. Roepen: « drrrt drrrt », « twiet » of « piep » en « gji ga, ga ».

294. - *Phalaropus fulicarius* (Linné)



Rosse Franjepoot - Phalarope à bec large
1. Paarkleed - Nuptial - 2. Voorkleed - Prénuptial

N° 294 - PHALAROPE A BEC
LARGE

Phalaropus fulicarius (Linné). - 1/2.

Orde CHARADRIIFORMES.

Familie CHARADRIIDÆ.

Habite les régions arctiques de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique; émigre au sud, en hiver, dans la zone tempérée. Se montre rarement en Belgique.

Niche dans le voisinage de la mer, dans les estuaires, fjords, dans les marécages. Nid construit d'herbes dans la végétation des marais; dans le haut nord, se contente d'une cavité pratiquée dans la mousse du sol rocheux; 4 œufs, brun olive, tachetés, couvés exclusivement par le mâle; une nichée.

Se tient la plus grande partie du temps sur l'eau, nageant élégamment, se nourrissant à la surface, principalement de crustacés; mange aussi des vers, limaces, insectes et larves. Après la saison des nids, fréquente aussi les eaux douces intérieures. Cris: « drrrt drrrt », « twiet » ou « piep » et « gji ga, ga ».

295. - *Phalaropus lobatus* (Linné)



Grauwe Franjepoot - Phalarope à bec étroit
1. Paarkleed - Nuptial - 2. Voorkleed - Prénuptial

N° 295 - GRAUWE FRANJEPOOT

Phalaropus lobatus (Linné). - 1/2.

Orde CHARADRIIFORMES.

Familie CHARADRIIDÆ.

Bewoont de streken van het Noorden van de Oude en de Nieuwe Wereld, doch meer zuidwaarts dan de Rosse Franjepoot; in Europa, tot het Noorden van de Britse Eilanden en de breedte der Baltische landen. Trekt in de winter meer naar het Zuiden tot het Noorden van Afrika, Indië, Maleisië, Midden-Amerika.

Houdt zich in de zomer op in het binnenland in de moerassen of op korte afstand van het water; na de voortplanting bezoekt hij min of meer de kusten van de zee. Het nest, gebouwd met gras en andere waterplanten, is geplaatst in een grasstruik bij het water; 4 olijfkleurige eieren, gevlekt en uitsluitend door het mannetje bebroed; één legsel.

Voedt zich vooral met kerfdieren, larven en kleine schaaldieren, al zwemmend gevangen aan de oppervlakte van het water waarin hij het grootste deel van de dag doorbrengt; eet ook wormen en kleine weekdieren. Roepen: « pitt pitt », « plip plip », « trp trp », « puwirt », « truwip », « dili », « pritt, tschritt ».

N° 295 - PHALAROPE A BEC ETROIT

Phalaropus lobatus (Linné). - 1/2.

Ordre CHARADRIIFORMES. - Familie CHARADRIIDÆ.

Habite les régions du nord de l'Ancien et du Nouveau Monde, mais plus au sud que le Phalarope à bec large; en Europe, jusqu'au nord des Iles Britanniques et la latitude des Pays Baltes. En hiver, émigre plus au sud jusqu'au nord de l'Afrique, les Indes, la Malaisie, l'Amérique centrale.

En été, se tient à l'intérieur des terres dans les marécages ou à peu de distance de l'eau; après la reproduction, fréquente plus ou moins les côtes de la mer. Le nid, construit d'herbes et autres plantes aquatiques, est placé dans une touffe d'herbes près de l'eau; 4 œufs, de couleur olive; tachetés et couvés exclusivement par le mâle; une nichée.

Se nourrit principalement d'insectes, larves et petits crustacés recueillis à la surface de l'eau, où il nage la plus grande partie de la journée; à terre, mange aussi des vers et petits mollusques. Cris: « pitt pitt », « plip plip », « trp trp », « puirt », « truip », « dili », « pritt, tschritt ».

296. - *Himantopus himantopus himantopus* (Linné)



Steltkluit - Echasse blanche
1-2. Volwassen, twee kleurvormen - Adultes, deux formes
3. Jong - Jeune

N° 296 - STELTCLUUT

Himantopus himantopus himantopus (Linné). - 1/4.

Orde CHARADRIIFORMES. - Familie CHARADRIIDÆ.

Woont plaatselijk in het Zuiden van Europa, noordwaarts tot Holland en Hongarije, in heel Afrika en in het Zuiden van Azië. De bewoners van het Noorden trekken naar het Zuiden, naar Afrika en naar het Zuiden van Azië. Vertoont zich onregelmatig en vrij zelden in België, waar hij nochtans meer dan eens genesteld heeft.

Leeft op de oevers van de zee, in de inhammen en lagunen, bij de meren, moerassen en rivieren. Nestelt bij of in het water op een hoop riet en andere planten; 4 leemgele gestippelde en gevlekte eieren; één broedsel. Voedt zich vooral met kerfdieren en larven, kleine weekdieren, dikkoppen, enz. Roepen: « fit-fit », « tjoewit » of « goewit », « tik tik ».

N° 296 - ECHASSE BLANCHE

Himantopus himantopus himantopus (Linné). - 1/4.

Ordre CHARADRIIFORMES. - Familie CHARADRIIDÆ.

Habite localement dans le sud de l'Europe, au nord jusqu'à la Hollande et la Hongrie, dans toute l'Afrique et dans le sud de l'Asie. Les habitants du nord émigrent vers le sud, en Afrique et au sud de l'Asie. Se montre irrégulièrement et assez rarement en Belgique, où il a cependant niché plus d'une fois.

Vit sur les bords de la mer, dans les estuaires et lagunes, près des lacs, marais et rivières. Niche près de l'eau ou dans l'eau sur un tas de roseaux et autres plantes; 4 œufs, jaune limon, marqués de points et de taches; une nichée.

Se nourrit principalement d'insectes et larves, petits mollusques, têtards, etc. Cris: « fit-fit », « tchouit » ou « gouit », « tick tick ».

297. - *Recurvirostra avosetta avosetta* Linné



Kluut - Avocette à manteau noir
1. Volwassen - Adulte - 2. Jong - Jeune

N° 297 - KLUUT

Recurvirostra avosetta avosetta Linné. - 1/4.

Orde CHARADRIIFORMES. - Familie CHARADRIIDÆ.

Nestelt plaatselijk op de oevers van de zee en van de grote, doorgaans zoute binnenwaters : Oostzee, Noordzee, Middellandse Zee, Zwarte Zee, Kaspische Zee, Aralzee, door Azië tot China, evenals op zekere plaatsen in Afrika. De vogels van het Noorden trekken zuidwaarts, naar Afrika, Indië en zelfs Europa, tot Holland bij zachte winters.

Bezoekt de moerassen, de oevers van de inhammen en lagunen. Nestelt in koloniën op zand of slijk, in een kleine holte gevoerd met enige plantenstengels; 4 rosachtige gestippelde eieren; één legsel.

Voedt zich vooral met kerfdieren, larven, schaaldieren, wormen. Stem : « klut-klut », « tlioe », « kliejoewit », « tiejoewit », « ploewit », « lipit, lipit »; jong : « gib gib » en « kluut kluut ».

N° 297 - AVOCETTE A MANTEAU NOIR

Recurvirostra avosetta avosetta Linné. - 1/4.

Ordre CHARADRIIFORMES. - Famille CHARADRIIDÆ.

Niche localement sur les côtes de la mer et des grandes eaux intérieures, généralement salées : mer Baltique, mer du Nord, mer Méditerranée, mer Noire, mer Caspienne, mer d'Aral, à travers l'Asie jusqu'en Chine, ainsi que dans certains endroits en Afrique. Les oiseaux du nord émigrent vers le sud, en Afrique, aux Indes et même en Europe, jusqu'en Hollande, par hivers doux.

Fréquente les marécages, les bords des estuaires et lagunes. Niche en colonies sur le sable ou la vase dans une petite dépression garnie de quelques tiges de plantes; 4 œufs, roussâtres, marqués de points; une ponte. Se nourrit principalement d'insectes, larves, crustacés, vers. Voix : « klut-klut », « tliou », « kliouit », « tiouit », « plouit », « lipit, lipit »; jeune : « ghib ghib » et « kluut kluut ».

298. - *Limosa lapponica lapponica* (Linné)



Rosse Griet of Rosse Grutto - Barge Rousse
1. Paarkleed - Nuptial - 2. Voorkleed - Prénuptial

N° 298 - ROSSE GRIET OF ROSSE GRUTTO

Limosa lapponica lapponica (Linné). - 1/3.

Orde CHARADRIIFORMES. - Familie CHARADRIIDÆ.

Bewoont het Noorden van Europa en het Westen van Siberië. Overwintert in het Zuiden tot het midden van Afrika en het Zuiden van Azië tot het Westen van Hindoestan. Een andere ondersoort bewoont het Oosten van Siberië. Regelmatig trekker en gemeen in België.

Bezoekt de oevers van de zee, de inhammen; minder het binnenland, behalve in de tijd van de voortplanting. Nestelt op de moerassige plaatsen, de open plekken der vochtige bossen en ook in de toendra. Nest gebouwd met gras, bladeren en enige pluimen in een holte van de grond; 4 olijfgroene gevlekte eieren; één broedsel.

Zeer gezellig. Voedt zich met kerfdieren, larven, wormen, kleine schaaldieren en weekdieren. Stem : « kew kew kew », « kiaw kiaw », « kei kei », « iak iak », « koewak koewak », « tabye tabye », « loewet loewet ».

N° 298 - BARGE ROUSSE

Limosa lapponica lapponica (Linné). - 1/3.

Ordre CHARADRIIFORMES. - Famille CHARADRIIDÆ.

Habite le nord de l'Europe et l'ouest de la Sibérie. Hiverne au sud jusqu'au centre de l'Afrique et le sud de l'Asie jusqu'à l'ouest de l'Hindoustan. Une autre sous-espèce habite l'est de la Sibérie. Migrateur régulier et commun en Belgique.

Fréquente les bords de la mer, les estuaires, plus rarement l'intérieur des terres, sauf au temps de la reproduction. Niche dans les endroits marécageux, les clairières des forêts humides et aussi dans la toundra. Nid construit d'herbes, feuilles et quelques plumes dans une cavité du sol; 4 œufs, vert olive, tachetés; une nichée.

Très sociable. Se nourrit d'insectes, larves, vers, petits crustacés et mollusques. Voix : « kew kew kew », « kiaw kiaw », « kei kei », « iak iak », « kouwak kouwak », « tabye tabye », « louët-louët ».

299. - *Limosa limosa limosa* (Linné)



Griet of Grutto - Barge à queue noire

1. Paarkleed - Nuptial - 2. Voorkleed - Prénuptial

N° 299 - GRIET OF GRUTTO

Limosa limosa limosa (Linné). - 1/4.

Orde CHARADRIIFORMES. - Familie CHARADRIIDÆ.

Bewoont het Noorden van Europa en Azië; in het Zuiden tot Holland en België, Duitsland, Hongarije, door Rusland tot Turkestan. Overwintert in het bekken van de Middellandse Zee, het Noord-Westen van Afrika, Indië. Een ander gewestelijk ras is bekend in het Oosten van Azië.

Bezoekt de moerassige streken, de vochtige heide; begeeft zich na de broedtijd op de oevers van de zee en op de slijkbanken van de stromen en inhammen. Het nest wordt met gras gebouwd in een holte van de grond, bij het water, doorgaans in het hoge gras of het heidekruid; 4 olijfbuine gevlekte eieren; één broedsel.

Op de broedplaatsen zet hij zich dikwijls op de verneutelde pijnbomen, de palen en de afsluitingen. Voedt zich met kerfdieren, wormen, weekdieren, dikkoppen, enz. Roepen : « grutto grutto », « dio dio », « tios-i-toe », met enkele veranderingen die een zang vormen : « dileutio dileutio ».

N° 299 - BARGE A QUEUE NOIRE

Limosa limosa limosa (Linné). - 1/4.

Orde CHARADRIIFORMES. - Familie CHARADRIIDÆ.

Habite le nord de l'Europe et de l'Asie; au sud jusqu'à la Hollande et la Belgique, l'Allemagne, la Hongrie, à travers la Russie jusqu'au Turkestan. Hiverne dans le bassin de la Méditerranée, le nord-ouest de l'Afrique, aux Indes. Une autre race géographique est reconnue dans l'est de l'Asie. Fréquente les régions marécageuses, les bruyères humides; après la nidification, se rend aux bords de la mer et aux bancs vaseux des fleuves et estuaires. Le nid est construit d'herbes dans un creux du sol, près de l'eau, généralement dans les hautes herbes ou les bruyères; 4 œufs, brun olive, tachetés; une couvée.

Aux lieux de nidification se perche fréquemment sur les pins rabougris, les piquets et clôtures. Se nourrit d'insectes, vers, mollusques, têtards, etc. Cris : « grutto grutto », « dio dio », « tiou-i-tou », avec quelques variantes formant chant : « dileuthio dileuthio ».

N° 300 - NOORDSE SCHOLEKSTER

Hæmatopus ostralegus ostralegus Linné. - 1/4.

Orde CHARADRIIFORMES. - Familie CHARADRIIDÆ.

Bewoont geheel Europa, buiten de Britse Eilanden en het Zuiden van Rusland, waar andere ondersoorten gevonden worden. De vogels van het Noorden overwinteren aan de Middellandse Zee, de Rode Zee en het Noord-Westen van Hindoestan.

Bezoekt bijna uitsluitend de kusten van de zee, zowel de ingestorte rotsen als de zandige stranden en de inhammen, zelden de binnenwaters. Legt haar 3 geelachtige gevlekte eieren in een kleine uitholling in het zand van de duinen, in het gras van de weiden aan de kust en zelfs in de rotsen bij de zee; één legsel.

Voedt zich vooral met weekdieren, mosselen, oesters, enz., wormen, schaaldieren, kerfdieren en larven. Zeer gezellig in het najaar. Roepgeluiden : « kadiet kadiet kadiet », « wip-kwip », « pik pik pik... », « pulit pulit... ».

300. - *Haematopus ostralegus ostralegus* Linné



Noordse Scholekster - Huitrier pie du nord

1. Paarkleed - Nuptial - 2. Voorkleed - Prénuptial

N° 300 - HUITRIER PIE DU NORD

Hæmatopus ostralegus ostralegus Linné. - 1/4.

Orde CHARADRIIFORMES.

Famille CHARADRIIDÆ.

Habite toute l'Europe, sauf les Iles Britanniques et le sud de la Russie, où se rencontrent d'autres sous-espèces. Les oiseaux du nord hivernent à la Méditerranée, la mer Rouge et dans le nord-ouest de l'Hindoustan.

Fréquente à peu près exclusivement les bords de la mer, aussi bien les rochers éboulés que les plages sablonneuses et les estuaires, rarement les eaux intérieures. Dépose ses 3 œufs, jaunâtres, tachetés, dans une légère excavation dans le sable des dunes, dans l'herbe des prairies du littoral et même dans les rochers voisins de la mer; une ponte.

Se nourrit principalement de mollusques, moules, huîtres, etc., vers, crustacés, insectes et larves. Très sociable à l'arrière-saison. Cris : « cadyt cadyt cadyt », « wip-kwip », « pik pik pik... », « pulit pulit... ».

301. - *Numenius arquata arquata* (Linné)



Grote Wulp - Grand Courlis

N° 301 - GROTE WULP

Numenius arquata arquata (Linné). - 1/5.

Orde CHARADRIIFORMES. - Familie CHARADRIIDÆ.

Bewoont plaatselijk bijna geheel Europa, met uitzondering van de meest zuidelijke landen; overwintert van de Middellandse Zee tot het Zuiden van Afrika. Een ander gewestelijk ras bevindt zich in Azië.

Leeft op de oevers van de zee, op weiden, onbebouwde plaatsen en heide. Nestelt in het binnenland in de moerassen en vochtige heide. Een kuultje in de grond, in gras of heidekruid, is gevoeird met gras, stengels van heidekruid of andere planten; 4 olijfgroene gevlekte eieren; één broedsel.

In België nestelt hij vooral in de heide van de Kempen, en in beperkt aantal in de Venen. Gezellig. Voedt zich met weekdieren, slakken, schaaldieren, kleine vissen, kleine kikvorsen, wormen, evenals een weinig plantaardige stoffen: zaden, bladeren, bessen, wieren. Roepen: « koeli koeli », « koer-li koer-li », « rroewi-rroewi-rroewi », « koewihi koewihi ».

N° 301 - GRAND COURLIS

Numenius arquata arquata (Linné). 1/5.

Ordre CHARADRIIFORMES. - Famille CHARADRIIDÆ.

Habite localement presque toute l'Europe, à l'exception des pays les plus méridionaux; hiverne depuis la Méditerranée jusqu'au sud de l'Afrique. Une autre race géographique se trouve en Asie.

Vit sur les bords de la mer, dans les prairies, lieux incultes et bruyères. Niche à l'intérieur des terres dans les marais et bruyères humides. Une cavité du sol, dans les herbes ou les bruyères, est garnie d'herbes, tiges de bruyères ou autres plantes; 4 œufs y sont déposés, de couleur olive, tachetés; une nichée.

En Belgique, niche principalement dans les bruyères de la Campine et en nombre restreint sur les Fagnes. Sociable. Se nourrit de mollusques, limaces, crustacés, petits poissons, petites grenouilles, vers, ainsi qu'un peu de matières végétales: graines, feuilles, baies, algues. Cris: « couli couli », « cour-li cour-li », « rroui-rroui-rroui », « couwihi couwihi ».

N° 302 - DUNBEKWULP

Numenius tenuirostris Vieillot. - 1/4.

Orde CHARADRIIFORMES. - Famille CHARADRIIDÆ.

Nestelt in het Westen van Siberië; trekt door het Oosten van Europa en het Westen van Azië tot de Middellandse Zee en 'Egypte. Bezoekt zelden België.

Leeft in de moerassen, de vochtige steppen; nestelt op de hoge droge plaatsen, de landhoogten, heuveltjes, waar een holte in de grond belegd wordt met enige grashalmen; 4 olijfgrijze tot geelachtige gevlekte eieren; één broedsel.

Voedt zich met kerfdieren, wormen en kleine weekdieren. Roep: een hoog en slepend « piep ».

302. - *Numenius tenuirostris* Vieillot



Dunbekwulp - Courlis à bec grêle

N° 302 - COURLIS A BEC GRELE

Numenius tenuirostris Vieillot. - 1/4.

Ordre CHARADRIIFORMES.

Famille CHARADRIIDÆ.

Niche dans l'ouest de la Sibérie; émigre à travers l'est de l'Europe et l'ouest de l'Asie jusqu'à la Méditerranée et en Egypte. Visite rarement la Belgique.

Vit dans les marais, les steppes humides; niche sur les endroits élevés et secs, terres, petites collines, où un creux du sol est garni de quelques brins d'herbes; 4 œufs, gris olive à jaunâtre, tachetés; une nichée.

Se nourrit d'insectes, vers et petits mollusques. Cri: un « piep » élevé et traînant.

303. - *Numenius phaeopus phaeopus* (Linné)



Regenwulp - Courlis corlieu

N° 303 - REGENWULP

Numenius phaeopus phaeopus (Linné). - 1/4.

Orde CHARADRIIFORMES. - Familie CHARADRIIDÆ.

Bewoont het hoge Noorden van Europa en het Westen van Siberië; overwintert in Afrika en het Zuiden van Azië. Andere ondersoorten werden beschreven voor het Noord-Oosten van Azië en het Oosten van Afrika. Regelmatige trekker en gemeen in België.

Bewoont de toendra's, moerassen en heide. Het nest wordt gebouwd met enige grasstengels in een holte van de grond; 4 olijfgroene gevlekte eieren; één broedsel.

Gezellig. Na de voortplanting houdt hij zich vooral op aan de kusten van de zee en bij de stroommondingen, zeldener bij de binnenwaters. Voedt zich met kerfdieren, wormen, schaaldieren, weekdieren, alsook met bessen in de toendra. Roepen : « tetti tetti », « tut-tut-tut-tut-tut », « treuwi treuwi vleuwi »; zang : « düdüdü dididi », met fijne stem al trillend uitgebracht.

N° 303 - COURLIS CORLIEU

Numenius phaeopus phaeopus (Linné). - 1/4.

Orde CHARADRIIFORMES. - Familie CHARADRIIDÆ.

Habite le haut nord de l'Europe et l'ouest de la Sibérie; hiverne en Afrique et au sud de l'Asie. D'autres sous-espèces sont décrites du nord-est de l'Asie et de l'est de l'Afrique. Migrateur régulier et commun en Belgique.

Habite les toundras, marais et bruyères. Le nid est construit de quelques tiges d'herbes disposées dans une dépression du sol; 4 œufs, vert olive, tachetés; une nichée.

Sociable. Après la reproduction, se tient principalement sur les côtes de la mer et les bouches des fleuves, plus rarement près des eaux intérieures. Se nourrit d'insectes, vers, crustacés, mollusques, ainsi que de baies dans la toundra. Cris : « tetti tetti », « tut-tut-tut-tut-tut », « treui treui, vleui »; chant : « düdüdü dididi », émis en trille, d'une voix flûtée.

N° 304 - HOUTSNIP

Scolopax rusticola rusticola Linné. - 1/2.

Orde CHARADRIIFORMES. - Familie CHARADRIIDÆ.

Bewoont geheel Europa en het Noorden van Azië tot de centrale bergketen. De bewoners van het Noorden trekken zuidwaarts, naar de Middellandse Zee, het Noorden van Afrika, het Zuiden van Azië. Nestelt in onze grote wouden; gemeen op de doortochten.

Echte woudvogel; woont, leeft en nestelt in de bossen, vooral van bladlobbigen, bij voorkeur eiken. Nest van mos en bladeren, gebouwd in een holte van de grond, onder een struik of aan de voet van een boom; 4 bleekgele gevlekte eieren. Soms twee broedsels; in geval van onveiligheid draagt zij haar jongen tussen haar poten weg.

Doorgaans afgezonderd; is enkel 's avonds en 's nachts bedrijvig. Verlaat 's avonds het bos om haar voedsel te zoeken in de moerassen en vochtige plaatsen van de omgeving. Eet vooral aardwormen; voegt er kerfdieren en weekdieren bij. Leeft niet bij paren. In de lente voert het mannetje 's morgens en 's avonds paarvluchten uit op de open plaatsen en aan de rand der bossen, al zingende « kworr » of « kworrorr ». Andere roepen zijn « katsch » of « etsch », « dah », « psiep ». Zeer gezocht wild.

304. - *Scolopax rusticola rusticola* Linné



Houtsnip - Bécasse des bois

N° 304 - BECASSE DES BOIS

Scolopax rusticola rusticola Linné
- 1/2.

Orde CHARADRIIFORMES.

Familie CHARADRIIDÆ.

Habite toute l'Europe et le nord de l'Asie jusqu'à la chaîne de montagnes centrale. Les habitants du nord émigrent au sud, à la Méditerranée, au nord de l'Afrique, au sud de l'Asie. Niche dans nos grandes forêts; commun aux passages.

Oiseau essentiellement sylvicole: vit et niche dans les bois, principalement d'essences feuillues, des chênes de préférence. Nid construit de mousse et de feuilles dans une cavité du sol, sous un buisson ou au pied d'un arbre; 4 œufs, jaune pâle, tachetés. Parfois deux nichées. En cas d'insécurité, transporte ses jeunes entre les pattes.

Généralement isolé; n'est actif que le soir et la nuit. Le soir, quitte le bois pour chercher sa nourriture dans les marais et endroits humides voisins. Mange principalement des vers de terre; y ajoute des insectes et des mollusques. Ne vit pas en couples. Au printemps, le matin et le soir, le mâle exécute des vols nuptiaux dans les clairières et à la lisière des bois, en chantant « quorr » ou « quorrorr ». C'est la « croule » des chasseurs. D'autres cris sont encore « katsch » ou « etsch », « dah », « psiep ». Gibier très recherché.

305. - *Capella gallinago gallinago* (Linné)



Watersnip - Bécassine des marais

N° 305 - BECASSINE DES MARAIS

Capella gallinago gallinago (Linné). - 1/2.

Ordre CHARADRIIFORMES. - Famille CHARADRIIDÆ.

Niche localement en Europe, sauf dans l'extrême sud. Hiverné près de la mer Méditerranée, dans le nord et l'est de l'Afrique et dans le sud de l'Asie. D'autres sous-espèces habitent l'Islande et les îles Féroé, l'Afrique et le nord de l'Amérique. Rare nicheur, commun aux passages en Belgique. Affectionne les marais, prairies humides, bords des eaux. Nid d'herbes établi dans quelque creux du sol, parmi les herbes ou bruyères; 4 œufs, rous-sâtres, tachetés; peut-être parfois une seconde nichée.

Se nourrit en premier lieu de vers de terre et vers de vase; ensuite, de mollusques, d'insectes, parfois de quelques graines. Voix: « etsch », « ketsch » ou « gretsch », « tchaip ». Pendant ses vols nuptiaux au haut des airs, fait entendre un son ressemblant au bêlement de la chèvre, son attribué aux vibrations des deux pennes externes de la queue. Considéré comme le gibier le plus succulent.

N° 306 - POELSNIP

Capella media (Latham). - 1/3.

Ordre CHARADRIIFORMES. - Famille CHARADRIIDÆ.

Bewoont het Noorden van Europa tot Zuid-Denemarken en Duitsland, en het Westen van Siberië. Trekt in de winter naar Afrika. Gaat zelden over België.

Bezoekt de moerassen en vochtige weiden; nestelt op de droge plaatsen van de toendra's en moerassen, soms tussen het kreupelhout. Nest van gras in een kuultje van de grond; 4 rosachtige gevlekte eieren; één broedsel.

Voedt zich met aardwormen, slakken, kerfdieren en larven.

Als de Kemphanen, bevechten de mannetjes elkander 's morgens en 's avonds op spelende wijze en voeren paardansen uit terwijl zij hun vleugel- en staartvederen uitspreiden, met hun bek klappen en zingen: « bibbibibibibibie-ie » en « orrorrorrorrr ». Schreeuw bij het opvliegen: « baed baed » of « krô ».

306. - *Capella media* (Latham)



Poelsnip - Bécassine double

N° 305 - WATERSNIP

Capella gallinago gallinago (Linné).
- 1/2.

Ordre CHARADRIIFORMES.

Famille CHARADRIIDÆ.

Nestelt plaatselijk in Europa, buiten het uiterste Noorden. Overwintert bij de Middellandse Zee, in het Noorden en het Oosten van Afrika en het Zuiden van Azië. Andere ondersoorten bewonen IJsland en de Feroë-eilanden, Afrika en Noord-Amerika. Zeldzame broedvogel, gemeen op de doortochten in België. Houdt van moerassen, vochtige weiden, waterboorden. Nest van gras geplaatst in een holte van de grond, tussen het gras of het heidekruid; 4 rosachtige gevlekte eieren; misschien soms een tweede broedsel.

Voedt zich vooral met aard- en slijk-wormen; dan met weekdieren, kerfdieren, soms enige zaden. Stem: « etsch », « ketsch » of « gretsch », « tjeip ». Gedurende haar paarvluchten hoog in de lucht, laat zij een klank horen die op het geblaas van de geit lijkt en die toegeschreven wordt aan de trillingen van de twee buitenste staartvederen. Beschouwd als het lekkerste wild.

N° 306 - BECASSINE DOUBLE

Capella media (Latham). - 1/3.

Ordre CHARADRIIFORMES.

Famille CHARADRIIDÆ.

Habite le nord de l'Europe et l'ouest de la Sibérie; en Europe, au sud jusqu'au Danemark et l'Allemagne. Emigre en Afrique. Passe rarement par la Belgique. Fréquente les marais et prairies humides; niche dans les endroits secs des toundras et marécages, parfois parmi les broussailles. Nid d'herbes dans une petite fosse du sol; 4 œufs, roussâtres, tachetés; une couvée.

Se nourrit de vers de terre, limaces, insectes et larves.

Le matin et le soir, à la façon des Chevaliers combattants, les mâles se livrent des combats inoffensifs et exécutent des danses nuptiales en étalant les pennes des ailes et de la queue, tout en faisant claquer leur bec et chantant: « bibbibibibibibie-ie » et « orrorrorrorrr ». Cri de départ: « baed baed » ou « krô ».

307. - *Lymnocyptes minimus* (Brünnich)



Dove Snip - Bécassine sourde

N° 307 - BECASSINE SOURDE

Lymnocyptes minimus (Brünnich). - 3/5.

Ordre CHARADRIIFORMES. - Famille CHARADRIIDÆ.

Habite le nord de l'Europe et de l'Asie, à l'est jusqu'à la rivière Kolyma; en Europe, au sud jusqu'à l'Allemagne, la Pologne à travers la Russie jusqu'en Sibérie. Hiverné au nord de l'Afrique, dans l'ouest et le sud de l'Asie. Migrateur commun en Belgique.

Fréquente les marécages et ne s'enfuit que devant les pieds du chasseur. Niche dans les marais dans une petite fosse garnie d'herbes; 4 œufs, roux foncé, tachetés; une nichée.

Oiseau solitaire. Au printemps, il fait entendre des « tettetettettettette » que certains observateurs croient produits par le battement des mandibules. En s'élançant vers le ciel il exécute son chant nuptial: « lok-toggi lok-toggi lok-toggi » ou « tlock tlockli, tlock tlockli... ». Hors du temps de la reproduction, est très silencieux et l'on entend rarement son cri: « kitz » ou « kütz » et un faible « tjaip ».

Se nourrit de vers, mollusques, insectes. Comme toutes les Bécassines, a la chair de très bon goût.

N° 307 - DOVE SNIP

Lymnocyptes minimus (Brünnich).
- 3/5.

Orde CHARADRIIFORMES.

Famille CHARADRIIDÆ.

Bewoont het Noorden van Europa en Azië, oostwaarts tot de Kolymarivier; in Europa, zuidwaarts tot Duitsland, Polen door Rusland tot Siberië. Overwintert in het Noorden van Afrika, het Westen en het Zuiden van Azië. Als trekvogel gemeen in België.

Bezoekt de vochtige plaatsen en vlucht maar vóór de voeten van de jager. Nestelt in de moerassen in een kuiltje met gras gevoerd; 4 donkerroze, gevlekte eieren; één broedsel.

Eenzame vogel. In de lente laat hij een « tettetettettettette » horen, dat door sommige waarnemers toegeschreven wordt aan het klappen van de snavel. Terwijl hij naar omhoog vliegt, voert hij zijn paarzang uit: « lok-toggi lok-toggi lok-toggi » of « tlock tlockli, tlock tlockli... ». Buiten de kweektijd is hij zeer zwijzaam en hoort men zelden zijn geroep: « kitz » of « kütz » en een zwak « tjeip ». Voedt zich met wormen, weekdieren, kerfdieren. Heeft evenals de andere snippen, een zeer smakelijk vlees.

308. - *Stercorarius skua skua* (Brünnich)



Grote Meeuwjager - Grand Labbe
1. Volwassen - Adulte - 2. Jong - Jeune

N° 308 - GROTE MEEUWJAGER

Stercorarius skua skua (Brünnich). - 1/6.

Orde LARIFORMES. - Famille LARIDÆ.

Nestelt in IJsland, op de Feroë-eilanden, Shetland en de Orcaden. Zwerft in de winter meer naar het Zuiden tot Madera. Andere ondersoorten werden in de zeeën van het Zuiden vermeld. Vogel van de volle zee, die zich zelden op onze kusten, bij uitzondering in het binnenland vertoont. Nestelt gewoonlijk in koloniën; nest in een indrukking van de grond in de heide of grazige plaatsen, bekleed met enige plantenstengels; 2 olifbruine gevlekte eieren; één broedsel.

Voedt zich met vissen die hij vangt of die hij de Meeuwen en Zeezwaluwen, door zijn herhaalde aanvallen, op roofvogelwijze verplicht uit te braken; valt ook vogels aan om ze te doden; stelt zich eveneens tevreden met alle soorten afval, lijken en krengen. Schreeuwen: « a-er a-er », « gak gak », « ag, og », « iee-ia », « koo », « skirr ».

N° 308 - GRAND LABBE

Stercorarius skua skua (Brünnich). - 1/6.


Ordre LARIFORMES. - Famille LARIDÆ.

Niche en Islande, aux îles Féroë, Shetland et Orcades. En hiver, erre plus au sud jusqu'à Madère. D'autres sous-espèces sont signalées dans les mers du sud. Oiseau de pleine mer qui se montre rarement sur nos côtes, exceptionnellement à l'intérieur.

Niche ordinairement en colonies; nid dans une dépression du sol dans les bruyères ou des endroits herbeux, garni de quelques tiges de plantes; 2 œufs, brun olive, tachetés; une nichée.

Se nourrit de poissons qu'il pêche ou qu'il oblige à dégorger les Goélands, Mouettes et Sternes par ses attaques répétées, à la manière des rapaces; attaque aussi des oiseaux pour les tuer; se contente également de toutes espèces de déchets, cadavres et charognes. Cris: « a-er a-er », « gac gac », « ag, og », « iee-ia », « koo », « skirr ».

309. - *Stercorarius pomarinus* (Temminck)



Middelste Meeuwjager - Labbe pomarin
 1. Volwassen (bleke kledij) - Adulte (phase pâle)
 2. Jong (donkere kledij) - Jeune (phase foncée)

N° 309 - MIDDELSTE

MEEUWJAGER

Stercorarius pomarinus (Temminck).

- 1/5.

Orde LARIFORMES.

Familie LARIDÆ.

Nestelt in de noordpoolstreken van Europa, Azië en Amerika; overwintert meer in het Zuiden tot het Zuiden van Afrika, het midden van Amerika en Australië.

Nestelt in de toendra's; een indrukking in het mos ontvangt 2 olijfbuine gevlekte eieren; één broedsel.

In de zomer eet hij veel lemmingen, eieren en jonge vogels; verder vangt hij regelmatig vissen of bemachtigt hij prooien die de Meeuwen en Zeezwaluwen onder zijn aanvallen uitbraken; voedt zich ook met lijken en krenge. Stem: « tobie tobie », « i-à i-à », « we-wewew ».

N° 309 - LABBE POMARIN

Stercorarius pomarinus (Temminck). - 1/5.

Ordre LARIFORMES. - Famille LARIDÆ.

Niche dans les régions arctiques de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique; hiverne plus au sud jusqu'au sud de l'Afrique, au centre de l'Amérique et en Australie.

Niche dans les toundras; une dépression dans la mousse reçoit 2 œufs, brun olive, tachetés; une couvée.

En été, mange beaucoup de lemmings, œufs et jeunes oiseaux; en tout temps, capture des poissons ou s'empare des proies que Mouettes et Sternes dégorger sous ses attaques; se nourrit aussi de cadavres et de charognes. Voix: « toby toby », « i-à i-à », « wewewew ».

N° 310 - KLEINE MEEUWJAGER

Stercorarius parasiticus (Linné). - 1/5.

Orde LARIFORMES. - Famille LARIDÆ.

Bewoont het hoge Noorden van Europa, Azië en Amerika; ten Zuiden tot het Noorden van Schotland en het Zuiden van Scandinavië. Overwintert op de kusten van Zuid-Europa, Afrika, het Zuiden van Azië tot Australië, Midden- en Zuid-Amerika.

Wintervogel in klein getal op onze kust en soms op de binnenwaters.

Nestelt in koloniën in de toendra's en moerassen van het Noorden; het nest is een putteke in gras of mos, bekleed met enige plantenstengeltjes; 2 olijfbuine gevlekte eieren; één broedsel.

Voedt zich met vissen die hij vangt of aan de Meeuwen en Zeezwaluwen ontnemt door ze te doen braken, verder met eieren en jonge vogels, schaaldieren en kerfdieren, wormen en krenge. Schreeuwen: « oewelie », « iae », « ieja », « ieja-ieja », « kiaowa ».

310. - *Stercorarius parasiticus* (Linné)



Kleine Meeuwjager - Labbe parasite
 1. Volwassen (bleke kledij) - Adulte (phase claire)
 2. Jong (bleke kledij) - Jeune (phase claire)
 3. Volwassen (donkere kledij) - Adulte (phase foncée)

N° 310 - LABBE PARASITE

Stercorarius parasiticus (Linné). - 1/5.

Ordre LARIFORMES.

Familie LARIDÆ.

Habite le haut nord de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique; au sud, jusqu'au nord de l'Ecosse et le sud de la Scandinavie. Hiverne sur les côtes de l'Europe méridionale, de l'Afrique, du sud de l'Asie jusqu'à l'Australie, de l'Amérique centrale et méridionale.

Oiseau d'hiver en petit nombre sur notre côte et parfois sur les eaux intérieures.

Niche en colonies dans les toundras et les marécages du nord; le nid est une dépression dans l'herbe ou la mousse, garnie de quelques brins de plantes; 2 œufs, brun olive, tachetés; une couvée.

Se nourrit de poissons qu'il pêche ou dérobe aux Mouettes et Sternes qu'il force à dégorger, d'œufs et jeunes oiseaux, crustacés et insectes, vers et charognes. Cris: « oueli », « iae », « ia », « ia-ia », « kiaoua ».



Langstaartmeeuwjager - Labbe à longue queue
1. Volwassen (bleke kledij) - Adulte (phase claire)
2. Jong (donkere kledij) - Jeune (phase foncée)

N° 311 - LANGSTAARTMEEUWJAGER

Stercorarius longicaudus Vieillot. - 1/6.

Orde LARIFORMES. - Familie LARIDÆ.

Nestelt in het Noorden van Europa, Azië en Amerika; in de winter houdt hij zich meer in het Zuiden, tot de Middellandse Zee, Japan en de oostelijke en westelijke kusten der Verenigde Staten. Zeldzame en onregelmatige bezoeker in België.

Nestelt in een indrukking van het mos of een holte gekrabbd in de grond van de toendra's; 2 olijfbuine gevlekte eieren; één broedsel.

Voedt zich met vissen door hem gevangen of uitgebraakt door de Meeuwen en Zeezwaluwen, die hij nochtans minder vaak vervolgt dan de andere Meeuwjagers. Eet ook kleine zoogdieren, eieren en jonge vogels, schaaldieren, weekdieren, wormen, kerfdieren en stelt zich desnoods met krenge te vreden. De jongen voeden zich doorgaans met bessen van de toendra. Schreeuwen: « ie-ie-ah », « jee-ah », « jee-oh ».

N° 311 - LABBE A LONGUE QUEUE

Stercorarius longicaudus Vieillot. - 1/6.

Orde LARIFORMES. - Famille LARIDÆ.

Niche dans le nord de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique; en hiver, se tient plus au sud, jusqu'à la Méditerranée, le Japon et les côtes est et ouest des États-Unis. Visiteur rare et irrégulier en Belgique.

Niche dans une dépression de la mousse ou un creux gratté dans le sol des toundras; 2 œufs, brun olive, tachetés; une couvée.

Se nourrit de poissons pêchés ou dégorgés par les Mouettes et Sternes, qu'il poursuit cependant moins souvent que les autres Stercoraires (Labbes); mange aussi de petits mammifères, œufs de jeunes oiseaux, crustacés, mollusques, vers, insectes et se contente au besoin de charognes. Les jeunes se nourrissent couramment de baies de la toundra. Cris: « i-i-ah », « je-ah », « je-oh ».



Alk - Petit Pingouin
1. Paarkleed - Nuptial - 2. Voorkleed - Prénuptial

N° 312 - ALK

Alca torda torda Linné. - 1/4.

Orde ALCIFORMES. - Famille ALCIDÆ.

Nestelt op de kusten en de eilanden van het Noorden van de Atlantische Oceaan, in het Zuiden tot het Kanaal, in Amerika tot de Sint-Laurens golf. Begeeft zich in de winter meer naar het Zuiden, tot de Middellandse Zee en de kusten van Marokko.

Vogel van de volle zee; komt slechts zelden onze kust nabij, doch de stormen jagen hem soms op onze zeeoeveren en vogels, met stookolie besmeurd, komen er stranden. Wordt zelden in het binnenland waargenomen. Nestelt in koloniën op de kornissen en uitsteeken van rotsen op de oever van de zee, zo mogelijk in een hol of spleet; 1 bruingeel gevlekt ei; één broedsel.

Voedt zich vooral met vis, die hij al duikende vangt, alsook met schaaldieren. Om zijn jongen te voeden, draagt hij de kleine vissen dwars in de bek. Roepen: « arrr orrr », « kwerrr, krr », « kwaw, krauw », « koewerrr-koe-koe »; jongen: « billie billie ».

N° 312 - PETIT PINGOUIN

Alca torda torda Linné. - 1/4.

Orde ALCIFORMES. - Famille ALCIDÆ.

Niche sur les côtes et les îles du nord de l'Atlantique, au sud jusqu'à la Manche, en Amérique jusqu'au golfe Saint-Laurent. Se rend plus au sud en hiver, jusqu'à la Méditerranée et les côtes du Maroc.

Oiseau de pleine mer; ne s'approche que rarement de notre côte, mais les tempêtes le chassent parfois sur nos plages et des oiseaux souillés de mazout viennent y échouer. Se voit rarement à l'intérieur des terres.

Niche en colonies sur les corniches et saillies de rocher au bord de la mer, si possible dans quelque trou ou crevasse; 1 œuf, jaune brunâtre, tacheté; une couvée.

Se nourrit principalement de poissons, qu'il capture en plongeant, ainsi que de crustacés. Pour nourrir ses jeunes, porte les petits poissons en travers du bec. Cris: « arrr arrr », « querr, krrr », « quaw, krauw », « couwerrr-cou-cou »; jeunes: « bilie bilie ».

313. - *Plotus alle alle* (Linné)



Kleine Alk - Mergule nain
1. Paarkleed - Nuptial - 2. Voorkleed - Pré-nuptial

N° 313 - KLEINE ALK

Plotus alle alle (Linné). - 1/3.

Orde ALCIFORMES. - Familie ALCIDÆ.

Nestelt in het uiterste Noorden van Europa en het Noord-Oosten van Amerika; trekt in de winter meer naar het Zuiden, tot de Azoren, Madera, zelden tot de Middellandse Zee; in Amerika, bij de oostelijke kusten van de Verenigde Staten.

Houdt zich gewoonlijk op in de zee, van de kusten verwijderd; strandt er soms bij stormen; zelden in het binnenland.

Nestelt in koloniën, dikwijls op de rotsen aan de zee, ofwel op enige afstand van de kusten, in de spleten of kloven van bergen, op een hoop stenen, enz.; 1 bleekblauw ei, dikwijls zonder vlek; één legsel.

Voedt zich met kleine schaaldieren, kleine zeediertjes, plankton, kleine vissen. Roep : « prrrrrr kwie kwiekwiekwie ».

N° 313 - MERGULE NAIN

Plotus alle alle (Linné). 1/3.

Ordre ALCIFORMES. - Famille ALCIDÆ.

Niche dans l'extrême nord de l'Europe et le nord-est de l'Amérique; passe plus au sud en hiver, jusqu'aux Açores, Madère, rarement dans la Méditerranée; en Amérique, près des côtes est des Etats-Unis.

Se tient généralement en mer à distance des côtes; y échoue parfois lors des tempêtes; rarement à l'intérieur des terres.

Niche en colonies souvent sur les rochers de la mer, sinon à quelque distance des côtes, dans des fentes ou crevasses de montagnes, sur un tas de pierres, etc., sans litière; 1 œuf, bleu pâle, souvent sans tache; une ponte.

Se nourrit de petits crustacés, petits organismes, plancton, petits poissons. Cri : « prrrrrr kwie kwiekwiekwie ».

314. - *Uria aalge aalge* (Pontoppidan)



Noordelijke Zeekoet - Guillemot de Troil du Nord
1. Paarkleed - Nuptial - 2. Voorkleed - Pré-nuptial

N° 314 - NOORDELIJKE ZEEKOET

Uria aalge aalge (Pontoppidan). - 1/4.

Orde ALCIFORMES. - Familie ALCIDÆ.

Nestelt op de kusten en de eilanden van het Noorden van Europa en het Noord-Oosten van Amerika; overwintert meer ten Zuiden, tot de golf van Gasconje en de kusten van het Noorden der Verenigde Staten.

Winterbezoeker op onze kust en de Beneden-Schelde; zeldzaam in het binnenland.

Nestelt in koloniën op de boorden en kornissen van de rotsen op de oever van de zee; geen nest; 1 ei van veranderlijke kleur, geelachtig tot groenachtig, gewoonlijk weinig gemerkt; één legsel.

Voedt zich met kleine vissen, schaal- en weekdieren. Geroepen : « rrrrrr », « rrraaa », « arr, aurr », « eurrer merrerrerrerr », « edarrerrerr », « eioerrerrerr ».

N° 314 - GUILLEMOT DE TROÏL DU NORD

Uria aalge aalge (Pontoppidan). - 1/4.


Ordre ALCIFORMES. - Famille ALCIDÆ.

Niche sur les côtes et les îles du nord de l'Europe et du nord-est de l'Amérique; hiverne plus au sud, jusqu'au golfe de Gascogne et les côtes du nord des Etats-Unis.

Visiteur d'hiver sur notre côte et le Bas-Escaut; rare à l'intérieur du pays. Niche en colonies sur les rebords et corniches des rochers au bord de la mer; pas de nid; 1 œuf, de couleur variable, jaunâtre à verdâtre, ordinairement peu marqué; une ponte.

Se nourrit de petits poissons, crustacés et mollusques. Cris : « rrrrrr », « rrraaa », « arr, aurr », « eurrer merrerrerrerr », « edarrerrerr », « eioerrerrerr ».

315. - *Uria grylle grylle* (Linné)



Zwarte Zeekoet - Guillemot à miroir
1. Paarkleed - Nuptial - 2. Voorkleed - Prénuptial

N° 315 - ZWARTE ZEEKOET

Uria grylle grylle (Linné). - 1/3.

Orde ALCIFORMES.

Familie ALCIDÆ.

Nestelt op de kusten en eilanden van het Noorden van Europa, in het Oosten tot de Witte Zee; bewoont in het Westen eveneens het Zuiden van Groenland en het Oosten van Kanada. Overwintert in het Noorden van de Atlantische Oceaan tot de breedte van het Kanaal. Een andere ondersoort bewoont de noordpoolstreken van Europa en Amerika. Zeldzame en onregelmatige zeevogel langsheen onze kust.

Nestelt meest in koloniën op de naakte grond van de rotsen of in de ene of andere spleet van de steile zeeoever; 3 witte, gevlekte, min of meer blauw-groen gekleurde eieren; één broedsel. Eet kleine vissen, schaaldieren, weekdieren en andere kleine zeedieren. Stemgeluiden: « ssie ssie ssie », « fiep fiep fiep ».

N° 315 - GUILLEMOT A MIROIR

Uria grylle grylle (Linné). - 1/3.

Orde ALCIFORMES. - Familie ALCIDÆ.

Niche sur les côtes et les îles du nord de l'Europe, à l'est jusqu'à la mer Blanche; à l'ouest, il habite également le sud du Groenland et l'est du Canada. Hiverne dans le nord de l'océan Atlantique jusqu'à la latitude de la Manche. Une autre sous-espèce habite les régions arctiques de l'Europe et de l'Amérique. Oiseau de mer rare et irrégulier le long de notre littoral.

Niche le plus souvent en colonies sur le sol nu des rochers et dans quelque crevasse des falaises; 3 œufs, blancs, plus ou moins teintés de vert bleuâtre, tachetés; une nichée.

Mange de petits poissons, crustacés, mollusques et autres petits animaux marins. Gris: « ssie ssie ssie », « fiep fiep fiep ».

316. - *Fratercula arctica grabae* (Brehm)



Papegaiduiker - Macareux moine
1. Volwassen - Adulte - 2. Jong - Jeune

N° 316 - PAPEGAIDUIKER

Fratercula arctica grabae (Brehm). - 1/3.

Orde ALCIFORMES. - Familie ALCIDÆ.

Nestelt op de Feroë-eilanden, de Britse Eilanden, de kusten van Bretagne en de eilanden van het Kanaal. Andere ondersoorten bewonen het Noorden en het hoge Noorden van Europa en Amerika.

Zeevogel die in klein getal overwintert vóór onze kust en die er soms heen gedreven wordt door de stormen of er strandt door stookolie besmeurd. Zeldzaam in het binnenland.

Nestelt in koloniën in de konijnen- of andere hopen in de grazige grond, doch ook in de gangen die hij krabt in een losse bodem zoals de veenlaag op zekere eilanden; 1 doorgans wit ei, zonder vlek; één legsel.

Eet kleine vissen, schaaldieren; draagt vissen naar zijn jong, dwars in de bek. In de lente ondergaat zijn snavel een rui om groter en meer gekleurd te worden. Roepen: « arr, orrr », « aich ooch ».

N° 316 - MACAREUX MOINE

Fratercula arctica grabae (Brehm). - 1/3.

Orde ALCIFORMES. - Familie ALCIDÆ.

Niche dans les îles Féroë, les Îles Britanniques, sur les côtes de Bretagne et dans les îles de la Manche. D'autres sous-espèces habitent le nord et le haut nord de l'Europe et de l'Amérique.

Oiseau de mer. Hiverne en petit nombre devant notre littoral; y est parfois chassé par les tempêtes ou y échoue souillé par le mazout. Rare à l'intérieur des terres.

Niche en colonies dans les terriers de lapins ou autres trous dans les terrains herbeux, mais également dans des couloirs grattés par l'oiseau dans le sol meuble, comme la couche tourbeuse dans certaines îles; 1 œuf, généralement blanc, sans tache; une ponte.

Mange de petits poissons, des crustacés; porte des poissons à son jeune, en travers du bec. Au printemps, son bec subit une mue pour devenir plus grand et plus coloré. Cris: « arr, orrr », « aich aich ».

317. - *Otis tarda tarda* Linné



Grote Trap - Outarde barbue
1 ♂ 2 ♀

N° 317 - GROTE TRAP

Otis tarda tarda Linné. - 1/12.

Orde GRUIFORMES. - Familie OTIDÆ.

Bewoont het midden van Duitsland, Hongarije, de Balkan, doorheen Rusland de Kirgizen-steppen en het Westen van Siberië. Andere gewestelijke vormen bevinden zich in Azië. Zeldzame en onregelmatige bezoeker in België.

Houdt van de uitgestrekte open vlakten; nest in een gewoonlijk naakte holte van de grond, dikwijls in de graanvelden; 2-3 olijfgroene gevlekte eieren; één legsel.

Is geen trekvogel, doch onderneemt sommige winters grote tochten naar het Zuiden en het Westen van Europa. Uiterst wild en waakzaam. De houdingen der mannetjes bij hun paarspelen zijn indrukwekkend.

Voorral plantaardig voedsel : gras, zaden, scheuten en bladeren van planten; ook kerfdieren, wormen, slakken, hagedissen, kleine zoogdieren. Zijn vlees heeft een zeer sterke smaak.

Zwijgzame vogel, waarvan men alleen « och och » hoort, of « ooch ooch », « hou », « pëng »; jongen : « tirrr ».

N° 317 - OUTARDE BARBUE

Otis tarda tarda Linné. - 1/12.

Ordre GRUIFORMES. - Famille OTIDÆ.

Habite le centre de l'Allemagne, la Hongrie, les Balkans, à travers la Russie les steppes Kirghizes et l'ouest de la Sibérie. D'autres races géographiques se trouvent en Asie. Visiteur rare et irrégulier en Belgique. Affectionne les vastes plaines ouvertes; nid dans une dépression du sol, rarement garni d'un peu de litière, souvent dans les blés; 2-3 œufs, vert olive, tachetés; une couvée.

N'est pas migrateur, mais, certains hivers, fait de grandes excursions vers le sud et l'ouest de l'Europe. Extrêmement sauvage et vigilant. Les poses amoureuses des mâles sont impressionnantes.

Nourriture principalement végétale : herbes, graines, pousses et feuilles de plantes, auxquelles s'ajoutent des insectes, vers, limaces, lézards, petits mammifères. Sa chair a un goût très relevé.

Oiseau silencieux dont on n'entend que « och och », ou « ooch ooch », « hou », « pëng »; jeunes : « tirrr ».

318. - *Otis tetrax tetrax* Linné



Kleine Trap - Outarde canepetière
1. Paarkleed - Nuptial - 2. Voorkleed - Prénuptial

N° 318 - KLEINE TRAP

Otis tetrax tetrax Linné. - 1/5.

Orde GRUIFORMES. - Familie OTIDÆ.

Bewoont het Noord-Westen van Afrika en het Zuid-Westen van Europa tot het midden van Frankrijk. Zeldzame en onregelmatige bezoeker in België.

Toont voorliefde voor de onbebouwde grazige streken. Maakt zijn nest tussen de hoge plantengroei in een kuiltje van de grond; de ter plaatse groeiende planten, nedergedrukt en platgetrapt, dienen tot nestbelegsel; 3-4 olijfbuine eieren, met of zonder vlekken; waarschijnlijk één broedsel.

Zeer schuw en oplettend; goed wild, doch moeilijk om jagen. Voedt zich vooral met gras en andere wilde en gekweekte planten, alsook met kerfdieren, wormen, slakken en andere kleine dieren. Roepen : « terks terks », « trrr, brrrt » of « rek », « dag ».

N° 318 - OUTARDE CANEPETIERE

Otis tetrax tetrax Linné. - 1/5.

Ordre GRUIFORMES. - Famille OTIDÆ.

Habite le nord-ouest de l'Afrique et le sud-ouest de l'Europe jusqu'au milieu de la France. Visiteur rare et irrégulier en Belgique.

Recherche les régions herbeuses, incultes. Etablit son nid parmi la haute végétation, dans une cavité du sol, les plantes de l'endroit foulées comme litière; 3-4 œufs, brun olive, avec ou sans taches peu marquées; probablement une couvée.

Très sauvage et attentive; bon gibier dont la chasse est difficile. Se nourrit principalement d'herbes et autres plantes sauvages et cultivées, ainsi que d'insectes, vers, limaces et autres petits animaux. Cris : « terks terks », « trrr, brrrt » ou « rek », « dag ».

319. - *Chlamydotis undulata macqueenii*
(Gray & Hardwicke)



Aziatische Kraagtrap - Outarde de Macqueen

N° 319 - AZIATISCHE KRAAGTRAP

Chlamydotis undulata macqueenii (Gray en Hardwicke). - 1/7.

Orde GRUIFORMES. - Familie OTIDÆ.

Bewoont de streken van de Beneden-Wolga en het Westen van Azië; overwintert in het Westen van Hindoestan en in Arabië. Zwervende vogels werden gevangen in het Westen van Europa, waarvan drie in België.

Leeft in de bijna woestijnachtige streken met kreupelhout. Nestelt in een holte van de grond en legt 3-4 bruinachtige eieren, met punten en vlekken gemerkt; waarschijnlijk één broedsel.

Eet vooral plantaardig voedsel : gras, bladeren, vruchten, evenals kerfdieren, kleine hagedissen, weekdieren. Is in zekere streken het uitverkoren wild voor de valkenjacht. Zwijgzame vogel waarvan de stem niet beschreven werd.

N° 319 - OUTARDE DE MACQUEEN

Chlamydotis undulata macqueenii (Gray et Hardwicke). - 1/7.


Ordre GRUIFORMES. - Famille OTIDÆ.

Habite les régions du Bas-Volga et l'ouest de l'Asie; hiverne dans l'ouest de l'Hindoustan et en Arabie. Des individus errants ont été capturés dans l'ouest de l'Europe, dont trois en Belgique.

Vit dans les contrées semi-désertiques pourvues de broussailles. Niche dans un creux du sol et pond 3-4 œufs, brunâtres, marqués de points et de taches; probablement une couvée.

Nourriture principalement végétale : herbes, feuilles, fruits. Mange également des insectes, petits lézards, mollusques. Dans certains pays est le gibier favori pour la chasse au Faucon. Oiseau silencieux dont la voix n'est pas décrite.

320. - *Grus grus grus* (Linné)



Kraanvogel - Grue cendrée
1. Volwassen - Adulte - 2. Jong - Jeune

N° 320 - KRAANVOGEL

Grus grus grus (Linné). - 1/9.

Orde GRUIFORMES. - Familie GRUIDÆ.

Nestelt plaatselijk in het Noorden van Europa, oostwaarts tot de Wolga, in Midden-Europa, in de Balkans en op enige plaatsen van het Noorden van Italië en het Zuiden van Spanje. Op regelmatige doortocht in België.

Houdt zich in de grote, zelfs struikachtige moerassen en bouwt zijn nest op een verhevenheid met takken, rietstengels en andere planten; 2-3 olijfgrijze gevlekte eieren; één broedsel.

Wilde en voorzichtige vogel; zeer gezellig; trekt naar Afrika; vliegt in vorm van hoek, legt verre afstanden af en daalt slechts neer in uitgestrekte open vlakten, polders, heiden, waar zijn waakzaam oog zijn veiligheid verzekert. Zet zich op geen takken. Zijn paarspelen bestaan uit dansen en sprongen.

Voedt zich vooral met planten : gras, bladeren, wortels van waterplanten, wilde en gekweekte zaden; ook met kerfdieren, wormen, kikvorsen, kleine zoogdieren. Sterke stem : « rirr », « roerr », « krü, kroe », « kroudeloueloueloued ».

N° 320 - GRUE CENDREE

Grus grus grus (Linné). - 1/9.

Ordre GRUIFORMES. - Famille GRUIDÆ.

Niche localement dans le nord de l'Europe, à l'est jusqu'à la Volga, au centre, dans les Balkans et quelques endroits du nord de l'Italie et du sud de l'Espagne. De passage régulier en Belgique.

Se tient dans les grands marécages même buissonneux et, au moyen de branches, tiges de roseaux et autres plantes, construit son nid sur une élévation du marais; 2-3 œufs, gris olive, tachetés; une nichée.

Oiseau sauvage et prudent; très sociable; émigre en Afrique; vole en formation anguleuse, fait de longues étapes et ne descend que dans les vastes plaines découvertes, polders, bruyères, où son œil vigilant assure sa sécurité. Ne perche pas. Ses manifestations amoureuses consistent en danses et sauts.

Se nourrit surtout de végétaux : herbes, feuilles, racines de plantes aquatiques, graines sauvages et cultivées; aussi d'insectes, vers, grenouilles, petits mammifères. Voix forte : « rirr », « rourr », « krü, krou », « kroudeloueloueloued ».

321. - *Rallus aquaticus aquaticus* Linné



Waterral - Râle d'eau

1. Volwassen - Adulte - 2. Donskleed - Poussin en duvet

N° 321 - WATERRAL

Rallus aquaticus aquaticus Linné. - 2/5.

Orde GRUIFORMES.

Familie RALLIDÆ.

Nestelt in Europa, noordwaarts tot de breedte van de golf van Bothnië, in het Westen van Siberië, het Noorden van Afrika. Andere ondersoorten bevinden zich in het Noorden van Europa en in Azië. Overwintert bij de Middellandse Zee; een klein aantal blijft bij zacht weder in België.

Zoekt de moerassen op met hoge plantengroei; het nest, doorgaans wel verborgen bij het water, is gebouwd met gras, zegge, biezen; 6-10 roomwitte gevlekte eieren; waarschijnlijk twee broedsels.

Gemeen, doch leidt een zeer verborgen afgezonderd leven; loopt vlug, vliegt zelden en niet hoog. Voedt zich met kleine vissen, wormen, weekdieren, kerfdieren, larven, zaden en ander plantaardig voedsel. Roep: « giek », « pit », « gisch », « oewitt », gemengd met ronkende, scherpe, hese klanken die een waarlijk aanstotelijk geheel uitmaken.

N° 321 - RALE D'EAU

Rallus aquaticus aquaticus Linné. - 2/5.

Ordre GRUIFORMES. - Famille RALLIDÆ.

Niche en Europe, au nord jusqu'à la latitude du golfe de Bothnie, dans l'ouest de la Sibérie, le nord de l'Afrique. D'autres sous-espèces se trouvent dans le nord de l'Europe et en Asie. Hivernent près de la Méditerranée; quelques-uns restent en Belgique par temps doux.

Recherche les marais à haute végétation; le nid, généralement bien caché et près de l'eau, est construit d'herbes, laïches, joncs; 6-10 œufs, blanc crème, tachetés; probablement deux nichées.

Commun, mais mène une vie très cachée, solitaire; agile à la course, vole rarement et à peu de hauteur. Se nourrit de petits poissons, vers, mollusques, insectes, larves, graines et autre nourriture végétale. Cris: « ghick », « pit », « ghish », « ouitt », mêlés de sons ronflants, criards, rauques, formant un ensemble réellement détestable.

N° 322 - PORSELEINHOEN

Porzana porzana (Linné). - 2/5.

Ordre GRUIFORMES. - Famille RALLIDÆ.

Bewoont heel Europa en het Westen van Azië; overwintert in Afrika en het Zuiden van Azië.

Houdt zich op in de moerassen, ook in de weinig uitgestrekte; nestelt doorgaans in een dikke plantenstruik, waarin het nest van gras, zegge en rietbladeren wel verborgen is; 8-12 groenroze gevlekte eieren; waarschijnlijk één broedsel.

Leeft, zoals alle vogels van deze groep, afgezonderd en zeer verborgen; redt zich eerder al lopend of zwemmend dan al vliegend. Vliegt op trek weinig hoog en wordt dikwijls het slachtoffer van elektrische draden. Voedt zich met kerfdieren, weekdieren en beetjes waterplanten. Geroepen: « kuwiet », « kwiet », « kik », « kep », « wit », « kiëurk », « kriok »; jongen: « dioe, di ».

322. - *Porzana porzana* (Linné)



Porseleinhoen - Marouette ponctuée

1. Volwassen - Adulte - 2. Jong - Jeune

N° 322 - MAROQUETTE PONCTUEE

Porzana porzana (Linné). - 2/5.

Ordre GRUIFORMES.

Familie RALLIDÆ.

Habite toute l'Europe et l'ouest de l'Asie; hivernent en Afrique et au sud de l'Asie.

Se tient dans les marais, parfois peu étendus; niche ordinairement dans une grosse touffe de plantes, où le nid d'herbes, laïches, feuilles de roseaux est bien caché; 8-12 œufs, roux verdâtre, tachetés; probablement une nichée.

Comme tous les oiseaux de ce groupe, vit en solitaire et très caché; se sauve plutôt à la course ou à la nage qu'au vol. Emigre en volant à peu de hauteur et est souvent victime des fils électriques. Se nourrit d'insectes, mollusques et de fragments de plantes aquatiques. Cris: « huît », « quit », « kick », « kep », « wit », « kiëurk », « cryoc »; jeunes: « diou, di ».

323. - *Porzana pusilla intermedia* (Hermann)

Hub Dupond



Kleinste Porseleinhoen - Marouette de Baillon
1. Volwassen - Adulte - 2. Jong - Jeune

N° 323 - KLEINSTE PORSELEINHOEN

Porzana pusilla intermedia (Hermann). - 2/5.

Orde GRUIFORMES. - Familie RALLIDÆ.

Nestelt in het Zuiden en het midden van Europa, in het Noorden tot Holland en het midden van Duitsland; in het Westen van Afrika en op Madagascar. Overwintert in Afrika tot voorbij de Sahara. In België weinig gemene trekvogel; nestelt er misschien soms.

Bezoekt de moerassige streken; nest zorgvuldig gebouwd met waterplanten, gevoerd met rietbladeren, wel verborgen onder het gras; 6-8 rosachtige gestippelde eieren; waarschijnlijk één broedsel.

Leeft afgezonderd en zeer verborgen; sluipt behendig tussen de planten-groei; vliegt zelden en weinig hoog. Voedt zich met kerfdieren, larven en een weinig plantaardige stoffen. Roepen : « kwiek kwiek », « djak-djak », « ter-rer-rer-rer-er- ».

N° 323 - MAROQUETTE DE BAILLON

Porzana pusilla intermedia (Hermann). - 2/5.

Ordre GRUIFORMES. - Famille RALLIDÆ.

Niche dans le sud et le centre de l'Europe, au nord jusqu'à la Hollande et le milieu de l'Allemagne, dans l'ouest de l'Afrique et à Madagascar. Hiverne en Afrique jusqu'au-delà du Sahara. Migrateur peu commun en Belgique; y niche peut-être parfois.

Fréquente les endroits marécageux; nid soigneusement construit de plantes aquatiques, l'intérieur garni de feuilles de roseaux, bien caché sous les herbes; 6-8 œufs, roussâtres, pointillés; probablement une nichée.

Vit solitaire et très caché; se faufile adroitement parmi la végétation; vole rarement et peu haut. Se nourrit d'insectes, larves et d'un peu de substances végétales. Cris : « quick quik », « djak-djak », « ter-ter-rer-rer-er ».

324. - *Porzana parva* (Scopoli)



Klein Porseleinhoen - Marouette poussin
1. Volwassen - Adulte - 2. Jong - Jeune

N° 324 - KLEIN PORSELEINHOEN

Porzana parva (Scopoli). - 2/5.

Orde GRUIFORMES. - Familie RALLIDÆ.

Nestelt in het Zuiden van Europa, in het Noorden tot de Baltische Zee; doorheen Rusland in het Westen van Azië. Overwintert in de streek van de Middellandse Zee, het Noorden van Afrika, het Zuiden van Azië.

Houdt zich verdoken onder de plantengroei van de moerassige plaatsen; nest wel verborgen in het gras, gebouwd met gras, zegge, rietbladeren, enz.; 7-8 rosachtige gestippelde eieren; één broedsel.

Dit Porseleinhoen is vrij zelden op doortocht in België. Voedt zich met kerfdieren, larven en kleine weekdieren, zaden en plantaardige stoffen in kleine hoeveelheid. Stemgeluiden : « kwott », « toek », « kiek kiek », « tjek tjek », « kirrük », « üküükü », « hoe hoe hoe hoe », « dongdongdong ».

De kuikens van Rallen, Porseleinhoenders, Waterhoenders en Koeten worden geboren met een zwart dons.

N° 324 - MAROQUETTE POUSSIN

Porzana parva (Scopoli). - 2/5.

Ordre GRUIFORMES. - Famille RALLIDÆ.

Niche dans le sud de l'Europe, au nord jusqu'à la mer Baltique, à travers la Russie dans l'ouest de l'Asie. Hiverne dans la région de la Méditerranée, le nord de l'Afrique, le sud de l'Asie.

Se tient caché sous la végétation des lieux marécageux; nid bien caché dans les herbes, construit de brins d'herbes, laïches, feuilles de roseaux, etc.; 7-8 œufs, roussâtres, pointillés; une nichée.

Cette Marouette est de passage assez rare en Belgique. Se nourrit d'insectes, larves, petits mollusques, graines et matières végétales en petite quantité. Cris : « kwott », « touck », « kiek kiek », « tchec tchec », « kirrück », « üküükü », « hou hou hou hou », « dongdongdong ».

Les poussins de Râles, Marouettes, Poules d'eau et Foulques naissent revêtus d'un duvet noir.

325. - *Crex crex* (Linné)



Grasral - Râle des genêts
1. Volwassen - Adulte - 2. Jong - Jeune

N° 325 - GRASRAL

Crex crex (Linné). - 2/5.

Orde GRUIFORMES. - Famille RALLIDÆ.

Bewoont bijna geheel Europa, het Westen van Azië, Siberië tot de Lena. Overwintert in het Zuiden tot de keerkringstreken van Afrika en het Noorden van Hindoestan. Plaatselijke broedvogel in België, talrijker in de trektijd.

Vestigt zich in de vlakten: weiden, onbebouwde grazige gronden, zelfs met kreupelhout, klavervelden. Het nest is een holte in de grond, bekleed met gras, bladeren en wel verborgen in de plantengroei; 8-12 heldere gestippelde en gevlekte eieren; één broedsel.

Eet vooral kerfdieren, weekdieren, landschaaldieren; ook zaden en gebladerte. Roepen: « ki », « ka », « kio, kiu, kia », « toek », « djek ». In de lente galmen zijn zeer kenmerkende eentonige paringsroepen « rerrp rerrp rerrp... » dag en nacht.

N° 325 - RALE DES GENETS

Crex crex (Linné). - 2/5.

Ordre GRUIFORMES. - Famille RALLIDÆ.

Habite à peu près toute l'Europe, l'ouest de l'Asie et la Sibérie jusqu'à la Léna. Hiverné au sud jusqu'en Afrique tropicale et dans le nord de l'Hindoustan. Nicheur local en Belgique, plus nombreux aux passages.

S'établit dans les plaines: prairies, terres herbeuses incultes, même broussailleuses, champs de trèfle. Le nid est un creux du sol, garni d'herbes, feuilles et bien caché dans la végétation; 8-12 œufs, à fond clair, pointillés et tachetés; une couvée.

Mange surtout des insectes, mollusques, crustacés terrestres, auxquels s'ajoutent des graines et fragments de verdure. Cris: « ki », « ka », « kio, kiu, kia », « touck », « djek ». Au printemps, ses appels amoureux très caractéristiques, monotones, « rerrp rerrp rerrp » résonnent jour et nuit.

326. - *Gallinula chloropus lucida* Dunajewski



Waterhoen - Poule d'eau
1. Volwassen - Adulte - 2. Jong - Jeune
3. Donskleed - En duvet

N° 326 - WATERHOEN

Gallinula chloropus lucida Dunajewski. - 1/4.

Orde GRUIFORMES. - Famille RALLIDÆ.

Bewoont Zuid-Polen, België en waarschijnlijk het Zuiden van Duitsland. In het overige van Europa, het Noorden van Afrika en Azië bevinden zich andere gewestelijke rassen. De bewoners van Noord-Europa trekken zuidwaarts naar de Middellandse Zee.

Houdt van stilstaand zoetwater, zelfs weinig uitgestrekt of tussen woonhuizen gelegen, van het ogenblik dat enige plantengroei het toelaat zich te verschuilen en zijn nest te beschutten. Dit is gewoonlijk geplaatst tussen de waterplanten, soms in een struik of op een boom bij het water; het bestaat uit een hoop planten met nestkom in het midden; 5-10 heldere gestipte en gevlekte eieren; twee of drie broedsels.

Voedt zich vooral met planten: gras, scheuten en bladeren van planten boven het water geplukt, bessen, vruchten; ook met kerfdieren, wormen, slakken. Roepen: « ik ik », « krik krik », « kreks kreks », « kroak kroak », « djoek », « bak », « kirkrekrek », « gok gok », « giok giok »; 's nachts soms, rond het nest vliegend: « kikikik » of « terterter ».

N° 326 - POULE D'EAU

Gallinula chloropus lucida Dunajewski. - 1/4.

Ordre GRUIFORMES. - Famille RALLIDÆ.

Habite la Pologne méridionale, la Belgique et probablement le sud de l'Allemagne. Dans le reste de l'Europe, le nord de l'Afrique et en Asie se trouvent d'autres races géographiques. Les habitants du nord de l'Europe émigrent au sud vers la Méditerranée.

Affectionne les eaux douces stagnantes, même de dimensions réduites ou situées dans les agglomérations, du moment que quelque végétation lui sert de couvert et d'abri pour son nid. Celui-ci est généralement placé entre les plantes aquatiques, parfois dans buisson ou sur arbres voisins de l'eau; consiste en un tas de végétaux avec coupe centrale; 5-10 œufs, à fond clair marqué de points et de taches; deux ou trois nichées.

Se nourrit principalement de végétaux: herbes, pousses et feuilles de plantes aquatiques cueillies au-dessus de l'eau, baies, fruits, auxquels s'ajoutent des insectes, vers, limaces. Cris: « ick ick », « cric cric », « crex crex », « croac croac », « djouck », « back », « kir crecrec », « gok gok », « ghiock ghiock »; la nuit, parfois, volant autour du nid: « kikikik » ou « terterter ».

327. - *Fulica atra atra* Linné



Meerkoet - Foulque macroule
1. Volwassen - Adulte - 2. Jong - Jeune
3. Donskleed - En duvet

N° 327 - MEERKOET

Fulica atra atra Linné. - 1/5.

Orde GRUIFORMES. - Familie RALLIDÆ.

Nestelt in bijna geheel Europa en Azië, in het Noorden van Afrika. De bewoners van het Noorden trekken naar het Zuiden en vergaderen soms in grote troepen op sommige waters.

Bezoekt uitgestrekte stilstaande waters die de nodige bedekking leveren. Nest gebouwd met een grote hoop waterplanten, tussen het riet ver van de oevers geplaatst; 6-9 bruingele gestipte eieren; waarschijnlijk twee broedsels.

Voedt zich vooral met plantaardige stoffen: gras, scheuten en bladeren van waterplanten, grotendeels al duikende gevat; ook met kleine vissen, kerfdieren, weekdieren, enz. Roepen: « kōw », « puts » of « piks »; doet ook zijn snavel kraken; jongen: « fuwieb ».

N° 327 - FOULQUE MACROULE

Fulica atra atra Linné. - 1/5.

Orde GRUIFORMES. - Famille RALLIDÆ.

Niche dans presque toute l'Europe et l'Asie, dans le nord de l'Afrique. Les habitants du nord émigrent vers le sud et se rassemblent parfois en grandes troupes sur certaines eaux.

Exige des eaux stagnantes de grande étendue et offrant le couvert nécessaire. Nid construit d'une grande masse de plantes aquatiques, placée entre les roseaux loin des bords; 6-9 œufs, jaune brunâtre, pointillés; probablement deux nichées.

Se nourrit principalement de matières végétales: herbes, pousses et feuilles de plantes aquatiques obtenues, en grande partie, en plongée; aussi petits poissons, insectes, mollusques, etc. Cris: « kōw », « puts » ou « pix », fait aussi craquer le bec; jeunes: « füieb ».

N° 328 - SCHOTS SNEEUWHOEN

Lagopus scoticus scoticus (Latham). - 1/4.

Orde GALLIFORMES. - Famille TETRAONIDÆ.

Bewoont de Britse Eilanden; voor de jacht in de Hoge Venen in België ingevoerd.

De hoogvlakten met veengrond en plantengroei van mos en heidekruid maken zijn woongebied uit. Nestelt in een putteke van de grond, met gras bekleed en verborgen door heidekruid of zegge; 6-12 geelwitte roodgeklepte eieren; één broedsel.

Eet vooral scheuten van heidekruid en kraakbeziën, gras en andere planten, zaden, bessen en insecten. Roepen: « kuk » of « keuk keuk », « ko ko ko-bak ko-bak », « bek bek bek », « jap jap jap », « gek gek », « err-ra », « worrow worrow ».

328. - *Lagopus scoticus scoticus* (Latham)



Schots Sneeuwhoen - Lagopède d'Ecosse
1. ♂ 2. ♀

N° 328 - LAGOPEDE D'ECOSSE

Lagopus scoticus scoticus (Latham).

- 1/4.

Orde GALLIFORMES.

Famille TETRAONIDÆ.

Habite les Iles Britanniques; introduit en Belgique pour la chasse dans les Hautes-Fagnes.

Les plaines de hautes altitude, à sol tourbeux et végétation de mousses et bruyères, constituent son habitat. Niche dans une dépression du sol garnie d'herbes et cachée par des bruyères ou des herbes scirpaccées; 6-12 œufs, blanc jaunâtre, tachetés de rougeâtre; une couvée.

Mange principalement des pousses de bruyères, de myrtilles, herbes et autres plantes, graines, baies, ainsi que des insectes. Cris: « kuk » ou « keük keük », « ko ko ko-bak ko-bak », « bec bec bec », « jap jap jap », « ghek ghek », « err-ra », « worrow worrow ».

329. - *Lyrurus tetrix tetrix* (Linné)



Korhoen - Tétrás lyre
1. ♂ 2. ♀

N° 329 - TETRAS LYRE

Lyrurus tetrix tetrix (Linné). - 1/5.

Ordre GALLIFORMES. - Famille TETRAONIDÆ.

Habite localement presque toutes les régions forestières, même montagneuses, de l'Europe et de l'ouest de l'Asie.

Se tient dans les forêts d'essences feuillues ou mélangées de conifères; également dans les taillis et bruyères avec arbres épars. Le nid est une cavité du sol garnie de quelques débris de plantes et de feuilles; 6-10 œufs, jaune pâle, tachetés; une couvée.

Oiseau sauvage et prudent; polygame. Au printemps, en des endroits convenables, les mâles, en présence des femelles, exécutent leurs manifestations amoureuses, consistant en poses diverses, étalage de plumes et ornements, danses et combats, le tout accompagné de cris, soupirs, soufflements, grognements et ronflements de la voix.

Se nourrit de pousses de conifères, boutons, feuilles et chatons de bouleaux et noisetiers, baies, fruits, graines, herbes et autre verdure, ainsi que d'insectes. Gibier recherché. Cris : « dak dak », « couck », « iook », « gaggag », « crocrocro »; parade nuptiale : « tour tour tour... », « tchouguisch » ou « tchouctchi »; jeunes : « diiub-djüb ».

N° 330 - HAZELHOEN

Tetrastes bonasia rhenana Kleinschmidt. - 1/4.

Ordre GALLIFORMES. - Famille TETRAONIDÆ.

Bewoont de Rijnlanden, Hoog-België en waarschijnlijk de streken die aan Frankrijk grenzen. Andere gewestelijke rassen bevinden zich in het Noorden en in het midden van Europa en in Azië.

Verblijft liefst in bossen met gemengde soorten bladboomen en dicht onderhout; vermijdt de grote wouden van kegeldragers. Het nest is een lichte uitholling van de grond onder een struik; 8-12 roomkleurige weinig gevlekte eieren; waarschijnlijk één broedsel.

Voedsel : knoppen en scheuten van struiken, alle soorten bessen en vruchten, zaden, beuknoten, kerfdieren en larven. Uitstekend wild. Is standvogel en monogaam. Roepen : « pllllorit », « pitpitpit », « wit wit wit widwidl wit wit wit », « koj koj koj »; mannetje in de paartijd : « tihitsitsitsi-tsuwi »; jong : « schi-schischi-schischi » of « ssie-ssissi-ssi-ssii ».

330. - *Tetrastes bonasia rhenana* Kleinschmidt



Hazelhoen - Gelinotte des bois
1. ♂ 2. ♀

N° 329 - KORHOEN

Lyrurus tetrix tetrix (Linné). - 1/5.

Ordre GALLIFORMES.

Famille TETRAONIDÆ.

Bewoont plaatselijk bijna al de beboste, zelfs bergachtige streken van Europa en het Westen van Azië.

Houdt zich op in de bossen van bladboomen of met kegelvruchten vermengd; ook in het hakhout en de heide met verspreide boomen. Het nest is een holte in de grond, bekleed met wat afval van planten en bladeren; 6-10 bleekgele gevlekte eieren; één broedsel.

Wilde en voorzichtige vogel; polygaam. In de lente voeren de mannetjes, in het bijzijn van de wijfjes, hun paarspelen uit, bestaande uit verschillende houdingen, het uitspreiden van hun vederen en versieringen, dansen en speelgevechten, alles vergezeld van geroep, zuchten, geblaas, geknor en geronk van de stem. Voedt zich met scheuten van naaldbomen, knoppen, bladeren en katjes van berken en notelaars, bessen, vruchten, zaden, gras en ander groen, evenals met kerfdieren. Gezocht wild. Roepen : « dak dak », « koek », « iook », « gag-gag », « krokrokrajo »; bij het paarpronken : « toer toer toer », « tjoegwisch » of « tjoetji »; jongen : « diiubdjüb ».

N° 330 - GELINOTTE DES BOIS

Tetrastes bonasia rhenana Kleinschmidt. - 1/4.

Ordre GALLIFORMES.

Famille TETRAONIDÆ.

Habite les régions rhénanes, la Haute-Belgique et probablement les contrées limitrophes de la France. D'autres races géographiques se trouvent au nord et au centre de l'Europe et en Asie.

Recherche les forêts de diverses essences feuillues mêlées, avec dense sous-bois; évite les grands massifs de conifères. Le nid est une légère excavation du sol sous un buisson; 8-12 œufs, de couleur crème, peu tachetés; probablement une couvée.

Nourriture : boutons et pousses de buissons, toutes espèces de baies et de fruits, graines, faines, insectes et larves. Gibier excellent. Est sédentaire et monogame. Cris : « pllllorit », « pitpitpit », « wit wit wit widwidl wit wit wit », « koj koj koj »; mâle à la parade : « tihi-tsihi-tsi-tsi-tsi-tsi »; jeune : « schi-schischi-schischi » ou « ssie-ssissi-ssi-ssii ».

331. - *Perdix perdix perdix* (Linné)



Grijze Patrijs - *Perdix grise*
1. ♂ 2. ♀

N° 331 - GRIJZE PATRIJS

Perdix perdix perdix (Linné). - 1/3.

Orde GALLIFORMES. - Familie PHASIANIDÆ.

Bewoont het grootste deel van Europa, buiten het uiterste Noorden. Vervangen door nabijstaande ondersoorten in zekere streken van het midden en het Zuiden van Europa en Azië.

Wordt gevonden op bijna alle gronden: bebouwde, onbebouwde, effen of golvende vlakten; vermijdt de grote wouden en de hoge bergen. Nest bestaande uit gras of andere planten in een holte van de grond, in de weiden, het graan, de klaver of een andere dichte plantengroei; 9-10 olijfbroine eieren; één broedsel.

Monogaam; gezellig, leeft in gezelschappen buiten de nesttijd. Eet alle soorten zaden van gekweekte of wilde planten, scheuten, gras, klaverbladeren en ander groen; houdt veel van kerfdieren. Door de jagers zeer gezocht wild. Roepen: « kirrek », « errepp », « koeroek », « koer-koerr » of « toerr toerr toerr »; zang: « kèèroewiet kèèroewiet » of « kèèr-wiek kèèr-wiek »; opstijgend: « ripripririprip ».

N° 331 - PERDRIX GRISE

Perdix perdix perdix (Linné). - 1/3.

Ordre GALLIFORMES. - Famille PHASIANIDÆ.

Habite la plus grande partie de l'Europe, sauf l'extrême nord. Remplacée par des sous-espèces voisines dans certaines contrées du centre et du sud de l'Europe et de l'Asie.

Se trouve dans presque tous les terrains: cultivés, incultes, plaines unies ou ondulées; évite les grands bois et les hautes montagnes. Nid composé de quelques herbes ou autres plantes dans un creux du sol, dans les prairies, blés, trèfles ou autre dense végétation; 9-10 œufs, brun olive; une couvée.

Monogame, sociable, vit en compagnies en dehors de la saison des nids. Mange toutes espèces de grains et graines de plantes cultivées ou sauvages, pousses, herbes, feuilles de trèfle et autre verdure; très friand d'insectes. Gibier favori des chasseurs. Cris: « kirreck », « errepp », « courouck », « cour-courr » ou « tourr tourr tourr »; chant: « cair-ouit cair-ouit » ou « guerr-wick guerr-wick »; se levant: « ripripririprip ».

N° 332 - KWAKKEL

Coturnix coturnix coturnix (Linné). - 1/2.

Orde GALLIFORMES. - Familie PHASIANIDÆ.

Bewoont Europa, het Noorden van Afrika en het Westen van Azië. Overwintert van het Zuiden van Europa tot in de keerringstreken van Afrika en in het Zuiden van Azië. Andere ondersoorten bevinden zich in Afrika en in Azië.

Was, vijftig jaar geleden, zeer gemeen in het midden en het Westen van Europa, werd daarna zeer zeldzaam; groeit tegenwoordig merkkelijk aan. Houdt zich in de vlakten, bij voorkeur op de bebouwde gronden, de weiden met lang gras, waar zij zeer verborgen leeft en zich meer al lopend dan al vliegend verplaatst. Het nest is een holte in de grond, gevoerd met enig gras en in het graan of andere dichte plantengroei verborgen; 7-12 bleekgele gevlekte eieren; één broedsel.

Polygaam. Is in het najaar een zeer smakelijk wild. Voedt zich vooral met graan en zaden, scheuten en bladeren van verscheidene planten, alsook met een opmerkelijke hoeveelheid kerfdieren. Roepen: « tii rek rek », « büliwi »; zang: « kwidkwidkwid »; jongen: « brub brub brub ».

N° 332 - CAILLE DES BLES

Coturnix coturnix coturnix (Linné).

- 1/2.

Ordre GALLIFORMES.

Famille PHASIANIDÆ.

Habite l'Europe, le nord de l'Afrique et l'ouest de l'Asie. Hiverne depuis le midi de l'Europe jusqu'en Afrique tropicale et dans le sud de l'Asie. D'autres sous-espèces se trouvent en Afrique et en Asie.

Il y a cinquante ans, était très commune dans le centre et l'ouest de l'Europe, ensuite est devenue très rare; actuellement est en augmentation sensible.

Se tient dans les plaines, de préférence dans les terres cultivées, les prairies à longues herbes, où elle vit très cachée et se déplace plus à pied qu'au vol. Le nid est un creux dans le sol, garni de quelques herbes et dissimulé dans les blés ou autre dense végétation; 7-12 œufs, jaunâtre pâle, tachetés; une couvée.

Polygame. A l'arrière-saison est un gibier très succulent. Se nourrit principalement de grains et graines, pousses et feuilles de différentes plantes, ainsi que d'insectes en quantité appréciable. Cris: « tii reck reck », « büliwi »; chant: « quidquidquid »; jeunes: « brüb brüb brüb ».

332. - *Coturnix coturnix coturnix* (Linné)



Kwakkel - Caille des blés
1. ♂ 2. ♀

333. - *Phasianus colchicus* Linné



Bosfazant - Faisan de chasse
1. ♂ 2. ♀

N° 333 - BOSFAZANT

Phasianus colchicus Linné. - 1/6.

Orde GALLIFORMES. - Familie PHASIANIDÆ.

Dit schoon wild is niet meer van zuiver ras, doch een mengeling bekomen door kruising van *Phasianus colchicus colchicus* en van *Phasianus colchicus semitorquatus*. Het vaderland van de eerste is de streek van Klein-Azië die aan de Zwarte Zee raakt; de tweede bewoont Mantsjoerije, in het Noord-Oosten van China. De eerste werd vóór de tweede ingevoerd. Bewoont de bossen, bij voorkeur met bouwland doorsneden. Nestelt onder een struik, in een holte van de grond bekleed met gras en bladeren; 8-14 olijfbuine eieren zonder vlekken; één broedsel. Dierlijk en plantaardig voedsel : kerfdieren, wormen, weekdieren, hagedissen, graan en zaden, jonge scheuten, bladeren en wortels van gras en andere planten, eikels, beukennoten en andere zaden, vruchten en bessen. Roepen : een hees « eurk eurk », « koch koch », « aa-gaks », « kloeng kloeng ».

N° 333 - FAISAN DE CHASSE

Phasianus colchicus Linné. - 1/6.

Ordre GALLIFORMES. - Familie PHASIANIDÆ.

Ce beau gibier n'est plus de race pure, mais un métis issu du croisement de *Phasianus colchicus colchicus* et de *Phasianus colchicus semitorquatus*. La patrie du premier est la région de l'Asie Mineure touchant à la mer Noire; le second habite la Mandchourie, au nord-est de la Chine. Le premier a été importé avant le second. Habite les bois, de préférence entrecoupés de champs cultivés. Niche sous quelque buisson, dans un creux du sol garni d'un peu de litière d'herbes et feuilles; 8-14 œufs, brun olive, sans taches; une couvée. Nourriture animale et végétale : insectes, vers, mollusques, lézards, grains et graines, jeunes pousses, feuilles et racines d'herbes et autres plantes, glands, faines et autres semences, fruits et baies. Cris : un rauque « eurk eurk », « koch koch », « aa-gacks », « kloung kloung ».

334. - *Locustella luscinioides luscinioides* (Savi)



Watersprinkhaanzanger - Locustelle luscinioides

N° 334 - WATERSPRINKHAANZANGER

Locustella luscinioides luscinioides (Savi). - 2/3.

Orde PASSERIFORMES. - Familie MUSCICAPIDÆ.

Woonst in heel Europa, behalve ten Noorden van de breedte van de Oostzee; wordt eveneens gevonden in Algerië en in Palestina. Overwintert in Afrika. Plaatselijk in België.

Leeft in de rietvelden boven het water der moerassen. Nest op een hoop riet, wel verborgen in de plantengroei, gebouwd met riet, bladeren en grasstengels, en gevoerd met droge bladeren; 4-6 heldere dicht gestipte eieren; twee broedsels.

Voedt zich met kerfdieren. Weinig wilde vogel, hoewel zeer verborgen levend. Lokroep : « pitt pitt », « tsinn »; zijn zang is zeer kenschetsend : een lang gesjirp in « orrrrr... » of in « urrrrr... », in de aard van de zang van de krekel, zonder onderbrekingen.

N° 334 - LOCUSTELLE LUSCINIOÏDE

Locustella luscinioides luscinioides (Savi). - 2/3.

Orde PASSERIFORMES. - Familie MUSCICAPIDÆ.

Habite toute l'Europe, sauf au nord de la latitude de la mer Baltique; se trouve également en Algérie et en Palestine. Hiverné en Afrique. Se rencontre localement en Belgique.

Vit dans les massifs de roseaux au-dessus de l'eau des marais. Nid sur un tas de roseaux, bien caché dans la végétation, construit avec des feuilles de roseau, tiges d'herbes et rembourré de feuilles sèches; 4-6 œufs, de couleur claire, fortement pointillés; deux nichées.

Se nourrit d'insectes. Oiseau pas très sauvage, quoique vivant très caché. Cri : « pitt pitt », « tsinn »; son chant est très caractéristique : une longue stridulation en « orrrrr... » ou en « urrrrr... », dans le genre du chant du criquet, sans interruptions.

335. - *Siphia parva parva* (Bechstein)



Kleine Vliegenvanger - Gobe-mouches nain
1. ♂ 2. ♀ 3. Jong - Jeune

N° 335 - KLEINE VLEGENVANGER

Siphia parva parva (Bechstein). - 1/2.

Orde PASSERIFORMES. - Familie MUSCICAPIDÆ.

Bewoont het midden van Europa vanaf het Zuiden van Zweden tot de Alpen en vanaf de Elbe in het Westen tot het Oosten van Rusland; eveneens de Caucasus en het Noorden van Iran. Overwintert in Hindoestan. Nabijstaande ondersoorten bewonen zekere streken van Azië. Zoekt de oude bossen op, vooral van beuken met onderhout. Nestelt bij voorkeur in een boomholte; nest van mos, met of zonder andere bouwstoffen, door spinnewebben verbonden, van binnen met haar; 5-6 blauw-groene eieren, roodachtig gestipt. Eet kerfdieren, meestal in de vlucht gevangen, doch ook van de bladeren opgepikt. Heldere en sterke stem; roepen: «tst», «tsrr», «trrt» of «terrt», «schrrr», «ptie'h-lip», «thiie»; zingt een weinig afgewisselde strofe doch met kristalheldere en aangename klank.

N° 335 - GOBE-MOUCHES NAIN

Siphia parva parva (Bechstein). - 1/2.

Ordre PASSERIFORMES. - Famille MUSCICAPIDÆ.

Habite le centre de l'Europe depuis le sud de la Suède jusqu'aux Alpes et depuis l'Elbe à l'ouest jusqu'à l'est de la Russie; également au Caucase et au nord de l'Iran. Hiverne dans l'Hindoustan. Des sous-espèces voisines occupent certaines régions de l'Asie. Recherche les vieux bois, principalement de hêtres avec sous-bois. Niche de préférence dans une cavité d'arbre; nid de mousse, avec ou sans autres matériaux, reliés par des toiles d'araignée, intérieur avec poils; 5-6 œufs, vert bleuâtre, pointillés de rougeâtre. Mange des insectes, principalement chassés au vol, mais aussi recueillis sur les feuilles. Voix claire et forte; cris: «tst», «tsrr», «trrt» ou «terrt», «schrrr», «ptie'h-lip», «thiie»; chante une strophe peu variée, mais à timbre cristallin et agréable.

336. - *Carduelis flammea hornemanni* (Holböhl)



Grote Barmsijs - Sizerin flammé de Hornemann
1. ♂ 2. ♀

N° 336 - GROTE BARMSIJS

Carduelis flammea hornemanni (Holböhl). - 3/5.

Orde PASSERIFORMES. - Familie FRINGILLIDÆ.

Bewoont de noordelijke streken van Groenland; trekt naar Zuid-Groenland en Canada. Bij uitzondering en in klein getal in Europa. Een enkel exemplaar werd in België waargenomen. Is groter en bleker dan de andere gewestelijke rassen van *Carduelis flammea*; heeft de stuit en de onderstaartvederen zonder strepen en de roze tinten zwakker. Nestelt in de struiken zoals de andere soorten, doch men vindt ook nesten in de rotsspleten. Voor het overige, gedraagt zich als de andere *Carduelis flammea* (n° 135).

N° 336 - SIZERIN FLAMME DE HORNEMANN

Carduelis flammea hornemanni (Holböhl). - 3/5.

Ordre PASSERIFORMES. - Famille FRINGILLIDÆ.

Habite les régions septentrionales du Groenland; émigre dans le Groenland méridional et au Canada. Exceptionnellement et en petit nombre en Europe. Un seul specimen a été constaté en Belgique. Est plus grand et plus pâle que les autres races géographiques de *Carduelis flammea*; il a le croupion et les sous-caudales sans stries et les teintes rosées plus faibles. Niche dans les buissons comme les autres espèces, mais on trouve aussi des nids dans les crevasses de rocher. Pour le reste, se comporte comme les autres *Carduelis flammea* (n° 135).

337. - *Sylvia hortensis hortensis* (Gmelin)



Orphea's Grasmus - Fauvette Orphée

1. ♂ 2. ♀

N° 337 - ORPHEA'S GRASMUS

Sylvia hortensis hortensis (Gmelin). - 3/5.

Orde PASSERIFORMES. - Familie MUSCICAPIDÆ.

Bewoont het Noord-Westen van Afrika en het Zuid-Westen van Europa, tot Zwitserland en Italië. Overwintert in de keerkringstreken van Afrika. Andere ondersoorten leven meer in het Oosten. Bezoekt zelden België. Houdt zich op in de bossen en tuinen met bomen en struiken beplant, waar zij haar nest bouwt uit gras, fijne wortels, katoen, haar; 4-5 eieren, met punten en vlekken gemerkt.

Voedt zich met kerfdieren en bessen. Roepen : « tak tak », « trrrr », « tjak-scherr », « truwie-ra ra ra »; zang : een sterk, afgewisseld en aangenaam gekweel, waar herhaaldelijk « tittiwoe » en « tjiwirroe » in voorkomen.

N° 337 - FAUVETTE ORPHEE

Sylvia hortensis hortensis (Gmelin). - 3/5.

Ordre PASSERIFORMES. - Famille MUSCICAPIDÆ.

Habite le nord-ouest de l'Afrique et le sud-ouest de l'Europe, jusqu'à la Suisse et l'Italie. Hiverne en Afrique tropicale. D'autres sous-espèces vivent plus à l'est. Visite rarement la Belgique.

Se tient dans les bois et jardins plantés d'arbres et de buissons, où il construit son nid d'herbes, fines racines, coton, crins; 4-5 œufs, marqués de points et de taches.

Se nourrit d'insectes et de baies. Cris : « tac tac », « trrrr », « tchac-scherr », « trui-ra ra ra »; chant : un gazouillement fort, varié et agréable, ou reviennent fréquemment « tittiwoe » et « tchiwirroe ».

338. - *Emberiza stewarti* Blyth



Grijskapgors - Bruant à calotte grise

1. ♂ 2. ♀

N° 338 - GRIJSKAPGORS

Emberiza stewarti Blyth. - 4/7.

Orde PASSERIFORMES. - Familie FRINGILLIDÆ.

Wordt gevonden in het westelijk midden van Azië, Turkestan, Iran, Afghanistan; overwintert in de vlakte van West-Hindoestan. Verdwaalt zeer zelden in Europa.

Bewoont de heuvels, de valleien en de berghellingen, in de bebouwde velden, de grazige gronden met laag kreupelhout, waar hij zijn nest bouwt met gras en worteltjes; 3-4 gevlekte en gestreepte eieren; één, dikwijls twee broedsels.

Eet graszaden en kerfdieren. Zijn roep gelijkt op die van de Geelgors (n° 152); de zang van een te Herve gevangen gehouden exemplaar was zacht, fluitachtig en gebonden in een vrij lang gekweel.

N° 338 - BRUANT A CALOTTE GRISE

Emberiza stewarti Blyth. - 4/7.

Ordre PASSERIFORMES. - Famille FRINGILLIDÆ.

Se trouve dans le centre-ouest de l'Asie, le Turkestan, l'Iran, l'Afghanistan; hiverne dans la plaine de l'Hindoustan occidental. S'égare très rarement en Europe.

Habite les collines, les vallées et les flancs des montagnes, dans les champs cultivés, les terrains herbeux à broussailles basses, où il construit son nid d'herbes et de minces racines; 3-4 œufs, tachetés et lignés; une, souvent deux nichées.

Mange des graines de graminées et des insectes. Cri ressemblant à celui du Bruant jaune (n° 152); le chant du sujet tenu en captivité à Herve était flûté et lié en un gazouillement assez long.

339. - *Pterocles orientalis orientalis* (Linné)



Zwartbuikzandhoen - Ganga unibande

1. ♂ 2. ♀

N° 339 - ZWARTBUIKZANDHOEN

Pterocles orientalis orientalis (Linné).
- 2/7.

Orde COLUMBIFORMES.

Familie PTEROCLIDÆ.

Bewoont het Iberisch schiereiland, het Noorden van Afrika en het Zuid-Westen van Azië. De meest noordelijke bewoners overwinteren meer naar het Zuiden, namelijk in het Noord-Westen van Hindoestan. Eenmaal in België waargenomen.

Zoekt de half woestijnachtige streken en de grazige steppen op. Nestelt in een eenvoudig putteke in de grond; 3 gevlekte eieren; één broedsel.

Voedt zich met zaden van grasgewassen en andere wilde planten, en voegt er ook jonge scheuten en weke delen van planten bij. Moet soms grote afstanden afleggen om 's morgens en 's avonds drinkwater te vinden. Loopt vlug, vliegt snel. Vergadert, na de nesteltijd, in kleine benden. Zijn stem klinkt « jürr jürr » en « katarr katarr ».

N° 339 - GANGA UNIBANDE

Pterocles orientalis orientalis (Linné). - 2/7.

Ordre COLUMBIFORMES. - Famille PTEROCLIDÆ.

Habite la péninsule Ibérique, le nord de l'Afrique et le sud-ouest de l'Asie. Les habitants les plus septentrionaux hivernent plus au sud, notamment dans le nord-ouest de l'Hindoustan. Observé une fois en Belgique.

Recherche les endroits semi-désertiques, steppes herbeuses. Niche dans une simple dépression du sol; 3 œufs, tachetés; une nichée.

Se nourrit de graines de graminées et autres plantes sauvages, y joint aussi de jeunes pousses et des parties tendres de végétaux. Doit parfois se rendre à de grandes distances pour trouver de l'eau à boire le matin et le soir. Court bien, vole rapidement. Après la saison de nidification, se réunit en petites bandes. Sa voix est exprimée par « jürr jürr » et « katarr katarr ».

N° 340 - SNEEUWGANS

Anser hyperboreus Pallas of *Anser caerulescens* (Linné). - 1/8

Orde ANSERIFORMES. - Famille ANATIDÆ.

Nestelt vanaf het Oosten van noordelijk Siberië, doorheen gans de noordpoolstreek van Amerika. Een groter ras bevindt zich in het Noord-Oosten van Canada en in het Noorden van Groenland. Overwintert op de oostelijke kusten van Azië, in Japan en in het Zuiden en het Zuid-Oosten van de Verenigde Staten. Komt zelden in Europa, bij uitzondering in België.

Vertoont zich in twee kledijen: een witte en een blauwachtige. Vele vogelkundigen beschouwen ze als onderscheiden soorten. In België werden alleen witte Sneeuwganzen waargenomen.

Nestelt in de toendra; nest gemaakt van gras, mos en dons; 5-6 witte of roomkleurige eieren; één broedsel.

Voedt zich in de zomer met gras en andere planten, evenals met bessen; zoekt op de overwinteringsplaatsen vooral de wortels van een soort moeraszegge op, alsook gras, jonge graanscheuten, enz. Haar schreeuw gelijkt op « ka, gan, kir, kr » en « kak whak, kak whak ».

Neemt, evenals de andere soorten Ganzen, een voorname plaats in in de voedselvoorziening van de bewoners der poolstreken.

N° 340 - OIE DES NEIGES

Anser hyperboreus Pallas ou *Anser caerulescens* (Linné). - 1/8.

Ordre ANSERIFORMES. - Famille ANATIDÆ.

Niche depuis l'est de la Sibérie arctique, par toute l'Amérique arctique. Une race plus forte se trouve dans le nord-est du Canada et le nord du Groenland. Hivernent sur les côtes est de l'Asie, au Japon et dans le sud et le sud-est des Etats-Unis. Se montre rarement en Europe, exceptionnellement en Belgique.

Se présente sous deux livrées: une blanche et une bleuâtre. Beaucoup d'ornithologues les considèrent comme espèces distinctes. Des Oies blanches seules ont été observées en Belgique.

Niche dans la toundra; nid formé d'herbes, mousse et duvet; 5-6 œufs, blancs ou crème pâle; une couvée.

En été se nourrit d'herbes et d'autres plantes, de baies; aux lieux d'hivernage recherche surtout les racines d'une laiche des marais, puis des herbes, jeunes pousses de céréales, etc. Son cri ressemble à « ka, gang, kir, kr » et « kak whak, kak whak ».

Toutes les espèces d'Oies constituent une importante ressource alimentaire pour les habitants des régions arctiques.

340. - *Anser hyperboreus* Pallas



Sneeuwganzen - Oie des neiges

1. Volwassen - Adulte - 2. Jong - Jeune

341. - *Larus ichthyæetus* Pallas



Arendmeeuw - Goëland à tête noire
1. Paarkleed - Nuptial - 2. Voorkleed - Prénuptial

N° 341 - ARENDMEEUW

Larus ichthyæetus Pallas. - 1/7.

Orde LARIFORMES.

Familie LARIDÆ.

Nestelt in het Zuid-Oosten van Rusland, bij de Kaspische Zee, de Aral-zee en de binnenmeren der steppen van het Westen van Azië. Overwintert in de Rode Zee en op de kusten van het Zuid-Westen van Azië tot Indië. Zeldzaam in de Middellandse Zee, bij toeval in het Westen van Europa.

Nestelt in koloniën in het riet dat de grote stromen omboordt, evenals in het zand en het grint der oevers van de binnenzeeën en de grote meren. Een indieping van de grond ontvangt 2-3 bleek-rosse gevlekte eieren; één broedsel.

Voedt zich bijna uitsluitend met vis; schaaldieren en kruipdieren worden ook vermeld. De schreeuw is een sterk en hees gekras.

N° 341 - GOËLAND A TÊTE NOIRE

Larus ichthyæetus Pallas. - 1/7.

Ordre LARIFORMES. - Famille LARIDÆ.

Niche dans le sud-est de la Russie, près de la mer Caspienne, la mer d'Aral et les lacs intérieurs des steppes de l'ouest de l'Asie. Hiverné dans la mer Rouge et sur les côtes du sud-ouest de l'Asie jusqu'aux Indes. Rare dans la Méditerranée, accidentel dans l'ouest de l'Europe.

Niche en colonies dans les roseaux qui bordent les grands fleuves, ainsi que dans le sable et le gravier des rives des mers intérieures et des grands lacs. Une dépression du sol reçoit 2-3 œufs, roussâtre pâle, tachetés; une couvée.

Se nourrit presque exclusivement de poisson; des crustacés et des reptiles sont aussi mentionnés. Le cri est un croassement fort et rauque.

342. - *Carduelis carduelis* (Linné)
× *Chloris chloris chloris* (Linné)



Distelvink × Groenvink
Chardonneret élégant × Verdier d'Europe

N° 342 - DISTELVINK × GROENVINK

Carduelis carduelis (Linné) × *Chloris chloris chloris* (Linné). - 5/6.

Orde PASSERIFORMES. - Famille FRINGILLIDÆ.

Hybride van een mannelijke Groenvink (n° 134) en een wijfje van de Distelvink (n° 131).

N° 342 - CHARDONNERET ELEGANT × VERDIER D'EUROPE

Carduelis carduelis (Linné) × *Chloris chloris chloris* (Linné). - 5/6.

Ordre PASSERIFORMES. - Famille FRINGILLIDÆ.

Hybride d'un Verdier d'Europe (n°134) mâle et d'une femelle de Chardonneret élégant (n° 131).

343. - *Chloris chloris chloris* (Linné)
 × *Carduelis carduelis* (Linné)



Groenvink × Distelvink
 Verdier d'Europe × Chardonneret élégant

N° 343 - GROENVINK × DISTELVINK

Chloris chloris chloris (Linné) × *Carduelis carduelis* (Linné). - 2/3.

Orde PASSERIFORMES. - Famille FRINGILLIDÆ.

Hybride van een vrouwelijke Groenvink (n° 134) en een mannelijke Distelvink (n° 131). Deze, zoals de andere hybriden, is niet vruchtbaar.

N° 343 - VERDIER D'EUROPE × CHARDONNERET ELEGANT

Chloris chloris chloris (Linné) × *Carduelis carduelis* (Linné). - 2/3.

Orde PASSERIFORMES. - Famille FRINGILLIDÆ.

Hybride artificiel d'une femelle du Verdier d'Europe (n° 134) et d'un mâle du Chardonneret élégant (n° 131). Les hybrides ne sont pas féconds.

344. - *Carduelis cannabina cannabina* (Linné)
 × *Carduelis carduelis* (Linné)



Kneuter × Distelvink
 Linotte mélodieuse × Chardonneret élégant

N° 344 - KNEUTER × DISTELVINK

Carduelis cannabina cannabina (Linné) × *Carduelis carduelis* (Linné).
 - 5/7.

Orde PASSERIFORMES. - Famille FRINGILLIDÆ.

Kruisingsprodukt van de Kneuter (n° 133) en de Distelvink (n° 131), twee aanverwante soorten. Deze vogel komt niet in de natuur voor en plant zich ook niet voort.

N° 344 - LINOTTE MELODIEUSE × CHARDONNERET ELEGANT

Carduelis cannabina cannabina (Linné) × *Carduelis carduelis* (Linné).
 - 5/7.

Orde PASSERIFORMES. - Famille FRINGILLIDÆ.

Produit de croisement de la Linotte mélodieuse (n° 133) et du Chardonneret élégant (n° 131). Produit de croisement de deux espèces voisines. Cet oiseau ne se rencontre pas dans la nature et ne se reproduit pas.

345. - *Carduelis carduelis* (Linné)
 × *Pyrrhula pyrrhula europæa* Vieillot



Distelvink × Goudvink
Chardonneret élégant × Bouvreuil pivoine
 1. ♂ 2. ♀

N° 345 - DISTELVINK × GOUDVINK

Carduelis carduelis (Linné) × *Pyrrhula pyrrhula europea* (Vieillot). - 4/7.

Orde PASSERIFORMES. - Famille FRINGILLIDÆ.

Kleurrijke hybride van de Distelvink (n° 131) en de Goudvink (n° 137).
 Komt niet in de natuur voor : kooivogel.

N° 345 - CHARDONNERET ELEGANT × BOUVREUIL PIVOINE

Carduelis carduelis (Linné) × *Pyrrhula pyrrhula europea* (Vieillot). - 4/7.

Ordre PASSERIFORMES. - Famille FRINGILLIDÆ.

Hybride haut en couleurs du Chardonneret élégant (n° 131) et du Bouvreuil pivoine (n° 137). Ne se rencontre pas à l'état sauvage; oiseau de cage et de volière.

346. - *Carduelis carduelis* (Linné)
 × *Serinus canarius domesticus*



Distelvink × Kanarievogel
Chardonneret élégant × Serin domestique
 1. ♂ 2. ♀

N° 346 - DISTELVINK × KANARIEVOGEL

Carduelis carduelis (Linné) × *Serinus canarius domesticus*. - 3/5.

Orde PASSERIFORMES. - Famille FRINGILLIDÆ.

Hybride van de Distelvink (n° 131) en de Kanarie. Kooivogel.

N° 346 - CHARDONNERET ELEGANT × SERIN DOMESTIQUE

Carduelis carduelis (Linné) × *Serinus canarius domesticus*. - 3/5.

Ordre PASSERIFORMES. - Famille FRINGILLIDÆ.

Produit de croisement du Chardonneret élégant (n° 131) et du Serin domestique. Oiseau de cage.

347. - *Carduelis spinus* (Linné)
 × *Serinus canarius domesticus*



Elssijs × Kanarievogel
 Tarin des aulnes × Serin domestique
 1. ♂ Volwassen - Adulte - 2. Jong - Jeune

N° 347 - ELSSIJS × KANARIEVOGEL

Carduelis spinus (Linné) × *Serinus canarius domesticus*. - 2/3.

Orde PASSERIFORMES. - Familie FRINGILLIDÆ.

Hybride van de Elssijs (n° 132) en de Kanarievogel. Kooivogel.

N° 347 - TARIN DES AULNES × SERIN DOMESTIQUE

Carduelis spinus (Linné) × *Serinus canarius domesticus*. - 2/3.

Orde PASSERIFORMES. - Familie FRINGILLIDÆ.

Hybride du Tarin des aulnes (n° 132) et du Serin domestique. Oiseau de cage.

348. - *Carduelis cannabina cannabina* (Linné)
 × *Serinus canarius domesticus*



Kneuter × Kanarievogel
 Linotte mélodieuse × Serin domestique
 1. ♂ 2. ♀

N° 348 - KNEUTER × KANARIEVOGEL

Carduelis cannabina cannabina (Linné) × *Serinus canarius domesticus*.
 - 2/3.

Orde PASSERIFORMES. - Familie FRINGILLIDÆ.

Hybride van de Kneuter (n° 133) en de Kanarievogel. Flinke zanger, kooivogel.

N° 348 - LINOTTE MELODIEUSE × SERIN DOMESTIQUE

Carduelis cannabina cannabina (Linné) × *Serinus canarius domesticus*.
 - 2/3.

Orde PASSERIFORMES. - Familie FRINGILLIDÆ.

Hybride de la Linotte mélodieuse (n° 133) et du Serin domestique. Bon chanteur, oiseau de cage.

349. - *Fringilla cælebs cælebs* Linné
 × *Fringilla montifringilla* Linné



Botvink × Noordvink
 Pinson chanteur × Pinson du nord

N° 349 - BOTVINK × NOORDVINK

Fringilla cælebs cælebs Linné × *Fringilla montifringilla* Linné. - 3/5.

Orde PASSERIFORMES. - Famille FRINGILLIDÆ.

Kruisingsprodukt van vinkensoorten : de Botvink (n° 139) en de Noordvink (n° 140).

N° 349 - PINSON CHANTEUR × PINSON DU NORD

Fringilla cælebs cælebs Linné × *Fringilla montifringilla* Linné. - 3/5.

Orde PASSERIFORMES. - Famille FRINGILLIDÆ.

Métis de deux espèces voisines : le Pinson chanteur (n° 139) et le Pinson du nord (n° 140).

350. - *Passer montanus montanus* (Linné)
 × *Passer domesticus domesticus* (Linné)



Boommus × Huismus
 Moineau friquet × Moineau domestique

N° 350 - BOOMMUS × HUISMUS

Passer montanus montanus (Linné) × *Passer domesticus domesticus* (Linné). - 4/7.

Orde PASSERIFORMES. - Famille FRINGILLIDÆ.

Kruisingsprodukt van onze inheemse mussen : de Boommus (n° 150) en de Huismus (n° 149).

N° 350 - MOINEAN FRIQUET × MOINEAU DOMESTIQUE

Passer montanus montanus (Linné) × *Passer domesticus domesticus* (Linné). - 4/7.

Orde PASSERIFORMES. - Famille FRINGILLIDÆ.

Métis de nos deux espèces indigènes de moineaux : le Moineau friquet (n° 150) et le Moineau domestique (n° 149).

ALFABETISCHE LIJST VAN DE NAMEN DER VOGELS

N^{rs} 1 tot 176 : Deel I - N^{rs} 177 tot 350 : Deel II

N°	A	N°		N°		N°	
312	Alk	131	Distelvink	8	Grijze Kwikstaart	254	Kleine Stormvogel
190	Alpenhaagmus	342	Distelvink × Groenvink	331	Grijze Patrijs	280	Kleine Strandloper
141	Appelvink	345	Distelvink × Goudvink	56	Groene Specht	318	Kleine Trap
51	Ardense blauwe Haagmus	346	Distelvink × Kanarievogel	290	Groenpostruiter	335	Kleine Vliegenvanger
341	Arendmeeuw	307	Dove Snip	134	Groenvink	213	Kleine Zilverreiger
65	Arenduil	86	Dougall's Zeezwaluw	343	Groenvink × Distelvink	99	Kleine Zwaan
319	Aziatische Kraagtrap	62	Draaihals	251	Grote Aalscholver	324	Klein Porseleinhoen
		97	Drieteenmeeuw	336	Grote Barmstijns	323	Kleinste Porseleinhoen
		285	Drieteenstrandloper	58	Grote bonte Specht	297	Kluut
21	Baardmees	2	Duinpieper	7	Grote gele Kwikstaart	133	Kneuter
231	Balktaling	302	Dunbekwulp	174	Grote grijze Klauwier	344	Kneuter × Distelvink
122	Bastaardarend	207	Dunsnavelige Notenkraaker	181	Grote Lijster	348	Kneuter × Kanarievogel
228	Bergeend	221	Dwerggans	89	Grote Mantelmeeuw	100	Knobbelswaan
172	Bergleeuwierik	161	Dwerggors	308	Grote Meeuwjager	63	Koekoek
194	Bicënsnapper	95	Dwergmeeuw	1	Grote Pieper	96	Kokmeeuw
110	Blauwe Kuikendief	66	Dwerguil	29	Grote Rietzanger	220	Kolgans
210	Blauwe Reiger	87	Dwergzeezwaluw	317	Grote Trap	12	Koolmees
192	Blauwe Rotsmerel			301	Grote Wulp	183	Koperwieklijster
229	Blokeend		E	248	Grote Zaagbek	329	Korhoen
50	Boerenwaluw	247	Eidereend	83	Grote Zeezwaluw	10	Kortklauw- boomkruiper
124	Bonelli's Arend	208	Eikelgaai	212	Grote Zilverreiger	168	Kortteenleeuwierik
202	Bonte Kraai	132	Elssijs	299	Grutto	188	Kraagmerel
279	Bonte Strandloper	347	Elssijs × Kanarievogel		H	320	Kraanvogel
23	Bonte Vliegenvanger			154	Haaggors	233	Krakeend
11	Boomklever		F	113	Havik	278	Krombekstrandloper
170	Boomleeuwierik	27	Fluitende Boszanger	330	Hazelhoen	237	Krooneend
150	Boommus		G	98	Hoelzwaan	252	Kuifaalscholwer
350	Boommus × Huisms	206	Gallische Ekster	198	Holduif	240	Kuifeend
3	Boompieper	74	Geelborstkerkuil	260	Hoornfuut	258	Kuiffuut
102	Boomvalk	152	Geelgors	67	Hoornuil	169	Kuifleeuwierik
333	Bosfazant	54	Geitenmelker	55	Hop	15	Kuifmees
159	Bosgors	42	Gekraagde Roodstaart	304	Houtsnip	332	Kwakkel
31	Bosrietzanger	6	Gele Kwikstaart	149	Huisms		L
292	Bosruiter	26	Gewone Boszanger	48	Huiszwaluw	81	Lachzeezwaluw
73	Bosuif	37	Gewone Grasmus		I	9	Langklauw- boomkruiper
139	Botvink	19	Gewoon Goudhaantje	263	IJsduiker	311	Langstaart- meeuwjager
349	Botvink × Noordvink	53	Gierzwaluw	163	IJsgors	77	Lepelaar
38	Braamsluiper- grasmus	16	Glanskopmees	196	IJsvogel		M
225	Brandgans	178	Goudlijster		K	146	Mastenkruijsbek
286	Breedbekstrandloper	274	Goudplevier	165	Kalanderleeuwierik	17	Matkopmees
242	Brileend	137	Goudvink	282	Kanoetstrandloper	327	Meerkoet
245	Brilzeeënd	4	Graspieler	205	Kauw	60	Middelste bonte Specht
25	Bruine Boszanger	325	Grasral	276	Kievit	309	Middelste Meeuwjager
209	Bruine Ibis	295	Grauwe Franjepoot	313	Kleine Alk	249	Middelste Zaagbek
109	Bruine Kuikendief	219	Grauwe Gans	136	Kleine Barmstijns	138	Middeneuropese Kanarie
244	Bruine Zeeënd	151	Grauwe Gors	59	Kleine bonte Specht	32	Moerasrietzanger
155	Bruinkeelgors	176	Grauwe Klauwier	94	Kleine Burgemeester- meeuw	273	Morinelplevier
40	Bruinkeeltapuit	111	Grauwe Kuikendief	262	Kleine Fuut	71	Musuif
105	Buizerd	80	Grauwe Moeraszwaluw	173	Kleine grijze Klauwier		N
93	Burgemeestermeeuw	22	Grauwe Vliegenvanger	91	Kleine Mantelmeeuw	44	Nachtegal
	C	57	Grauwkopspecht	310	Kleine Meeuwjager	215	Nachtreiger
143	Citroensijs	267	Griel	271	Kleine Plevier	227	Nijlgans
	D	299	Griet	223	Kleine Rietgans	250	Nonnetjezaagbek
145	Dennenkruijsbek	338	Grijskapgors	30	Kleine Rietzanger		
207	Diksnavelige Notenkraaker	158	Grijze Gors	216	Kleine Roerdomp		

N°	N°	N°	N°
182 Noordelijke Zanglijster	114 Roodbruine Wouw	70 Steenuil	58 Westerse grote bonte Specht
314 Noordelijke Zeekoet	259 Roodhalsfuut	296 Steltkluut	284 Westerse Kempphaan
135 Noordse Barmsijs	226 Roodhalsgans	266 Steppenhoen	47 Westerse Roodborst
256 Noordse Pijlstormvogel	265 Roodkeelduiker	118 Steppenkuikendief	14 Westerse zwarte Mees
300 Noordse Scholekster	175 Roodkopklauwier	92 Stormmeeuw	130 Wielewaal
257 Noordse Stormvogel	144 Roodmus	272 Strandplevier	160 Wilggors
85 Noordse Zeezwaluw	288 Roodpootruiter	184 Swainson's Dwerglijster	49 Winterkoning
140 Noordvink	117 Roodpootvalk		92 Wintermeeuw
116 Noorweegse Giervalk	45 Roodsterblauwborst		230 Wintertaling
	294 Rosse Franjepoot		147 Witbandkruisbek
	157 Rosse Gors		291 Witgatruiter
	298 Rosse Griet	238 Tafeleend	52 Withalsvliegenvanger
	298 Rosse Grutto	39 Tapuit	153 Witkapgors
	186 Rosvleugellijster	281 Temminck's Strandloper	239 Witoogeend
	224 Rotgans	69 Tengmalm's Uil	46 Witterblauwborst
293 Oeverloper	197 Rotsduif	180 Tjaklijster	116 Witte Giervalk
24 Oeverzwaluw	191 Rotsmerel	241 Toppereend	79 Witvleugelmoeraszwaluw
75 Ooievaar	148 Rotsmus	104 Torenvalk	199 Woudduif
337 Orphea's Grasmus	129 Roze Spreeuw	200 Tortelduif	
156 Ortolaangors	218 Roze Steltzwaan	35 Tuingrasmus	
	107 Ruigpootbuiserd		
P	S	V	Z
283 Paarse Strandloper	88 Sabine's Vorkstaartmeeuw	127 Vale Gier	125 Zeearend
316 Papegaaiduiker	195 Scharrelaar	185 Vale Lijster	253 Zeezot
264 Parelduiker	328 Schots Sneeuwhoen	171 Veldleeuwrik	90 Silvermeeuw
177 Pestvogel	123 Schreeuwarend	68 Velduil	275 Zilverplevier
235 Pijlstaarteend	166 Siberische Leeuwrik	115 Visarend	232 Zomertaling
13 Pimpelmees	179 Siberische Lijster	84 Visdiefzeezwaluw	119 Zwartbruine Wouw
289 Poelruiter	126 Slangenarend	269 Vorkstaartplevier	339 Zwartbuikzandhoen
306 Poelsnip	101 Slechtvalk	255 Vorkstaartstormvogel	203 Zwarte Kraai
322 Porseleinhoen	236 Slobbeend	20 Vuurgoudhaantje	167 Zwarte Leeuwrik
211 Purperreiger	103 Smellekenvalk		189 Zwarte Merel
	234 Smieëend		78 Zwarte Moeraszwaluw
	340 Sneeuwvangs		76 Zwarte Ooievaar
201 Raaf	164 Sneeuwgorse	326 Waterhoen	43 Zwarte Roodstaart
214 Ralreiger	64 Sneeuwuil	5 Waterpieper	287 Zwarte Ruiter
67 Ransuil	112 Sperwer	321 Waterral	61 Zwarte Specht
303 Regenwulp	72 Sperweruil	33 Waterrietzanger	246 Zwarte Zeeëend
268 Renvogel	34 Spotvogel	305 Watersnip	315 Zwarte Zeekoet
82 Reuzenzeezwaluw	128 Spreeuw	193 Waterspreeuw	261 Zwarthalsfuut
222 Rietgans	28 Sprinkhaanzanger	334 Watersprinkhaanzanger	187 Zwartkeellijster
162 Rietgors	18 Staartmees	108 Wespenbuiserd	41 Zwartkeeltapuit
74 Rijnse Kerkuil	121 Steenarend	182 Westelijke Zanglijster	36 Zwartkopgrasmus
204 Roek	142 Steenkneuter	270 Westerse Bontbekplevier	120 Zwartvleugelmouw
217 Roerdomp	277 Steenloper		

LISTE ALPHABÉTIQUE DES NOMS DES OISEAUX

N^{os} 1 à 176 : Tome I - N^{os} 177 à 350 : Tome II

No

A

- 190 Accenteur alpin
51 Accenteur mouchet
d'Ardenne
122 Aigle criard
123 Aigle pomarin
124 Aigle à queue barrée
121 Aigle royal
213 Aigrette garzette
166 Alouette à ailes
blanches
165 Alouette calandre
168 Alouette calandrelle
171 Alouette des champs
169 Alouette cochevis
170 Alouette lulu
167 Alouette nègre
172 Alouette oreillard
113 Autour des palombes
297 Avocette à manteau
noir

B

- | | |
|-----|--------------------------|
| 115 | Balbuzard fluviatile |
| 299 | Barge à queue noire |
| 298 | Barge rousse |
| 304 | Bécasse des bois |
| 278 | Bécasseau cocorli |
| 286 | Bécasseau falcinelle |
| 282 | Bécasseau maubèche |
| 280 | Bécasseau minute |
| 285 | Bécasseau sanderling |
| 281 | Bécasseau de Temminck |
| 279 | Bécasseau variable |
| 283 | Bécasseau violet |
| 306 | Bécassine double |
| 305 | Bécassine des marais |
| 307 | Bécassine sourde |
| 147 | Bec-croisé bifascié |
| 146 | Bec-croisé perroquet |
| 145 | Bec-croisé des sapins |
| 226 | Bernache à cou roux |
| 224 | Bernache cravant |
| 225 | Bernache nonnette |
| 108 | Bondrée apivore |
| 137 | Bouvreuil pivoine |
| 160 | Bruant auréole |
| 153 | Bruant à calotte blanche |
| 338 | Bruant à calotte grise |
| 158 | Bruant fou |
| 155 | Bruant à gorge brune |
| 125 | Bruant jaune |
| 163 | Bruant lapon |
| 161 | Bruant nain |
| 164 | Bruant des neiges |
| 156 | Bruant ortolan |
| 151 | Bruant proyer |
| 162 | Bruant des roseaux |
| 157 | Bruant roux |
| 159 | Bruant rustique |
| 154 | Bruant zizi |

No

- 111 Busard cendré
118 Busard pâle
109 Busard des roseaux
110 Busard Saint-Martin
107 Buse pattue
105 Buse variable
216 Butor blongios
217 Butor étoilé

C

- | | |
|-----|--|
| 332 | Caille des blés |
| 233 | Canard chipeau |
| 229 | Canard col-vert |
| 235 | Canard pilet |
| 234 | Canard siffleur |
| 236 | Canard souchet |
| 144 | Carpodaque cramoiisi |
| 207 | Casse-noix moucheté d'Europe |
| 207 | Casse-noix moucheté de Sibérie |
| 131 | Chardonneret élégant |
| 345 | Chardonneret élégant × Bouvreuil pivoine |
| 346 | Chardonneret élégant × Serin domestique |
| 342 | Chardonneret élégant × Verdier d'Europe |
| 287 | Chevalier arlequin |
| 284 | Chevalier combattant occidental |
| 291 | Chevalier cul-blanc |
| 288 | Chevalier gambette |
| 293 | Chevalier guignette |
| 290 | Chevalier à pattes vertes |
| 289 | Chevalier stagnatille |
| 292 | Chevalier sylvain |
| 205 | Choucas des tours |
| 70 | Chouette chevêche |
| 71 | Chouette chevêchette |
| 72 | Chouette épervière |
| 73 | Chouette hulotte |
| 69 | Chouette de Tengmalm |
| 75 | Cigogne blanche |
| 76 | Cigogne noire |
| 193 | Cincle plongeur |
| 126 | Circaète Jean-le-blanc |
| 203 | Corbeau corneille |
| 204 | Corbeau freux |
| 202 | Corbeau mantelé |
| 252 | Cormoran huppé |
| 63 | Coucou gris |
| 302 | Courlis à bec grêle |
| 303 | Courlis corlieu |
| 268 | Courvite gaulois |
| 99 | Cygne de Bewick |
| 98 | Cygne chanteur |
| 100 | Cygne muet |

E

- 296 Echasse blanche
74 Effraie des clochers
à poitrine jaune

№

- 74 Effraie des clochers
du Rhin
247 Eider à duvet
120 Elanion blanc
54 Engoulevent d'Eu-
rope
112 Epervier d'Europe
128 Etourneau sansonnet

F

- 333 Faisan de chasse
104 Faucon cresserelle
103 Faucon émerillon
102 Faucon hobereau
117 Faucon à pattes rouges
101 Faucon pèlerin
38 Fauvette babillarde
37 Fauvette grisette
35 Fauvette des jardins
337 Fauvette Orphée
36 Fauvette à tête noire
218 Flamant rose
253 Fou de Bassan
327 Foulque macroule
238 Fuligule milouin
241 Fuligule milouinan
240 Fuligule morillon
239 Fuligule nyroca

G

- | | |
|-----|-------------------------------|
| 339 | Ganga unibande |
| 242 | Garrot à œil d'or |
| 208 | Geai des chênes |
| 330 | Gélinotte des bois |
| 116 | Gerfaut blanc |
| 116 | Gerfaut de Norvège |
| 269 | Glaréole à collier |
| 52 | Gobe-mouches à collier |
| 22 | Gobe-mouches gris |
| 335 | Gobes-mouches nain |
| 23 | Gobes-mouches noir |
| 94 | Goéland à ailes blanches |
| 90 | Goéland argenté |
| 93 | Goéland bourgmestre |
| 91 | Goéland brun |
| 92 | Goéland cendré |
| 89 | Goéland marin |
| 341 | Goéland à tête noire |
| 46 | Gorge-bleue à miroir blanc |
| 45 | Gorge-bleue à miroir roux |
| 201 | Grand corbeau |
| 251 | Grand Cormoran |
| 301 | Grand Courlis |
| 212 | Grande Aigrette |
| 308 | Grand Labbe |
| 272 | Gravelot à collier interrompu |
| 270 | Gravelot à collier occidental |
| 262 | Grèbe castagneux |
| 261 | Grèbe à cou noir |

No

- 260 Grèbe esclavon
258 Grèbe huppé
259 Grèbe à joues grises
10 Grimpereau brachydactyle
9 Grimpereau familial
186 Grive à ailes rousses
178 Grive dorée
181 Grive draine
187 Grive à gorge noire
180 Grive litorne
183 Grive mauvis
182 Grive musicienne du nord
182 Grive musicienne occidentale
185 Grive pâle
179 Grive sibérienne
141 Gros-bec casse-noyaux
320 Grue cendrée
194 Guêpier méridional
79 Guifette à ailes blanches
80 Guifette à moustaches
78 Guifette noire
315 Guillemot à miroir
314 Guillemot de Troïl du nord

H

- 243 Harelde de miquelon
64 Harfang des neiges
248 Harle bièvre
249 Harle huppé
250 Harle piette
215 Héron bihoreau
210 Héron cendré
214 Héron crabier
211 Héron pourpré
65 Hibou grand-duc
68 Hibou des marais
67 Hibou moyen-duc
66 Hibou petit-duc
50 Hirondelle de chemi-
née
48 Hirondelle de fenê-
tre
24 Hirondelle de rivage
8 Hochequeue gris
6 Hochequeue jaune
7 Hochequeue des
ruisseaux
300 Huîtrier pie du nord
55 Huppe fasciée
34 Hupolaïs contre-
faisant

I

- 209 Ibis falcinelle

J

- 177 Jaseur du nord

N°		N°		N°		N°	
	L						
311	Labbe à longue queue	192	Monticole bleu	173	Pie-grièche à poitrine rose	30	Rousserolle des roseaux
310	Labbe parasite	191	Monticole de roche	175	Pie-grièche à tête rousse	29	Rousserolle turdoïde
309	Labbe pomarin	39	Motteux cendré				S
328	Lagopède d'Ecosse	97	Mouette à trois doigts	197	Pigeon biset		
142	Linotte à bec jaune	95	Mouette pygmée	198	Pigeon colombin	232	Sarcelle d'été
133	Linotte mélodieuse	96	Mouette rieuse	199	Pigeon ramier	231	Sarcelle formose
344	Linotte mélodieuse × Chardonneret élégant	88	Mouette de Sabine	140	Pinson d'Ardenne	230	Sarcelle d'hiver
			N	139	Pinson chanteur	138	Serin cini de l'Europe centrale
348	Linotte mélodieuse × Serin domestique	237	Nette à huppe rousse	349	Pinson chanteur × Pinson d'Ardenne ou du nord	11	Sittelle torchepot
334	Locustelle luscinioides		O	140	Pinson du nord	135	Sizerin flammé boréal
28	Locustelle tachetée	267	Œdicnème criard	5	Pipit aquatique	336	Sizerin flammé de Hornemann
130	Loriot jaune	223	Oie à bec court	3	Pipit des arbres	136	Sizerin flammé roussâtre
	M	219	Oie cendrée	2	Pipit des champs	77	Spatule blanche
316	Macareux moine	227	Oie d'Egypte	4	Pipit des prés	85	Sterne arctique
244	Macreuse brune	222	Oie des moissons	1	Pipit Richard	82	Sterne caspienne
245	Macreuse à lunettes	221	Oie naine	2	Pipit rousseline	83	Sterne caugek
246	Macreuse noire	340	Oie des neiges	264	Plongeon à gorge noire	86	Sterne de Dougall
323	Marouette de Bailly	220	Oie rieuse	265	Plongeon à gorge rousse	81	Sterne hansel
322	Marouette ponctuée	317	Outarde barbue	263	Plongeon imbrin	87	Sterne naine
324	Marouette poussin	318	Outarde canepetière	275	Pluvier argenté	84	Sterne Pierre-Garin
196	Martin-pêcheur d'Europe	319	Outarde de Macqueen	274	Pluvier doré	266	Syrnhapte paradoxal
			P	273	Pluvier guignard		T
129	Martin roselin	331	Perdrix grise	26	Pouillot chanteur		
53	Martinet noir	184	Petite Grive de Swainson	27	Pouillot siffleur	228	Tadornes de Belon
189	Merle noir	271	Petit Gravelot	25	Pouillot véloce	132	Tarin des aulnes
188	Merle à plastron	312	Petit Pingouin	326	Poule d'eau	347	Tarin des aulnes × Serin domestique
313	Mergule nain	255	Pétrel cul-blanc	256	Puffin des Anglais	329	Tétras lyre
13	Mésange bleue	257	Pétrel glacial	125	Pygargue à queue blanche	62	Torcol fourmilier
12	Mésange charbonnière	254	Pétrel tempête		R	277	Tournepierre à collier
15	Mésange huppée	295	Phalarope à bec étroit	321	Râle d'eau	200	Tourterelle des bois
18	Mésange à longue queue	294	Phalarope à bec large	19	Roitelet huppé	41	Traquet pâtre
21	Mésange à moustaches	57	Pic cendré	20	Roitelet tête de feu	41	Traquet rubicole
14	Mésange noire occidentale	58	Pic épeiche occidental	195	Rollier d'Europe	40	Traquet tarier
16	Mésange nonnette	59	Pic épeichette	44	Rosignol philomèle	49	Troglodyte mignon
17	Mésange des saules	60	Pic mar	47	Rouge-gorge familier occidental		V
119	Milan noir	61	Pic noir	42	Rouge-queue de muraille		
114	Milan royal	56	Pic vert	43	Rouge-queue noirâtre	276	Vanneau huppé
149	Moineau domestique	206	Pie gauloise	33	Rousserolle aquatique	127	Vautour fauve
150	Moineau friquet	176	Pie-grièche écorcheur	31	Rousserolle des marais	143	Venturon montagnard
350	Moineau friquet × Moineau domestique	174	Pie-grièche grise	32	Rousserolle phragmite	134	Verdier d'Europe
148	Moineau soulcie					343	Verdier d'Europe × Chardonneret élégant