

Zoogdieren Mammifères

IRSNB / KBIN



RBINS112929

C43457

coll
8162

Zoogdieren van de hele wereld

Mammifères du monde entier

DEEL 2
TOME 2

uitgegeven door n.v. FORT produkten
édité par s.a. produits FORT



FORT
I T E G E M

IRSNB / KBIN



RBINS112929
C43457

VOORWOORD

Het succes van onze verzamelingen " De Vogels van België " en " Dieren van België ", is voor ons een aansporing geweest om in het domein van de Natuurwetenschappen te blijven, en te vervolgen met " Insekten van België ".

Nogmaals hebben wij de steun gevraagd en verkregen van de Commissie van Beheer van het Vermogen van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Wij danken deze Commissie voor haar waardevolle medewerking.

Onder de titel " Zoogdieren " worden in dit werk, dat uit twee albums bestaat, driehonderd vijftig dieren van de hele wereld beschreven.

De kleurenprenten, gedrukt naar de modellen van het Koninklijk Instituut, zijn stuk voor stuk kleine kunstwerken; de verklarende teksten werden opgesteld onder de leiding van geleerden van hetzelfde Instituut.

Wij zijn ervan overtuigd dat ook deze uitgave in smaak zal vallen bij onze cliëntele en dat ze vooral door de opvoeders zal gewaardeerd worden.

N.V. FORT PRODUKTEN.

AVANT-PROPOS

Le succès de nos collections " Les Oiseaux de Belgique " et " Animaux de Belgique " nous a incités à rester dans le domaine des Sciences Naturelles et à continuer avec les " Insectes de Belgique ".

Une fois de plus nous avons sollicité et obtenu l'appui de la Commission Administrative du Patrimoine de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. Nous remercions cette Institution pour sa précieuse collaboration.

Le présent ouvrage, intitulé " Mammifères ", se compose de deux albums et traite de trois cent cinquante animaux du monde entier.

Imprimées d'après les modèles de l'Institut Royal, les images en couleurs constituent de véritables œuvres d'art; les notices accompagnant les illustrations ont été rédigées sous la direction de spécialistes du même Institut.

Nous sommes persuadés que cette édition sera appréciée par toute notre clientèle et spécialement par les éducateurs.

S.A. PRODUITS FORT.

(Zoogdieren van de hele wereld : deel I)

- I ORDE DER OPPERDIENEN (PRIMATEN)
- II ORDE DER HANDVLEUGELIGEN (CHIROPTERA)
- III ORDE DER INSEKTENETERS (INSECTIVORA)
- IV ORDE DER ROOFDIENEN (CARNIVORA)
- V ORDE DER ZEEROOFDIENEN (PINNIPEDIA)

(Zoogdieren van de hele wereld : deel II)

VI. ORDE DER ONEVENHOEVIGEN (PERISSODACTYLA)

Hebben hoeven met een oneven aantal tenen. Geen horens op het voorhoofd, behalve één familie die iets op de neus heeft dat op horens lijkt (nl. de neushoorns).

- Eerste familie : PAARDACHTIGEN (EQUIDAE)

176. Przewalsky-paard - 177. Kiang - 178. Onager - 179. Ezel - 180. Burchell-zebra - 181. Grévy-zebra - 182. Bergzebra.

- Tweede familie : TAPIRS (TAPIRIDAE)

Neus en bovenlip zijn verlengd tot een slurkje, dat gebruikt wordt om voedsel te grijpen.

183. Sjabraktapir - 184. Zuidamerikaanse tapir - 185. Bergtapir.

- Derde familie : NEUSHOORNEN (RHINOCEROTIDAE)

Hebben op de neus één of twee horens. Deze horens zijn steeds door groeiende organen, door de huid gevormd. Ze worden door schuren puntig en scherp gehouden.

186. Witte Neushoorn - 187. Zwarte Neushoorn - 188. Pantserneushoorn - 189. Javaanse Neushoorn - 190. Sumatraanse Neushoorn.

VII. ORDE DER EVENHOEVIGEN (ARTIODACTYLA)

Bij de evenhoevigen ligt de steunas tussen de derde en de vierde teen, en niet in de derde teen zoals bij de onevenhoevigen.

A. ONDERORDE DER NIET-HERKAUWERS (SUIFORMES)

Hebben aan elke poot vier van hoeven voorziene tenen. Ze hebben noch horens, noch een gewei.

191. Rivierzwijn - 192. Reuzenwoudeverzwijn - 193. Knobbelszwijn of Manenzwijn - 194. Pekari - 195. Nijlpaard.

B. ONDERORDE DER EELTPOTIGEN (TYLOPODA)

Bezitten dikke, taaie voetzolen. De kamelen en de lama's die tot deze onderorde behoren, zijn typische steppe- en woestindieren.

196. Kameel - 197. Dromedaris - 198. Goeanaco - 199. Lama - 200. Alpaca - 201. Vicoenja.

C. ONDERORDE DER HERKAUWERS (RUMINANTIA)

Evenhoevige dieren met een samengestelde maag, die van pas komt bij het herkauwen van hun voedsel. Bijna alle hebben ze horens of een gewei op het voorhoofd. Zeer soortrijke onderorde.

- Eerste familie : DWERGHERTEN (TRAGULIDAE)

Hoefdieren die niet veel groter worden dan een haas. Ze lijken wel op de muskusherten, maar ze missen de geurklieren.

202. Watermuskusdier.

- Tweede familie : HERTACHTIGEN (CERVIDAE)

Worden gekenmerkt door het gewei. De meest primitieve hertachtigen, muskusdier en waterree, dragen geen gewei.

203. Muskusdier - 204. Muntjak - 205. Wapiti - 206. Axis - 207. Varkenshart - 208. Waaierschart - 209. Spieshart - 210. Eland - 211. Rendier.

- Derde familie : GIRAFFEN (GIRAFFIDAE)

Tot deze familie behoren de giraf en de okapi. Anatomisch staat deze familie tussen die der herten en die der holhoornigen.

212. Giraf - 213. Okapi.

- Vierde familie : GAFFELANTILOPEN (ANTILOCAPRIDAE)

Deze familie telt maar één geslacht met één soort.

214. Gaffelantiloop.

- Vijfde familie : HOLHOORNIGEN (BOVIDAE)

Runderen, schapen, geiten, gemzen, steenbokken en antilopen. Kenmerkend zijn de horens, die bestaan uit een beenpit en een hoornschede.

(Mammifères du monde entier : tome I)

- I ORDRE DES ANIMAUX SUPERIEURS (PRIMATES)
- II ORDRE DES CHEIROPTERES
- III ORDRE DES INSECTIVORES
- IV ORDRE DES CARNIVORES
- V ORDRE DES PINNIPEDES

(Mammifères du monde entier : tome II)

VI. ORDRE DES PERISSODACTYLES

Le nombre de doigts aux sabots est impair. Pas de cornes sur le front, sauf une famille chez laquelle il y a un appendice sur le dessus du nez ressemblant à des cornes (les rhinocéros).

- Première famille : LES EQUIDES

176. Cheval de Przewalsky - 177. Kiang - 178. Onagre - 179. Ane sauvage - 180. Zèbre de Burchell - 181. Zèbre de Grévy - 182. Zèbre des montagnes.

- Deuxième famille : LES TAPIRS

Le nez et la lèvre supérieure sont allongés et forment une espèce de petite trompe, qui est utilisée pour prendre de la nourriture.

183. Tapir malais - 184. Tapir sud-américain - 185. Tapir pinchaque.

- Troisième famille : LES RHINOCEROS

Ont sur le dessus du nez une ou deux cornes, qui sont des organes à croissance continue, d'origine cutanée, tenues pointues et acérées par frottement.

186. Rhinocéros blanc - 187. Rhinocéros noir - 188. Rhinocéros indien - 189. Rhinocéros de la Sonde - 190. Rhinocéros de Sumatra.

VII. ORDRE DES ARTIODACTYLES

Chez les artiodactyles, l'axe d'appui est situé entre le troisième et le quatrième doigt et non pas dans le troisième comme chez les périssodactyles.

A. SOUS-ORDRE DES SUIFORMES

Ont à chaque patte des sabots pourvus de quatre doigts. Ne portent ni cornes, ni bois.

191. Potamochère ou Sanglier des rivières - 192. Hylochère ou Sanglier géant de forêt - 193. Phacochère ou Sanglier de savane - 194. Pécari à collier - 195. Hippopotame.

B. SOUS-ORDRE DES TYLOPODES

La plante du pied est transformée en de gros tampons calleux. Les chameaux et les lamas, qui appartiennent à ce sous-ordre, sont des animaux typiques des steppes et des déserts.

196. Chameau bactrien - 197. Dromadaire - 198. Huanaco - 199. Lama - 200. Alpaca - 201. Vigogne.

C. SOUS-ORDRE DES RUMINANTS

Des animaux artiodactyles à estomac compartimenté, particularité qui leur vient bien à propos, pour ruminer leur nourriture. Presque tous portent des cornes ou des bois sur le front. C'est un sous-ordre très riche en espèces.

- Première famille : LES TRAGULIDES

Des ongulés dont la taille ne dépasse pas de beaucoup celle du lièvre. Bien qu'ils ressemblent aux cerfs musqués, il leur manque la glande odorante.

202. Chevrotain aquatique.

- Deuxième famille : LES CERVIDES

Se caractérisent par leurs bois. Les cervidés les plus primitifs, le porte-musc et le cerf pygmée, en sont dépourvus.

203. Porte-musc - 204. Muntjac - 205. Wapiti - 206. Cerf axis - 207. Cerf cochon - 208. Cerf de Virginie - 209. Mazama ou Daguet mexicain - 210. Eland - 211. Renne.

- Troisième famille : LES GIRAFIDES

La girafe et l'okapi appartiennent à cette famille. Du point de vue anatomique, elle se situe entre celle des cervidés et celle des cavicornes.

212. Girafe - 213. Okapi.

- Quatrième famille : ANTILOCAPRIDES

Cette famille ne compte qu'une seule espèce.

214. Antilope à cornes fourchues.

- Cinquième famille : LES CAVICORNES

Bovins, moutons, chèvres, chamois, bouquetins et antilopes. Les cornes sont caractéristiques : elles sont composées d'une cheville osseuse et d'un étui corné.

215. Zebou - 216. Banteng - 217. Gayal - 218. Muskusos - 219. Wilde Buffel - 220. Rode Buffel - 221. Kafferbuffel - 222. Amerikaanse Bison - 223. Wisent of Europese Bison - 224. Yak - 225. Nijlgau - 226. Vierhoorn-antiloop - 227. Eland-antiloop - 228. Rens-elandantiloop - 229. Grote Koe-doe - 230. Sitatoenga of Waterkoe-doe - 231. Bosbok - 232. Bongo - 233. Gewone Duiker - 234. Bosduiker - 235. Zwartrugduiker - 236. Goudrug-duiker - 237. Blauwbokje - 238. Sabelantiloop - 239. Paardantiloop - 240. Noordafrikaanse Hartebeest - 241. Lichtensteins Hartebeest - 242. Sassaby - 243. Blesbok - 244. Witbaardgnoe - 245. Bruine Waterbok - 246. Lechwe - 247. Kob-waterbok - 248. Rietbok - 249. Klipspringer - 250. Oribie - 251. Vlakbok - 252. Dwergantiloop - 253. Girafgazelle - 254. Springbok - 255. Gazelle - 256. Impala - 257. Gems - 258. Sneeuwgeit - 259. Rundergems - 260. Bezoargeit - 261. Toer - 262. Moeflon - 263. Polo-schaap.

VIII. ORDE DER ZEEKOEIEN (SIRENIA)

Volledig aangepast aan het leven in het water. De voorste ledematen zijn vinvormig, de achterste ontbreken. Dikke speklaag en povere beharing.

264. Afrikaanse Zeekoe.

IX. ORDE DER KLIPDASSEN (HYRACOIDEA)

Lijken uiterlijk wel wat op konijnen, maar hebben kortere oren. De tenen dragen hoefachtige nagels, behalve de middelste teen, die een klauwnagel bezit. Op de rug zit een klier, die een sterk geurende stof afscheidt.

265. Zwartachtige Boomdaman - 266. Damman der lava's van Kivoo.

X. ORDE DER SLURFDIEREN OF OLIFANTEN (PROBOSCIDEA)

Hebben een grote bloeitijd achter de rug. De grootste en zwaarste landdieren, met als meest opvallend kenmerk de slurf, een uitgroeiing van neus en bovenlip.

267. Afrikaanse olifant - 268. Indische olifant.

XI. ORDE DER AARDVARKENS (TUBULIDENTATA)

Telt nog maar één soort, die echter zo afwijkt van alle andere zoogdieren dat ze een afzonderlijke plaats heeft gekregen in de systematiek. De hoeven zijn tot klauwen vervormd.

269. Aardvarken.

XII. ORDE DER TANDARMEN (EDENTATA)

Dieren waarvan het gebit over 't algemeen weinig ontwikkeld is, met zeer lange en wormvormige tong. « Tandarmen » betekent echter niet dat deze dieren geen tanden bezitten, het reuzengordeldier heeft er zelfs meer dan enig ander landzoogdier.

A. ONDERORDE DER MIERENETERS (MYRMECOPHAGIDAE)

Werkelijk « tandarme » dieren; het gebit ontbreekt.

270. Grote miereneter - 271. Tamandoea - 272. Dwergmiereneter.

B. ONDERORDE DER LUIAARDEN (BRADYPODIDAE)

Plompe dieren, die hun ganse leven in de bomen doorbrengen, hangend met de rug naar beneden.

273. Tweevingerige luiaard - 274. Drievingerige luiaard.

C. ONDERORDE DER GORDELDIEREN OF ARMADILLO'S (DASYPODIDAE)

Kenmerkend is dat de rugzijde en de staart een pantser dragen van dicht bij elkaar zittende beenplaten, die met een hoornlaag zijn overtrokken.

275. Bruinbehaarde Gordeldier - 276. Reuzengordeldier - 277. Kaalstaartgordeldier - 278. Kogelgordeldier - 279. Negengordelig Gordeldier - 280. Zesgordelig Gordeldier - 281. Mazza-gordeldier - 282. Harig Gordeldier - 283. Gordelmol.

215. Zébu - 216. Bateng - 217. Gaur - 218. Boef musqué - 219. Buffle indien - 220. Buffle rouge ou de forêt - 221. Buffle noir d'Afrique, ou des savanes, ou des Cafres - 222. Bison américain - 223. Bison d'Europe ou Wissent - 224. Yack - 225. Nilgau - 226. Tétracère - 227. Antilope-Élan - 228. Élan géant ou de Derby - 229. Grand Kudu - 230. Situtunga ou Antilope des marais - 231. Guib ou Antilope harnachée - 232. Antilope Bongo ou Bangana - 233. Duiker commun ou Céphalophe de savane - 234. Céphalophe à ventre clair - 235. Céphalophe marron à dos noir - 236. Céphalophe des bois - 237. Boloko ou Duiker bleu - 238. Antilope noire - 239. Antilope chevaline ou rouanne - 240. Bubale de Jackson - 241. Bubale de Lichtenstein - 242. Antilope topi ou Hyemera - 243. Blesbok - 244. Gnou à barbe blanche - 245. Defassa ou Waterbuck - 246. Cob des marais ou Lechwe - 247. Kob de Thomas - 248. Antilope des Roseaux ou Bohor - 249. Sauter des roches - 250. Oribi - 251. Raphicère - 252. Hylarnus ou Antilope naine - 253. Gazelle girafioïde ou Guéréonouk - 254. Springbok - 255. Gazelle Dama - 256. Impala, Pala ou Mpala - 257. Chamois ou Isard - 258. Chèvre des montagnes rocheuses - 259. Takine - 260. Chèvre sauvage de Perse - 261. Bouquetin caucasien - 262. Mouflon d'Europe - 263. Marco Polo.

VIII. ORDRE DES SIRENIENS

Sont totalement adaptés à la vie aquatique. Les membres antérieurs sont piniformes, les postérieurs manquent. Ils ont une grosse couche de graisse et le recouvrement pileux est peu important.

264. Lamatin africain.

IX. ORDRE DES HYRACOÏDES

Ressemblent assez bien aux lapins, mais ont des oreilles plus courtes. Les doigts sont pourvus d'ongles en forme de sabots, sauf le doigt médian qui possède un ongle à griffe. Sur le dos il y a une glande qui sécrète une substance à odeur très pénétrante.

265. Damman orboricole noirâtre - 266. Damman des laves du Kivu.

X. ORDRE DES PROBOSCIDIENS

Ont un passé glorieux derrière eux. Ce sont les animaux terrestres les plus grands et les plus lourds. La caractéristique la plus frappante est la trompe, une excroissance du nez et de la lèvre supérieure.

267. Éléphant d'Afrique - 268. Éléphant indien.

XI. ORDRE DES TUBULIDENTES

Ne comprend plus qu'une seule espèce, qui cependant s'écarte si loin de tous les autres mammifères qu'elle a obtenu une place à part dans la systématique. Les sabots sont transformés en griffes.

269. Oryctérope.

XII. ORDRE DES EDENTES

Des animaux dont la denture est généralement très peu développée et dont la langue est fort longue et vermiforme. « Edenté » ne signifie cependant pas que ces animaux sont dépourvus de dents; le tatou géant en possède même plus que tout autre mammifère terrestre.

A. SOUS-ORDRE DES MYRMECOPHAGIDES

Sont effectivement des « édentés », la denture faisant complètement défaut.

270. Grand Fourmilier - 271. Tamandua tétradactyle - 272. Fourmilier nain ou Cyclope didactyle.

B. SOUS-ORDRE DES BRADYPODIDES (PARESSEUX)

Des animaux lents, qui passent toute leur vie dans les arbres, suspendus, le dos vers le sol.

273. Paresseux didactyle - 274. Paresseux tridactyle.

C. SOUS-ORDRE DES DASYPODIDES (TATOUS)

Une caractéristique est la carapace, constituée de plaques osseuses, très serrées, revêtues d'écailles cornées, qui recouvre le dos et la queue.

275. Quirquincho ou Tatou velu - 276. Tatou géant - 277. Cabasson - 278. Tatou « Matabo » ou « Apaza » - 279. Tatou à neuf bandes - 280. Tatou à six bandes - 281. Moulita à longues oreilles - 282. Tatou velu - 283. Chlamyphore tronqué.

XIII. ORDE DER SCHUBDIEREN (PHOLIDATA)

Komen alleen voor in de oude wereld en hebben met de gordeldieren of andere tandarmen niets gemeen. Boven- en onderkant van het lichaam zijn bedekt met schubvormige hoornplaten. Insekteneters; hierop wijzen reeds hun krachtige graafklauwen en hun wormvormige tong.

284. Steppenschubdier - 285. Langstaartboomschubdier - 286. Witbuikschubdier.

XIV. ORDE DER WALVISACHTIGEN (CETACEA)

Zoogdieren bij dewelke de aanpassing aan het waterleven op de spits is gedreven. Ze gaan nooit aan land. Hun achterpoten zijn verdwenen en hun voorpoten zijn omgevormd tot een soort vinnen.

A. ONDERORDE DER BAARDWALVISSEN (MYSTACOCETI)

Hebben geen tanden, maar van hun verhemelte hangen in twee overlangse rijen langs weerszijden ongeveer 300-400 hoornplaten, de baarden of baleinen.

287. Groenlandse Walvis - 288. Blauwe Vinvis - 289. Noordse Vinvis - 290. Bultrug - 291. Grijs Walvis.

B. ONDERORDE DER TANDWALVISSEN (ODONTOCETI)

Geen homogene groep. Wat grootte en aantal tanden betreft, is er een grote verscheidenheid.

292. Potvis - 293. Dwergpotvis - 294. Butskop - 295. Witte Dolfijn - 296. Narwal - 297. Zwaardwalvis - 298. Ganges-dolfijn.

XV. ORDE DER KNAAGDIEREN (RODENTIA)

De omvangrijkste orde van de zoogdieren. De meeste soorten zijn kleiner dan een rat. Ze hebben veel vijanden, waartegen ze zich verdedigen door een verborgen levenswijze en een zeer snelle vermenigvuldiging. Meestal zeer schadelijke dieren.

A. ONDERORDE DER EEKHOORNACHTIGEN (SCIUROMORPHA)

Tot deze onderorde behoren zeven families, die dikwijls uiterlijk veel verschillen, maar anatomisch toch veel gelijkenis vertonen.

299. Gestreepte Eekhoorn - 300. Palmeekhoorn - 301. Oliepalmeekhoorn - 302. Gestreepte Eekhoorn - 303. Grondeekhoorn - 304. Kleine Vliegende Eekhoorn - 305. Bever - 306. Vliegende Slaapmuis - 307. Grijs Stekelstaarteekhoorn - 308. Witbuikstekelstaarteekhoorn - 309. Springhaas.

B. ONDERORDE DER MUISACHTIGEN (MYOMORPHA)

Het grootste aantal geslachten der knaagdieren behoort tot deze onderorde. Het zijn alle kleine dieren. Het grootste meet niet meer dan 40 cm.

310. Oost-Kongoles Springmuis - 311. Zwarte Rat - 312. Leggada - 313. Oorrat - 314. Grasmuis - 315. Tepelrat - 316. Bruine Hamsterrat - 317. Grondboorder - 318. Vuurkaanslaapmuis.

C. ONDERORDE DER STEKELVARKENACHTIGEN (HYSTRICOMORPHA)

Hiertoe behoren een reeks, op het eerste zicht althans, weinig op elkaar lijkende dieren: stekelvarkens, chinchilla's en Guineese biggetjes of cavia's.

319. Stekelvarken - 320. Kwaststaartstekelvarken - 321. Guineese biggetje - 322. Mara of Patagonische haas - 323. Zoutpanmara - 324. Waterzwijn of Capibara - 325. Pacarana - 326. Azara-agouti en gewone agouti - 327. Gouden agouti en Mexicaanse agouti - 328. Paca - 329. Chinchilla - 330. Haasmuis - 331. Viscacha.

XVI. ORDE DER HAASACHTIGEN (LAGOMORPHA)

Als bijzonder kenmerk hebben ze achter de snijtanden in de bovenkaak nog twee kleine snijtanden. De vorm en de schikking der kiezen wijken ook af van wat gewoonlijk voorkomt bij de knaagdieren.

332. Kaapse haas.

XIII. ORDRE DES PANGOLINIDES (MANIDES)

Ne se rencontrent que dans l'ancien monde et n'ont rien de commun avec les tatous et les autres édentés. Le dessus et le dessous du corps sont revêtus de plaques cornées écailleuses. Ce sont des insectivores, ce qui se voit à leurs fortes griffes fouisseuses et à leur langue vermiforme.

284. Pangolin africain terrestre, ou géant - 285. Pangolin africain arboricole à longue queue - 286. Pangolin africain arboricole tricuspidé ou à ventre blanc.

XIV. ORDRE DES CETACES

Des mammifères chez lesquels l'adaptation à la vie aquatique est poussée à l'extrême. Ne viennent jamais à terre. Les membres postérieurs ont disparu et les membres antérieurs sont transformés en nageoires.

A. SOUS-ORDRE DES MYSTICETES

N'ont pas de dents, mais à leur palais pendent, en deux rangées longitudinales de chaque côté de la bouche, environ 300-400 lames cornées, les fanons ou baleines.

287. Baleine franche - 288. Baleinoptère de Sibbald, ou Rorqual bleu - 289. Rorqual de Rudolphi ou des Colins - 290. Baleine à bosse - 291. Baleine grise.

B. SOUS-ORDRE DES ODONTOCETES (BALEINES A DENTS)

Ce n'est pas un groupe homogène. En ce qui concerne le nombre de dents et la taille, il y a une très grande diversité.

292. Cachalot - 293. Kogia à tête courte - 294. Baleine à bec commune - 295. Dauphin blanc ou Belouga - 296. Narval - 297. Epaulard - 298. Sous du Gange.

XV. ORDRE DES RODENTIA (RONGEURS)

L'ordre de mammifères le plus important. La plupart des espèces sont plus petites qu'un rat. Ils ont beaucoup d'ennemis, contre lesquels ils se défendent en menant une vie cachée et par une multiplication très rapide. En général des animaux très nuisibles.

A. SOUS-ORDRE DES SCIUROMORPHES

A cet ordre appartiennent sept familles d'aspect souvent très différent mais à des ressemblances anatomiques fortes.

299. Ecureuil à pattes rouges - 300. Ecureuil de Malabar - 301. Grand écureuil à ventre nu - 302. Ecureuil rayé des montagnes - 303. Marmotte des Alpes - 304. Sciuroptère bicolore - 305. Castor d'Europe - 306. Anomalure pygmée - 307. Petit anomalure gris - 308. Anomalure à ventre blanc du Katanga - 309. Pédète ou Lièvre sauteur.

B. SOUS-ORDRE DES MYOMORPHES

Le plus grand nombre de rongeurs appartient à ce sous-ordre. Ce sont tous des animaux de petite taille. Le plus grand ne dépasse pas 40 cm.

310. La Gerboise de l'est du Congo - 311. Rat noir congolais - 312. Leggada joli - 313. Rat à larges oreilles - 314. Rat strié - 315. Rat à nombreuses mamelles - 316. Rat de Gambie - 317. Rat-taupe argenté - 318. Muscardin des volcans.

C. SOUS-ORDRE DES HYSTRICIDES

A ce sous-ordre appartient une série d'animaux qui, à première vue, se ressemblent fort peu: les porcs-épics, les chinchillas et les cobayes.

319. Porc-épic du Kivu - 320. Porc-épic à queue en épi - 321. Cobaye - 322. Mara ou Lièvre de Patagonie - 323. Mara des Salines - 324. Capybara - 325. Dinomys de Branicky - 326. Agouti d'Azara et Agouti ordinaire - 327. Agouti doré argentin et Agouti mexicain - 328. Paca - 329. Chinchilla - 330. Lagidium - 331. Viscache.

XVI. ORDRE DES LAGOMORPHES

Possèdent, derrière celles de la mâchoire supérieure, encore deux autres petites incisives supplémentaires. La forme et la position des molaires s'écartent également de ce qui se voit habituellement chez les autres rongeurs.

332. Lièvre de l'Est-africain.

XVII. ORDE DER BUIDELDIEREN (MARSUPIALA)

Deze orde vertoont een grote vormenrijkdom. Een kenmerk hebben ze allen gemeen: hun jongen worden wel levend geboren, maar in een zo vroeg stadium van ontwikkeling, dat men eigenlijk beter van larven kan spreken. Bij de meeste soorten komt ook een buidel voor, althans bij de wijfjes.

333. Reuzenkangoeroe - 334. Rotskangoeroe - 335. Boomkangoeroe - 336. Wombat - 337. Buidelbeer of Koala - 338. Koeskoes - 339. Voskoeskoes - 340. Vliegende Koeskoes - 341. Gestreepte Buideleekhoorn - 342. Slurfbuidelbeer - 343. Tasmaanse Buideldas - 344. Mierenbuideldier - 345. Buidelwolf - 346. Tasmaanse Duivel - 347. Gevlekte Buidelmuis - 348. Pluimstaartbuidelmuis.

XVIII. ORDE DER EIERLEGGENDE ZOOGDIEREN (MONOTREMATA)

Deze merkwaardige dieren leggen eieren met een perkamentachtige schaal. De jongen worden dus niet afgeworpen zoals bij de andere zoogdieren. Het zijn nochtans echte zoogdieren. Ze hebben een haarkleed en zogen hun jongen.

A. ONDERORDE DER MIERENEGELS (TACHYGLOSSIDAE)

Tussen de haren staan op de rug stekelvormige, puntige haren. Zo doen ze aan de egel en het stekelvarken denken.

349. Mierenegel.

B. ONDERORDE DER VOGELBEKDIEREN (ORNITHORHYNCHIDAE)

Deze onderorde telt maar één soort.

350. Vogelbekdier.

XVII. ORDRE DES MARSUPIAUX

Cet ordre contient une très grande richesse de formes. Ils ont une caractéristique commune: bien que leurs petits viennent au monde vivants, ils se trouvent dans un tel stade prématuré de développement, qu'on les comparerait plutôt à des larves. Chez la plupart des espèces, il existe une poche ventrale, du moins chez les femelles.

333. Kangourou géant - 334. Pérogale pénicillé - 335. Kangourou arboricole - 336. Wombat - 337. Koala - 338. Phalanger tacheté - 339. Phalanger commun - 340. Phalanger volant à courte tête - 341. Dactylopsila à trois bandes - 342. Tarsipes rostré - 343. Bandicoot de Tasmanie - 344. Fourmilier marsupial - 345. Thylacine ou « Loup marsupial de Tasmanie » - 346. Sarcophile ou « Diable de Tasmanie » - 347. Dasyure tacheté - 348. Phascogale à queue touffue.

XVIII. ORDRE DES MONOTREMES

Ces animaux remarquables pondent des œufs à la coquille parcheminée. Les jeunes ne sont donc pas mis bas, comme chez les autres mammifères. Ce sont pourtant de véritables mammifères. Ils ont un pelage et ils allaitent leurs petits.

A. SOUS-ORDRE DES TACHYGLOSSIDES

Entre les poils du dos, il y en a qui sont pointus et en forme de piquants. Ils font songer au hérisson et aux porcs-épics.

349. Echidné.

B. SOUS-ORDRE DES ORNITHORHYNCHIDES

Ce sous-ordre ne comprend qu'une seule espèce.

350. Ornithorhynque.


176. PRZEWALSKY-PAARD

Equus przewalskii

Het Przewalsky-paard, afkomstig uit de steppen van het Verre Oosten, is een ondersoort van het Euraziatische wilde paard. Het dankt zijn naam aan de Russische generaal Przewalsky, die het in 1879 herontdekte in het hart van Azië. Waarschijnlijk werd het reeds tevoren beschreven door de dierkundige Pallas.

Als kenmerk van de echte wilde paarden heeft het Przewalsky-paard rechtopstaande nekharen. De winterpels is zeer dicht en wollig, het zomerkleed licht geelachtig-bruin met roodachtige schijn. Naast en boven de neus is de snuit ongeveer wit. Bij sommige dieren is een « kruis » op de schouders aanwezig. Nekmanen en staart zijn donkerbruin tot zwart. De staart is langharig met aan de wortel korte haren.

In wilde toestand is het Przewalsky-paard nagenoeg uitgestorven. Gelukkig leeft een beperkt aantal van deze paarden in dierentuinen.



176. — Przewalsky-paard - Cheval de Przewalsky

176. CHEVAL DE PRZEWALSKY

Equus przewalskii

Le Cheval de Przewalsky est originaire des steppes de l'Extrême-Orient. Il s'agit d'une sous-espèce du cheval sauvage eurasiatique. Ce cheval doit son nom au général russe Przewalsky, qui redécouvrit l'animal en 1879 au cœur de l'Asie. Il est fort probable qu'il avait déjà été décrit auparavant par le zoologue Pallas.

Comme signe distinctif des véritables chevaux sauvages, le cheval de Przewalsky porte la crinière dressée. Le pelage d'hiver est laineux et très touffu. Le pelage d'été est fauve clair, aux reflets rougeâtres. Sur les côtés et au-dessus du nez, le museau est presque blanc. Signalons chez certains animaux l'existence d'une « croix » sur les épaules. La crinière et la queue sont brun foncé à noir. La queue est composée de poils longs avec des crins plus courts à la racine.

A l'état sauvage, le cheval de Przewalsky est presque éteint. Heureusement il en existe un petit nombre dans les jardins zoologiques.

177. KIANG

Equus kiang

De Kiang behoort tot de paardezels. Deze leven in de Aziatische woestijnsteppen en staan, wat hun uiterlijk betreft, tussen paard en ezel. De door hen voortgebrachte geluiden houden het midden tussen het gehinnik van een paard en het gebalk van een ezel.

De kiang bewoont de steppen van « het dak der wereld ». Hij is nog niet zeldzaam en wordt aangetroffen in Tibet, Yarkand en Kasjmir. In de zomer is het dier roodbruin met wit aan de buik, de kop en de ledematen; de wintervacht is donkerbruin. Hij heeft geen langbehaarde staart zoals een paard, maar veeleer een staart, die slechts voor de helft is behaard. De oren lijken op die van een ezel.

177. KIANG


Equus kiang

Le Kiang appartient à la famille des hémionides. Ceux-ci vivent dans les steppes désertiques de l'Asie. Par leur aspect extérieur ils se situent entre le cheval et l'âne. Les cris qu'ils émettent tiennent le milieu entre le hennissement du cheval et le braiment de l'âne.

Le kiang habite les steppes du « toit du monde ». Il n'est pas encore rare et se rencontre au Thibet, au Yarkand et en Cachemire. En été, l'animal est rouge-brun avec du blanc au ventre, à la tête et aux membres; le pelage d'hiver est brun foncé. Il n'a pas la queue à longs crins des chevaux, mais plutôt une queue qui n'est poilue que pour la moitié. Les oreilles ressemblent à celles de l'âne.



177. — Kiang - Kiang



178. — Onager - Onagre

178. ONAGER

Equus onager

De Onager behoort, evenals de kiang, tot de paardezels. De onager is evenwel kleiner en zijn verspreidingsgebied strekt zich uit van westelijk India, door Perzië tot Transcaspië. Het dier is zeldzaam geworden. In enkele dierentuinen kan men de uit Perzië aangevoerde onagers bewonderen.

De onager is zeer vlug en kan maar zelden ingehaald worden, zelfs door een zeer bereden ruiter. Deze dieren leven in kuddes, steeds door een hengst aangevoerd.

178. ONAGRE

Equus onager

Comme le kiang, l'Onagre appartient à la famille des hémionés. L'onagre est plus petit et son aire de dispersion s'étend de l'Inde occidentale, par l'Iran à la Transcaspië. L'animal est devenu rare. Dans certains jardins zoologiques, on peut admirer des onagres importés de l'Iran.

L'onagre est très rapide et même un cavalier expérimenté a difficile à le rejoindre. Ces animaux vivent par troupeaux, toujours sous la conduite d'un étalon.

179. EZEL

Equus asinus

De echte Wilde Ezel komt voor in de dorre halfwoestijnen van Afrika. Typisch zijn de grote « ezelsoren », de zeer smalle hoeven en het ezelgebalk. De wilde ezel is even groot als de tamme ezel van Egypte en het Midden-Oosten. Deze laatste stamt van hem af, maar is slanker en zijn vacht is meer roodachtig. Er zijn drie ondersoorten van wilde ezels. Op de afbeelding zien we de Somali-ezel.

Wilde ezels zijn zeldzaam geworden. In Ethiopië leven waarschijnlijk nog enkele Somali-ezels.

De wilde ezels zijn schrandere en vlug. Ze leven in kleine groepen, meestal geleid door een ouder dier.



179. — Ezel - Ane sauvage

179. ANE SAUVAGE

Equus asinus

Le véritable Ane sauvage se rencontre dans les semi-déserts arides de l'Afrique. Ses grandes « oreilles d'âne », ses sabots très étroits et son braiment sont typiques. L'âne sauvage est de la même taille que l'âne domestique de l'Egypte et du Moyen-Orient, qui descend de lui, mais qui est plus svelte et dont le pelage est plus rougeâtre. Il y a trois sous-espèces d'ânes sauvages. Celui qui est figuré ici est l'âne sauvage de la Somalie.

Les ânes sauvages sont devenus rares. Il existe probablement encore quelques ânes sauvages de la Somalie en Abyssinie.

Ces animaux sont intelligents et rapides. Ils vivent par petites troupes, le plus souvent sous la conduite d'un animal âgé.

180. BURCHELL-ZEBRA

Equus quagga burchelli

Kenmerkend voor de zebra's is hun prachtig huidpatroon met de sierlijke strepen. Deze dieren zijn soms zeer gevaarlijk, en staan bekend als « tijgerpaarden ». Ze kunnen bijten en lelijk te keer gaan met hun zeer harde hoeven. Ze zijn in staat een leeuw de schedel in te slaan.

In Afrika komen drie typische vormgroepen van zebra's voor: de Grévy-zebra (n° 181), de bergzebra (n° 182) en de steppe-zebra's of quagga's. De Burchell-zebra behoort tot deze laatste groep.

Het opvallende kleurpatroon der zebra's kan op de steppen en vooral in het « bush » als camouflage werken. Bij de steppe-zebra's zien we een vermindering van het aantal strepen. Hoe zuidelijker de zebra's leven des te sterker merkt men dat bepaalde strepen aan de poten verdwijnen en strepen aan de flanken waziger worden of wegvallen.

De Burchell-zebra komt voor in het stroomgebied van de Oranje-rivier. Hij is waarschijnlijk al uitgeroeid.



180. — Burchell-zebra - Zèbre de Burchell

180. ZEBRE DE BURCHELL

Equus quagga burchelli

Un caractère des zèbres est le dessin magnifique de leur pelage aux jolies zébrures. Ils peuvent devenir très dangereux et on les appelle parfois les « chevaux-tigres ». Ils sont capables de mordre et de frapper sauvagement avec leurs sabots extrêmement durs. Ils peuvent très facilement enfoncer le crâne d'un lion.

En Afrique, on distingue trois formes typiques de zèbres: le zèbre de Grévy (n° 181), le zèbre des montagnes (n° 182) et les zèbres des steppes ou quaggas. Le Zèbre de Burchell appartient à ce dernier groupe.

Les rayures très apparentes du pelage des zèbres leur sert de camouflage dans les steppes et dans le « bush ». Chez les zèbres des steppes, il se remarque une diminution du nombre des zébrures. Chez ceux qui vivent dans les régions les plus méridionales, on constate même la disparition de certaines rayures aux pattes, tandis que celles aux flancs deviennent plus indistinctes ou ont disparu.

Le zèbre de Burchell se rencontre dans les steppes du bassin de la rivière Orange. Il est probablement déjà exterminé.

181. GREVY-ZEBRA

Equus grevyi

De Grévy-zebra komt voor in de bush-steppen van Ethiopië, Galla- en Somaliland tot in Kenya. Hij is waarschijnlijk het « tijgerpaard » dat de Oude Romeinen in hun arena's lieten optreden. Hij valt op door zijn grote gestalte, en is niet veel kleiner dan een paard. Opvallend zijn ook zijn grote « ezelsoren », zijn brede paardenhoeven, en kleine hoornplekken aan de binnenzijde van de middenhand.

Zijn huidpatroon vertoont dicht opeenstaande, bijna evenwijdig lopende, smalle zwartbruine strepen op een zilverwitte ondergrond. Om de poten zien we ringen. Het achterste is schoon getekend en vormt een mooie « spiegel ».

De Grévy-zebra is de zebra die het meest noordelijk leeft.


181. ZEBRE DE GREVY

Equus grevyi

Le Zèbre de Grévy se rencontre dans les steppes boisées de l'Abyssinie, du pays des Galla, de la Somalie, jusqu'au Kenya. Il s'agit probablement du « cheval-tigre » que les anciens Romains faisaient évoluer dans leurs arènes. Il se distingue par sa grande taille, qui ne diffère pas beaucoup de celle du cheval. Il se fait également remarquer par ses grandes « oreilles d'âne », ses larges sabots de cheval et de petites plaques cornées à l'intérieur du métacarpe.

Le dessin très serré, presque parallèle, des rayures de son pelage se compose de stries minces brun-noir, sur fond blanc-argenté. Autour des pattes se remarquent des anneaux. La croupe est joliment dessinée et forme un beau « miroir ».

Le zèbre de Grévy est celui qui vit le plus au nord.



181. — Grévy-zebra - Zèbre de Grévy


182. BERGZEBRA

Equus zebra

In het zuiden van Afrika leeft de Bergzebra. Op het eerste zicht is hij te herkennen aan zijn typisch « rooster » van korte, evenwijdige dwarsbanden op de achtersrug. Hij draagt ook een kleine kwab aan de hals. Hij staat lager op de poten dan de steppe-zebra en zeker lager dan de hoogpotige Grévy-zebra. De hoornplekken aan de binnenzijde van de voorhand zijn heel wat groter dan bij de steppe- en Grévy-zebra.

De bergzebra is ook een veel beter draver dan de twee vorige (n° 180 en 181). Hierop wijzen reeds volgende kenmerken: zijn romp, hoewel stevig en gedrongen, is toch langer gerek; de schouders zijn lager ingeplant en het kruis is breder dan bij de overige zebra's. De bergzebra kan zijn neusgaten ook verder opensperren en zal dus minder vlug buiten adem zijn.

De bergzebra heeft een donker voorkomen. De strepen zijn breed en diepzwart op een geelachtige ondergrond. Het lijkt eerder of het dier zwart is, met dunne witte strepen.



L.H.

182. — Bergzebra - Zèbre des montagnes

182. ZEBRE DES MONTAGNES

Equus zebra

Le Zèbre des montagnes vit en Afrique méridionale. A première vue on le reconnaît à sa « grille » typique de courtes bandes transversales, parallèles sur la croupe. Au cou il porte également un petit pendeloque (fanon). Il est plus bas sur pattes que le zèbre des steppes et certainement plus bas que le zèbre de Grévy, haut monté. Les plaques cornées à l'intérieur du métacarpe sont bien plus grandes que chez ces derniers.

Le zèbre des montagnes est également meilleur trotteur que les deux précédents (n° 180 et 181). Cela se voit aux caractéristiques suivantes: le tronc, bien que solidement bâti et trapu, est plus allongé; l'implantation des épaules est plus basse et la croupe est plus large que chez les autres zèbres. Les narines du zèbre des montagnes peuvent être écartées plus largement et il sera donc moins vite hors d'haleine.

Le zèbre des montagnes est d'apparence foncée. Les rayures sont larges et très noires sur fond jaunâtre. On dirait plutôt que l'animal est noir, avec de minces stries blanches.

183. SJABRAKTAPIR

Tapirus indicus

De Sjabraktapir of Maleise Tapir valt op door zijn vachtkleur: een zwart lichaam waarrond een wit laken schijnt geslagen. Volgens waarnemers zou deze eigenaardige tekening het dier een goede bescherming bieden in zijn eigen milieu.

De sjabraktapir leeft op het schiereiland Malakka en op het eiland Sumatra. Hij is een nachtdier en leeft hoofdzakelijk van bladeren. Hij is een uitstekend zwemmer. Over 't algemeen is hij goedaardig, maar wanneer hij bedreigd wordt, kan hij zeer agressief zijn.

Met zijn levendige tekening van overlangse strepen en vlekken, doet de jonge tapir denken aan een jong wild zwijntje.



L.H.

183. — Sjabraktapir - Tapir malais

183. TAPIR MALAIS

Tapirus indicus

Le Tapir malais se distingue par la couleur de son pelage: un corps noir qui serait recouvert d'un drap blanc. D'après certains observateurs, ce dessin original procurerait à l'animal une bonne protection dans son milieu naturel. Le tapir malais vit sur la péninsule malaise et sur l'île de Sumatra. C'est un animal nocturne dont la nourriture principale consiste en feuilles. C'est un excellent nageur. En général c'est un animal au caractère doux, mais lorsqu'il se sent menacé il peut devenir très agressif.

Le jeune tapir fait penser à un marcassin, avec ses dessins de couleur vive, de rayures transversales et de taches.

184. ZUIDAMERIKAANSE TAPIR

Tapirus terrestris

De Zuidamerikaanse Tapir komt voor in geheel Zuid-Amerika tot Paraguay en Noord-Argentinië. Hij leeft in het oerwoud, op verlaten plantages en langs de rand van de savannen, bij voorkeur in de omgeving van water. Hij komt ook voor in de bergwouden.

Deze tapir is klein, nauwelijks één meter hoog. Kenmerkend zijn zijn rechtopstaande nekmanen. De meest algemene kleur van de haarvacht is éékleurig donkerbruin.

Niettegenstaande vervolging, komt deze tapir nog vrij algemeen voor in vele gebieden. Zijn ergste vijanden zijn de jagoeer, de poema en de mens.



184. — Zuid-amerikaanse tapir - Tapir sud-américain

184. TAPIR SUD-AMERICAIN

Tapirus terrestris

Le Tapir sud-américain se rencontre dans toute l'Amérique du Sud, jusqu'au Paraguay et l'Argentine du Nord. Il vit dans la forêt vierge, dans des plantations désertes et au bord des savanes, de préférence aux environs de l'eau. Il se rencontre également dans les forêts des montagnes.

Le tapir sud-américain est petit, et atteint à peine la hauteur d'un mètre. Sa crinière dressée est typique. Généralement la couleur du pelage est d'un brun foncé uniforme.

Ce tapir est encore relativement commun dans plusieurs régions malgré la chasse que l'on lui fait. Ses pires ennemis sont le jaguar, le puma et l'homme.

185. BERGTAPIR

Tapirus pinchacus

De Bergtapir is eveneens een kleine soort. Hij leeft in bepaalde bosgebieden van de hoge Andes. Hij is slanker en heeft langere poten dan zijn familieleden. De slurfsnuit is eveneens langer. De zachte, dikke haarvacht is zwart en elk haar is afzonderlijk gedraaid. Enkele typische kenmerken zijn nog : de lichtgekleurde wangen, de witte lippen en de witgerande oren. Zijn staart is langer dan die van de andere soorten.


De bergtapir komt voor in bergwouden tot op zeer grote hoogten. Hij werd zelfs aangetroffen op een hoogte van 4.500 m, waar de temperatuur daalt tot 4° of 5° C onder nul.

185. TAPIR PINCHAQUE


Tapirus pinchacus

Ce tapir des montagnes est également de petite taille. Il vit dans certaines régions boisées des Hautes Andes. Il est plus svelte et a les pattes plus longues que ses congénères. Le museau en trompe est également plus long. Le pelage doux et touffu est noir et chaque poil est tordu séparément. Citons encore quelques caractéristiques typiques : les joues de coloration claire, les lèvres blanches et les oreilles bordées de blanc. Sa queue est plus longue que chez les autres espèces.

Le tapir pinchaque se rencontre dans les forêts des montagnes jusqu'à de très hautes altitudes. Il a même été rencontré à une hauteur de 4.500 m, où la température descend à 4° ou 5° sous zéro.



185. — Bergtapir - Tapir pinchaque



186. — Witte Neushoorn - Rhinocéros blanc

186. RHINOCEROS BLANC

Ceratotherium simum

Le Rhinocéros Blanc peut atteindre une longueur de 4 m et un poids de 2.000 kg. Ce grand animal peut cependant se mouvoir avec agilité et atteindre une vitesse de 40 km à l'heure. Au Zoo d'Anvers on peut admirer un couple de rhinocéros blancs. On remarquera qu'ils ne sont pas blancs mais gris ardoisés. La lèvre supérieure est très large et elle est utilisée pour arracher l'herbe dont il se nourrit. Le rhinocéros blanc est aussi appelé : rhinocéros à lèvres larges.


Grâce aux mesures de protection très sévères qui ont été prises à leur égard, environ 3.000 de ces animaux vivent en liberté en Afrique Centrale et du Sud-est et l'on en trouve encore environ 200 exemplaires dans des parcs nationaux.

187. ZWARTE NEUSHOORN

Diceros bicornis

De Zwarte Neushoorn is de enige soort die nog niet met uitsterven bedreigd is. Hij is ongeveer zo groot als de pantserneushoorn (n° 188). De kleur is eigenlijk niet zwart, maar donkergrijs. Met de puntige en krachtige bovenlip grijpt hij bebladerde takken om er zich mee te voeden. De zwarte neushoorn, ook puntlipneushoorn genoemd, leeft in de steppen en open struiklandschappen van Centraal- en Oost-Afrika, van de Niger tot Ethiopië, Somalië en Zuid-Afrika.

De voorste van de twee horens kan een lengte van 80 cm bereiken en is omgebogen. In dierentuinen is deze horen gewoonlijk niet zo lang, daar het dier ermee schuurt tegen muren en hekwerk.



187. — Zwarte Neushoorn - Rhinocéros noir

186. WITTE NEUSHOORN

Ceratotherium simum

De Witte Neushoorn kan een lengte bereiken van 4 m en een gewicht van 2.000 kg. Dit grote dier beweegt zich nochtans soepel en kan een snelheid ontwikkelen van 40 km/h. In de Antwerpse dierentuin zijn een koppel neushoorns te bewonderen. We kunnen daar dan ook zien dat ze niet wit zijn maar leigrauw. De bovenlip is zeer breed en wordt gebruikt om gras af te rukken. De witte neushoorn wordt ook wel breedlipneushoorn genoemd.

Dank zij de strenge beschermingsmaatregelen leven er nog wel een 3.000 van deze dieren in vrijheid in Centraal- en Zuid-Oost-Afrika, en nog een paar honderd exemplaren in nationale parken.

187. RHINOCEROS NOIR

Diceros bicornis

Le Rhinocéros noir est la seule espèce qui n'est pas encore menacée d'extermination. Il a environ la même taille que le rhinocéros indien (n° 188). En fait, la coloration n'est pas noire mais gris foncée. Avec la lèvre supérieure, pointue et forte il saisit des branches feuillues pour s'en nourrir. Le rhinocéros noir, encore appelé rhinocéros à lèvres pointues, vit dans les steppes et les paysages broussailleux ouverts de l'Afrique Centrale et de l'Est depuis le Niger jusqu'en Abyssinie, la Somalie et l'Afrique du Sud.

La corne antérieure peut atteindre une longueur de 80 cm et est recourbée. Dans les jardins zoologiques cette corne n'est généralement pas aussi longue car l'animal la frotte constamment contre les murs et les grillages.

188. PANTSERNEUSHOORN

Rhinoceros unicornis

De Pantserneushoorn dankt zijn naam aan de huidplooien bij hals, heupen en poten, die de huid als het ware in schilden verdelen en de indruk wekken dat het dier omhuld is door een pantser. Deze neushoorn heeft slechts één horen, die tot 60 cm lang kan worden. Het dier zelf wordt tot 3,50 m lang.

De pantserneushoorn is een zeldzaam dier. Een paar honderd exemplaren leven nog in de bergwouden van Assam, Bhootan en Nepal.

Het dier werd veel achtervolgd, vooral omdat de Chinezen duur betaalden voor zijn hoorn, die als een wondergeneesmiddel werd aangezien.



L.H.

188. — Pantserneushoorn - Rhinocéros indien

188. RHINOCEROS INDIEN

Rhinoceros unicornis

Aux replis cutanés au cou, aux hanches et aux pattes qui divisent la peau en de véritables boucliers, et qui créent l'impression que l'animal est revêtu d'une cuirasse, le Rhinocéros indien doit son autre nom : rhinocéros cuirassé. Ce rhinocéros n'a qu'une seule corne qui peut atteindre une longueur de 60 cm environ. L'animal lui-même atteint parfois une longueur de 3,50 m.

Le rhinocéros à cuirasse est un animal rare et environ 200 exemplaires vivent encore dans les forêts des montagnes de l'Assam, du Bhoutan et du Népal.

L'animal a surtout été pourchassé parce que les Chinois payaient de fortes sommes pour ses cornes qui étaient considérées comme un remède merveilleux.

189. JAVAANSE NEUSHOORN

Rhinoceros sondaicus


Zoals de pantserneushoorn (n° 188), draagt de Javaanse Neushoorn ook één hoorn op de neus. Deze hoorn wordt slechts 25 cm lang. De Javaanse neushoorn lijkt op de vorige, maar is er als het ware een verkleinde uitgave van. Het is een zeer zeldzaam dier, dat nog voorkomt in een natuurreservaat in het uiterste Westen van Java.

De huidplooien liggen bij deze soort als delen van een mozaïek naast elkaar. De platen geven, vooral op de poten, de indruk van schubben. Vandaar dat soms ook de naam schubbenneushoorn wordt gebruikt.

189. RHINOCEROS DE LA SONDE


Rhinoceros sondaicus

Tout comme le rhinocéros indien (n° 188), le Rhinocéros de la Sonde porte une seule corne au dessus du nez. Cette corne n'atteint qu'une longueur de 25 cm. Le rhinocéros de la Sonde ressemble au précédent mais n'en constitue pour ainsi dire, qu'une édition réduite. C'est un animal extrêmement rare, qui ne se rencontre plus que dans une réserve naturelle de l'extrême ouest de Java. Chez ces animaux les replis de la peau sont disposés côte à côte comme les pièces d'une mosaïque. Les plaques, surtout sur les pattes, donnent l'impression d'être des écailles, raison pour laquelle on lui donne parfois le nom de Rhinocéros squameux.



L.H.

189. — Javaanse Neushoorn - Rhinocéros de la Sonde



190. — Sumatraanse Neushoorn - Rhinocéros de Sumatra

190. SUMATRAANSE NEUSHOORN

Dicerorhinus

De Sumatraanse Neushoorn draagt twee horens op de neus. Met zijn hoogte van 1,3 m is hij wel de kleinste neushoorn. Buiten Sumatra bewoont hij ook nog Borneo, Malakka, Birma en Assam. Hij komt vooral voor in de bergbossen. De huidplooien zijn weinig ontwikkeld; de kleur gaat van donkerbruin tot zwart. De Sumatraanse neushoorn werd sterk vervolgd. Dit tengevolge van het chinees bijgeloof (zie n°188), winstbejag en gebrek aan begrip. Het dier is daardoor zeer zeldzaam geworden.

190. RHINOCEROS DE SUMATRA

Dicerorhinus

Le Rhinocéros de Sumatra a deux cornes sur le dessus du nez. Avec sa hauteur de 1,30 m, il est certainement le plus petit des rhinocéros. En dehors de Sumatra il habite encore Bornéo, la Malaisie, la Birmanie et l'Assam. Il se rencontre principalement dans les forêts des montagnes. Les replis cutanés sont fort peu développés, la couleur va du brun foncé au noir.

Le rhinocéros de Sumatra a été fortement pourchassé, à la suite de la superstition chinoise (voir n° 188), de l'esprit de lucre et du manque de compréhension. Pour ces raisons l'animal est devenu très rare.

191. RIVIERZWIJN

Potamochoerus

Het Rivierzwijn dankt zijn naam aan het feit dat het dier een voorkeur heeft voor rivieroeveren. Het leeft in de beboste gebieden van Afrika. Het is eerder klein en loopt op lage poten. Zijn kop is in verhouding groot. De lange oren zijn versierd met een penseelvormig haarbosje (vandaar ook de naam penseelzwijn).

De rivierzwijnen zijn zeer levendig gekleurd. Ze woelen de grond steeds om, op zoek naar wortels, insecten, slakken, giftslangen, enz. Het wijfje brengt per worp ten hoogste twee jongen ter wereld. Ze brengt dus veel minder jongen groot dan onze Europese soorten.



191. — Rivierzwijn - Potamochère ou Sanglier des rivières

191. POTAMOCHÈRE ou SANGLIER DES RIVIERES

Potamochoerus

Le Potamochère ou Sanglier des rivières doit son nom au fait que l'animal montre une prédilection pour les bords des rivières. Il vit dans les régions boisées de l'Afrique. Il est plutôt petit et bas sur pattes. Proportionnellement sa tête est grande. Les longues oreilles sont ornées de touffes de poils en forme de pinceau (d'où également le nom de cochon à pinceaux).

Les potamochères sont très vivement colorés. Constamment ils fouillent le sol, à la recherche de racines, d'insectes, de limaces, de serpents vénimeux, etc...

Par portée la femelle met au monde tout au plus deux petits. Elle élève donc beaucoup moins de petits que nos espèces européennes.

192. REUZENWOUEVERZWIJN

Hylochoerus meinertzhageni

Het Reuzenwoudeverzwijn is de grootste vertegenwoordiger van de varkensachtigen in Kongo. Het werd pas ontdekt in 1904 door de Britse officier Meinertzhagen.

Dit dier leeft in familieverband. Het woelt de grond niet om, maar leeft van oerwoudplanten. Het reuzenwoudeverzwijn komt voor van Liberia tot in Tanganyika. Opvallend zijn de grote kop en de lage poten. Het borstelhaar is spaarszaam verdeeld en is zwart gekleurd. De biggen zijn eerst bruinachtig, maar na drie maanden worden ze zwart.



192. — Reuzenwoudeverzwijn - Hylochère ou Sanglier géant de forêt

192. HYLOCHERE ou SANGLIER GEANT DE FORET

Hylochoerus meinertzhageni

L'Hylochère est le plus grand représentant des suidés au Congo. Il n'a été découvert qu'en 1904 par l'officier britannique Meinertzhagen. Cet animal vit par familles. Il ne fouille pas le sol, mais se nourrit des plantes de la forêt vierge. Le Sanglier géant de forêt se rencontre du Libéria jusqu'au Tanganyika. Sa grosse tête et ses courtes pattes sont caractéristiques. Les soies sont distribuées parcimonieusement et sont de coloration noire. Au début les petits sont brunâtres, mais au bout de trois mois ils sont devenus noirs.

193. KNOBBELZWIJN of MANENZWIJN

Phacochoeros aethiopicus

Het Knobbelzwijn of Manenzwijn bewoont Afrika ten zuiden van de Sahara. Het is een steppendier, dat per paar huist in holen in de grond. Het dier graaft met zijn grote, kromme hoektanden van de bovenkaak, voren in de grond om zo zijn voedsel te zoeken: wortels en knollen. Het gedierte dat op die wijze te voorschijn komt, wordt ook opgegeten.

Op het aangezicht zijn twee paar wratten zichtbaar, een paar grote en een paar kleine. Onder de ogen zit een plooi: de traanzak. De huid is dun behaard, maar over de rug lopen manen van dikke, zwarte haren, die tot bijna aan de buik afhangen. De staart eindigt in een grote kwast.

193. PHACOCHERE ou SANGLIER DE SAVANE

Phacochoeros aethiopicus

Le Phacochère ou Sanglier de savane habite l'Afrique au sud du Sahara. C'est un animal des steppes qui habite, par couples, des terriers souterrains. Il remue la terre à l'aide des longues canines recourbées de sa mâchoire supérieure, traçant des sillons dans le sol à la recherche de sa nourriture: des bulbes et des racines. Les bêtes qu'il déterre ainsi sont également dévorées. Sur la face se remarquent deux paires de verrues, une paire de grandes et une paire de petites. Au dessous des yeux est situé un repli de la peau: le sac lacrymal ou larmier. Les poils sont clairsemés mais sur le dos il y a une crinière de grosses soies noires qui retombent presque jusqu'au ventre. La queue se termine sur une grosse houppe.



193. — Knobbelzwijn of Manenzwijn - Phacochère ou Sanglier de savane



194. — Pekari - Pécari à collier

194. PEKARI

Tayassu tajacu

In plaats van de echte zwijnen van de Oude Wereld, worden in Amerika de navelzwijnen of Pekari's aangetroffen. Ze worden gekenmerkt door hun geringe grootte, kortere snuit, de hoektanden van de bovenkaak die naar beneden gericht staan, de kleinere staart, de samengestelde maag en de navelvormige klier op het achterste deel van de rug. Aan deze klier danken ze hun naam. Wanneer het dier schrikt, scheidt genoemde klier een naar muskus riekende vloeistof af.

De afbeelding toont de Halsbandpekari. Dit dier komt voor van het zuidwesten van de Verenigde Staten tot in Patagonië en op Trinidad. In elk landschap voelt het dier zich thuis: moerassen, bossen, woestijnen, enz.

194. PECARI A COLLIER

Tayassu tajacu

Au lieu des porcs proprement dits de l'Ancien Monde, on trouve en Amérique les « porcs à nombril » ou pécari's. Ils s'en distinguent par leur taille médiocre, un museau plus court, les canines de la lèvre supérieure dirigées vers le bas, une queue plus courte, un estomac compartimenté et la glande en forme de nombril sur l'arrière-train. C'est à cette glande qu'ils doivent un de leurs noms communs. Lorsque l'animal est effrayé, cette glande répand une sécrétion à odeur musquée.

La figure représente un Pécari à collier. Cet animal se rencontre depuis le Sud-Ouest des Etats-Unis jusqu'en Patagonie et à Trinidad. Il se sent chez lui dans n'importe quel paysage: marais, bois, déserts, etc.


195. NIJLPAARD

Hippopotamus amphibius

Het Nijlpaard brengt het grootste deel van de tijd door in het water van rivieren en meren. Zijn neusgaten, ogen en oren zijn in eenzelfde vlak geschikt en kunnen boven water uitkomen wanneer het ganse lichaam onder water is. De grote hoektanden groeien steeds door, vooral deze van de onderkaak, die door de bovenkaakhoektanden voortdurend geslepen worden. Het ivoor van deze tanden is zeer hard en wordt ondermeer gebruikt voor het vervaardigen van pianoetoetsen.

Heden leeft het nijlpaard niet meer aan de benedenloop van de Nijl. Men vindt het dier nog in groot aantal doorheen gans Afrika ten noorden van Oranje-Vrijstaat.

Het nijlpaard eet vooral gras en waterplanten. Het is een rustig dier, behalve wanneer het bedreigd wordt of zijn jongen in gevaar zijn.



195. — Nijlpaard - Hippopotame

195. HIPPOPOTAME

Hippopotamus amphibius

L'Hippopotame passe la plus grande partie de sa vie dans l'eau des rivières et des lacs. Ses narines, ses yeux et ses oreilles sont disposées dans le même plan et apparaissent seuls au dessus de la surface de l'eau lorsque le corps est immergé.

Les grandes canines croissent continuellement, surtout celles de la mâchoire inférieure, qui sont constamment aiguisées par frottement contre celles de la mâchoire supérieure. L'ivoire de ces dents est très dur et est, entre autres, utilisé à la fabrication des touches de piano.

Actuellement l'hippopotame n'habite plus le cours inférieur du Nil. L'animal se rencontre encore en grand nombre à travers toute l'Afrique au nord de l'Etat libre d'Orange. La nourriture principale de l'hippopotame est constituée d'herbes et de plantes aquatiques. C'est un animal doux et inoffensif sauf lorsque lui ou ses petits se trouvent menacés.

196. KAMEEL

Camelus bactrianus

De Kameel wordt als lastdier gebruikt in geheel het Aziatisch continent. De twee bulten op de rug zijn bijzondere huidplooien, gevuld met onderhuids bindweefsel. Bij de geboorte hangen ze als lege zakken aan de rug. Ook na een hongerperiode hangen de bulten slap.

Kamelen kunnen een week lang zonder een druppel water leven. Ze bewaren immers een waterreserve in de spieren en het bindweefsel (en niet in die bulten zoals vaak gemeend wordt). Ze voeden zich met takken en planten, die ze afrukken met de beweeglijke lippen.

In het wild leven ze in kleine of grotere kuddeën onder leiding van een hengst. De hengsten kunnen elkaar lelijke wonden toebrengen met de grote hoektanden. Dit gebeurt vooral bij het vechten om het leiderschap of in de bronsttijd. Ze trachten dan ook uit de pens opgerispt voedsel, in het aangezicht van de tegenstander te spuwen.

Na een draagtijd van meer dan een jaar wordt het jong geboren. Eeltkussens op poten en borst, beschermen de kameel tegen het hete zand. De neusgaten kunnen gesloten worden, en de ogen worden zuiver gehouden door een overvloedig afscheiden van traanvocht.



196. — Kameel - Chameau bactrien

196. CHAMEAU BACTRIEN

Camelus bactrianus

Le Chameau est utilisé comme bête de somme sur tout le continent asiatique. Les deux bosses sur le dos sont des replis de la peau, remplis de tissu conjonctif sous-cutané. Lors de la naissance ils traînent sur le dos comme des sacs vides. Après une longue période de disette ils pendent également. Les chameaux peuvent vivre une semaine sans prendre une goutte d'eau. Ils conservent en effet une réserve d'eau dans les muscles et dans les tissus conjonctifs (et non pas dans les bosses, bien que cette croyance soit répandue). Ils se nourrissent de branchettes et de plantes qu'ils arrachent avec les lèvres très mobiles.

À l'état sauvage ils vivent par troupeaux de petite ou de moyenne importance sous la conduite d'un étalon. Ceux-ci peuvent s'infliger mutuellement de vilaines blessures avec leurs longues canines. Cela se produit le plus souvent lors des combats pour la domination du troupeau ou à l'époque du rut. Ils essaient également à ce moment de cracher de la nourriture semi digérée, provenant de la panse, à la figure de leurs adversaires.

Après une portée de plus d'une année, le petit vient au monde. Le chameau est protégé contre le sable brûlant par des callosités sur les pattes et sur la poitrine. Les narines peuvent être obturées et les yeux sont tenus propres par une abondante sécrétion de liquide lacrymal.

197. DROMEDARIS


Camelus dromedarius

De Dromedaris is het klassieke lastdier in Noord-Afrika, Arabië en Voor-Azië. Het is een kameel met één bult. De vraag of de dromedaris en de kameel door de mens uit een enkele stamvorm zijn gefokt, ofwel dat zij uit twee afzonderlijke wilde vormen zijn gekweekt, is moeilijk te beantwoorden. Een ongeboren dromedaris heeft twee bulten, wat kan wijzen op een afstamming van de kameel. Kamelen en dromedarissen zijn gemakkelijk te kruisen, en hun nakomelingen zijn ook vruchtbaar. De dromedaris is in het wild onbekend. In de woestijnen van Noord-Afrika leven wel verwilderde vormen. De eigenschappen aangehaald voor de kameel (n° 196) gelden ook voor de dromedaris.


197. DROMADAIRE

Camelus dromedarius

Le Dromadaire est la bête de somme par excellence en Afrique du Nord, en Arabie et en Asie Mineure. C'est le chameau à une bosse. Il est difficile à savoir si le dromadaire ou le chameau ont été élevés par l'homme à partir d'une souche commune, ou s'ils sont issus de deux formes sauvages distinctes. Avant sa naissance un dromadaire a deux bosses, ce qui démontrerait sa descendance du chameau. Les chameaux et les dromadaires se croisent facilement et leurs descendants sont fertiles. Le dromadaire est inconnu à l'état sauvage, bien que dans les déserts de l'Afrique du Nord il existe des formes redevenues sauvages. Les caractéristiques cités pour le chameau (n° 196) s'appliquent également au dromadaire.



197. — Dromedaris - Dromadaire



198. — Goeanaco - Huanaco

198. GOEANACO

Lama huanachus

Lama's zijn eigenlijk niets anders dan kleine, bultloze, steppe- en hooggebergte-kamelen.

De Goeanaco is een lama, zo groot als een hert. De kleur is roodbruin. Dit dier komt voor in open landschappen van Zuid-Amerika, vanaf de steenvlakten van de Cordilleras op 4.500 m hoogte tot op de hooggelegen steppen van Patagonië. De goeanaco's leven in kleine groepen van wijfjes die door een mannetje aangevoerd en bewaakt worden. In de zomer klauteren ze, zoals gemsen, tot aan de sneeuwgrens, en in de winter komen ze terug naar de dalen.

198. HUANACO

Lama huanachus

En fait les lamas ne sont rien d'autre que des petits chameaux sans bosses. On les retrouve dans les steppes et les hautes montagnes.

Le Huanaco est un lama de la taille d'un cerf. La coloration est rouge-brune. Cet animal vit dans les régions découvertes de l'Amérique du Sud, depuis les plaines pierreuses des Cordillères à 4.500 m d'altitude jusqu'aux hautes steppes de la Patagonie.

Les huanacos vivent par petits troupeaux de femelles, sous la conduite et la garde d'un mâle. En été ils grimpent, comme des chamois jusqu'à la limite des neiges et en hiver ils descendent vers les vallées.

199. LAMA

Lama glama

De Inca's van Zuid-Amerika fokten uit de goeanaco's (n° 198) de Lama's. Deze oude cultuurvolken gebruikten de lama's als lastdieren. Ook het vlees en de wol werden gewaardeerd.

De lama's zijn groter dan hun wilde stamvaders. Allerlei kleurschakeringen komen voor, van bruinrood tot zwart en wit, veelal bont. Ook de lama's spuwen (zoals de kamelen), wanneer ze kwaad zijn, uit de pens opgerispt voedsel. Ze doen dit eveneens in de dierentuin, om hun afkeer tot uiting te brengen. Aangenaam is het zeker niet wanneer men als toeschouwer door zulke kwalijk riekende straal wordt getroffen.

In het bergland van Peru en Bolivië worden de lama's als schapen « geweid »; alleen het mannetje wordt als lastdier gebruikt.



199. — Lama - Lama

199. LAMA

Lama glama

Les Incas, de l'Amérique du Sud, ont élevé les Lamas à partir des huanacos (n° 198).

Les peuples de cette ancienne civilisation employaient les lamas comme bêtes de somme. Ils appréciaient également la chair et la laine. Les lamas sont plus grands que leurs ancêtres sauvages. Toutes sortes de variétés de coloration se présentent; du brun-rouge au noir et au blanc, le plus souvent du pie. Les lamas, ainsi que les chameaux, crachent de la nourriture semi digérée, en provenance de la panse, lorsqu'ils sont de mauvaise humeur. Ils le font même dans les jardins zoologiques pour montrer leur antipathie. Ce n'est pas du tout agréable d'être touché, comme spectateur, par ce jet malodorant. Dans les montagnes du Pérou et de la Bolivie, les lamas sont mis au « pâturage », comme des moutons. Seuls les mâles sont utilisés comme bêtes de somme.

200. ALPACA

Lama pacos

De Alpaca is een huisdier. Hij stamt waarschijnlijk af van de vicoenja (n° 201). Goeanaco's, lama's, vicoenja's en alpaca's kan men met goed gevolg onder elkaar kruisen.

De alpaca's worden gewaardeerd om hun enorme hoeveelheid schone bruine of zwarte wol. Men gebruikt ze niet als lastdieren. Ze worden alleen verzameld om geschoren te worden. De Inca's maakten kostbare tapijten en dekens van deze wol.

De alpaca's leven halfwild in grote kuddes. Bij gevaar hinniken ze. Hun aartsvijand is, zoals voor alle lama-soorten de poema.



200. — Alpaca - Alpaca

200. ALPACA

Lama pacos

L'Alpaca est un animal domestique. Il descend probablement de la vigogne (n° 201). Les huanacos, lamas, vigognes et alpacas se croisent facilement entre eux.

L'alpaca est apprécié pour l'énorme quantité de belle laine brune ou noire qu'il fournit. Ils ne sont pas utilisés comme bêtes de somme. On les rassemble uniquement pour la tonte. Les Incas confectionnaient des tapis et des couvertures magnifiques avec cette laine.

Les alpacas vivent en état de semi domestication par de grands troupeaux. En cas de danger ils hennissent. Leur ennemi, comme pour toutes les espèces de lamas, est le puma.

201. VICOENJA

Lama vicugna

De Vicoenja is sierlijker en tengerder dan de goeanaco (n° 198). Hij levert zeer fijne wol. Bij de Inca's mochten alleen koningen en hun familie, klederen en dekens van deze fijne wol gebruiken.

Dit dier leeft in de hooggelegen steppen van de Andes, van Zuid-Ecuador tot Peru en Bolivia.

Vicoenja-troepen bestaan gewoonlijk uit een dozijn wijfjes en een mannetje. Gedurende de dag grazen deze dieren, alleen 's nachts leggen ze zich neer om te herkauwen.

201. VIGOGNE

Lama vicugna

La Vigogne est plus gracieuse et plus svelte que le huanaco (n° 198). Il fournit une laine très fine. Chez les Incas, seuls les rois et leurs familles étaient autorisés à porter des vêtements et à posséder des couvertures faites de celle-ci.

Cet animal vit dans les hautes steppes des Andes, depuis l'Equateur méridional jusqu'au Pérou et la Bolivie.

Les troupeaux de vigognes se composent habituellement d'une douzaine de femelles et d'un mâle. Pendant la journée les animaux broutent, ce n'est que pendant la nuit qu'ils se couchent pour ruminer.



201. — Vicoenja - Vigogne



202. — Watermuskusdier - Chevrotain aquatique

202. WATERMUSKUSDIER

Hyomoschus

Van het Afrikaans Watermuskusdier of Dwerghertje zijn drie vormen bekend. Een vorm komt voor in West-Afrika, een tweede vorm in Kameroen en een derde in het Kongobekken.

De pels is op de rug donkerbruin tot zwartbruin met vlekken en strepen. De onderzijde is wit en de keel vertoont eveneens witte strepen. Het watermuskusdier leeft bij voorkeur in donkere bossen, vooral in de omgeving van rivieren en meren. Het dier voedt zich met planten en afgevallen vruchten. Het leidt een verborgen leven. Overdag rust het in kuilen en bij gevaar zoekt het dier het water op. Het is een zeer goede zwemmer, niet alleen aan de oppervlakte, maar ook onder water.

202. CHEVROTAIN AQUATIQUE

Hyomoschus

Trois formes de Chevrotains aquatiques ou de Cerfs nains de l'Afrique sont connues. Une de ces formes se rencontre en Afrique occidentale, une seconde au Caméroutn et une troisième dans le bassin du Congo.

Le pelage du dos est brun foncé à brun noir avec des taches et des rayures. Le dessous est blanc et à la gorge se remarquent également des lignes blanches. Le chevrotain aquatique se tient de préférence dans les forêts impénétrables, surtout à proximité des cours d'eau et des lacs. L'animal se nourrit de plantes et de fruits tombés. Il mène une vie cachée. Pendant la journée il gîte dans des creux et en cas de danger l'animal recherche l'eau. C'est un excellent nageur, pas seulement en surface, mais aussi sous l'eau.

203. MUSKUSDIER

Moschus

Het Muskusdier draagt geen gewei maar lange hoektanden, die bij het mannetje tot 5-7 cm uit de bek steken. Bij het gevecht om de wijfjes gebruiken ze deze hoektanden als wapens. Het muskusdier leeft in de bossen van de Noordelijke Himalaya. Het leeft meestal alleen, soms bij paren. Het is een zeer goede klimmer.

De pels bestaat uit lange, harde, dikke en kroezige haren, zeer donkerbruin op de rug, vuilwit aan de buikzijde. De rug is dikwijls gestippeld. Het mannetje heeft op de buik een klier, die in de bronsttijd een sterk riekende stof voortbrengt. Deze muskusstof wordt als grondstof in de parfumindustrie gebruikt. Wegens deze stof wordt het dier gejaagd. De jongen zijn bontgevekt.



203. — Muskusdier - Porte-musc

203. PORTE-MUSC

Moschus

Le Porte-musc ne porte pas des bois mais possède de longues canines (défenses), qui, chez le mâle peuvent dépasser la bouche de 5 à 7 cm. Lors des combats pour la possession des femelles, ces canines leur servent d'armes. Le porte-musc vit dans les bois de l'Himalaya septentrional. Le plus souvent il vit seul, parfois par couples. C'est un excellent grimpeur.

Le pelage se compose de poils longs et gros, durs et frisés, brun très foncé sur le dos, blancs-sales sur le ventre. Le dos est souvent tacheté. Au ventre le mâle possède une glande qui, à l'époque du rut, sécrète une substance à odeur très pénétrante. Ce musc est utilisé en parfumerie, comme matière première. C'est pour se procurer cette substance, que l'on fait la chasse à ces animaux. Le pelage des jeunes est bigarré.

204. MUNTJAK

Muntiacus

Het vaderland van Muntjakherten is Oost- en Zuidoost-Azië. Ze hebben wel een gewei, maar de grote hoektanden, die door de lippen steken, worden door het mannetje bij het vechten méér gebruikt dan het gewei. Het gewei vormt vooraan op de kop verdikkingen, een kenmerk dat de muntjak onderscheidt van alle andere herten.

De muntjak is een wouddier, dat dikwijls woont op de beboste hellingen van de bergen. Dit dier leeft in paren, vaak vergezeld van één of twee jongen, die meestal in juni of juli ter wereld komen.



204 — Muntjak - Muntjak

204. MUNTJAC

Muntiacus

La patrie des Muntjacs est l'Extrême-Orient et le sud-est de l'Asie. Lors des combats, bien qu'ils ont des bois, les mâles emploient plutôt leurs longues canines, qui dépassent les lèvres. Les bois ont des renflements sur le devant de la tête, caractéristique qui distingue les muntjacs de tous les autres cerfs.

Le muntjac est un animal de la forêt dont l'habitat se trouve souvent sur les flancs boisés des montagnes. Cet animal vit par couples, souvent accompagnés d'un ou de deux petits, qui le plus souvent viennent au monde en juin ou en juillet.

205. WAPITI

Cervus canadensis

De Wapiti is een hert uit Noord-Amerika. In de zomer leven de hinden, samen met de kalveren, in een groep bij elkaar, onder leiding van een ouder moederdier. De mannelijke wapiti's kunnen, zoals onze Europese herten, in de herfst verwoede gevechten aangaan om het bezit van een roedel hinden (zie album « Dieren van België »).

Het volwassen hert heeft een prachtig gewei, dat het mooist is bij de bokken van 12 tot 14 jaar. Enkele maanden na de paartijd wordt het gewei afgeworpen en in enige maanden ontwikkelen zich dan de nieuwe geweastangen.

De grootste herten komen voor in Noord-Amerika en Eurazië. Het zijn de Amerikaanse wapiti en de Altaï-wapiti. De Amerikaanse wapiti leeft nu nog in de Rocky Mountains. De wapiti's hebben reusachtige geweien, waarvan de stangen, langs de kromming gemeten, tot 1,65 m lang kunnen zijn.

205. WAPITI

Cervus canadensis

Le Wapiti est un cerf de l'Amérique du Nord. En été les biches vivent par troupeaux, en compagnie des faons, sous la conduite d'une femelle âgée. Les cerfs mâles se livrent, tout comme nos cerfs européens, à de violents combats pour la possession d'une harde de biches (voir album « Animaux de Belgique »).

Le cerf adulte possède des bois magnifiques. Les bois les plus beaux sont l'apanage des mâles de 12 à 14 ans. Quelques mois après la période de la parade, les bois tombent et des nouveaux se développent au bout de quelques mois.

Les cerfs les plus grands vivent en Amérique du Nord et en Eurasie. Ce sont le wapiti américain et le wapiti de l'Altaï. L'espèce américaine vit encore actuellement dans les Montagnes Rocheuses. Les wapitis ont des bois gigantesques dont les ramifications, mesurées le long des courbures, peuvent atteindre une longueur de 1,65 m.



205. — Wapiti - Wapiti



206. — Axishert - Cerf axis

206. AXISHERT

Axis axis

Het Axishert lijkt op ons damhart, maar het gewei is eenvoudiger en heeft ten hoogste zes enden (zijtakken). Dit hert leeft in Voor-Indië en op Ceylon, bij voorkeur in de omgeving van water. Het is niet schuw en houdt zich ook gedurende de dag in de omgeving van de mens op. Als dier van de tropen zijn bij dit hert de voortplanting en de geweiwisseling niet gebonden aan bepaalde seizoenen. Het is een prachtig wit gevlekt hert, dat zich goed in dierentuinen kan aanpassen.

206. CERF AXIS

Axis axis

Le Cerf axis ressemble à notre daim, mais ses bois sont plus simples et ont tout au plus six ramifications.

Le cerf axis vit aux Indes et à Ceylon, de préférence à proximité de l'eau. Il n'est pas peureux et se tient même pendant le jour aux environs des hommes. Comme animal des tropiques, la reproduction et la chute des bois ne sont pas liées à des saisons déterminées. Il s'agit d'un cerf magnifiquement tacheté de blanc, qui s'adapte facilement à la vie dans les jardins zoologiques.

207. VARKENSHERT

Hyelaphus

Het Varkenshart behoort tot hetzelfde geslacht als het axishert (n° 206). Het lijkt er trouwens goed op, maar het is donkerder van kleur. Dit hert heeft gewoonlijk een gaffelgewei. Het leeft van noordelijk Voor-Indië over Assam, Birma en Thailand tot in Indochina.



207. — Varkenshart - Cerf cochon

207. CERF COCHON

Hyelaphus


Le Cerf cochon appartient à la même espèce que le cerf axis (n° 206). Il lui ressemble assez bien, mais est de coloration plus foncée. Habituellement ses bois sont fourchus. Il vit depuis le nord des Indes à travers l'Assam, la Birmanie et la Thaïlande jusqu'en Indochine.

208. WAAIERSTAARTHERT

Odocoileus virginianus

Het Witstaartwaaierhert wordt ook Virginiahert genoemd. Het leeft echter niet enkel in Virginia, maar zowel in Noord-Amerika als in de naaldbossen van Midden- en Zuid-Amerika. In Europa werd dit waaierstaarthert ook ingevoerd; het leeft nu nog in verwilderde staat in Finland.

Typisch voor deze herten is de waaier-vormige staart, die bij de vlucht als signaal rechtop wordt gezet. Er zijn verscheidene ondersoorten die verschillen in kleur, grootte en geweivorm. De grootste leven in Alaska, de kleinste in Florida. Het Virginiahert is de typische vertegenwoordiger van de herten van de Nieuwe Wereld. Het is de « Bambi » van Disney's film.



208. — Waaierstaarthert - Cerf de Virginie

208. CERF DE VIRGINIE

Odocoileus virginianus

Le Cerf de Virginie, parfois aussi appelé « cerf à queue en éventail », ne vit pas uniquement en Virginie, mais également en Amérique du Nord et dans les bois de conifères de l'Amérique Centrale et du Sud. Ce cerf a également été importé en Europe et vit actuellement encore à l'état sauvage, en Finlande.

Leur queue en éventail, qui, lors de la fuite est dressée comme signal, est typique. Il y a plusieurs sous-espèces qui diffèrent en ce qui concerne la taille, la coloration et la forme des bois. Les plus grandes vivent en Alaska, les plus petites en Floride.

Le cerf de Virginie est le représentant typique des cerfs du Nouveau Monde. C'est le « Bambi » des films de Walt Disney.

209. SPIESHERT

Mazama

Bij het Spieshart blijft het gewei een spies, dus onvertakt. Vandaar de naam. Het is kleiner dan onze ree. Vóór het gewei draagt het een bosje lange haren.

Het afgebeelde spieshart behoort tot de rode soort, die in het oerwoud van Midden- en Zuid-Amerika leeft. Het graast vooral bij valavond. Er zijn ook grijze soorten, die meer in open gebieden worden aangetroffen.

Zoals bij de ree duurt de dracht bij het spieshart zeven en een half maanden. De vacht van de jongen is bont gevlekt.


209. MAZAMA ou DAGUET MEXICAIN

Mazama


Chez le Mazama les bois n'ont qu'une fourche et ne sont donc pas ramifiés, d'où son nom. Il est plus petit que notre chevreuil. Devant les bois il porte une petite touffe de longs poils.

Le Daguet mexicain représenté ici, appartient à la variété rouge qui habite la forêt vierge de l'Amérique Centrale et du Sud. Il broute surtout à la tombée de la nuit.

Il existe aussi des variétés grises, que l'on trouve dans des régions plus découvertes. Comme chez le chevreuil, la portée chez le mazama, dure sept mois et demie. Le pelage des jeunes est bigarré.



209. — Spieshart - Mazama ou Daguet mexicain



210. — Eland - Elan

210. ELAN

Alces alces

L'Élan vit dans les forêts humides de la Scandinavie, de la Russie, de la Sibérie et de l'Amérique du Nord. Tous les élan Eurasiatiques et de l'Amérique du Nord ne constituent qu'une seule espèce. L'élan le plus grand est certainement celui de l'Alaska. Le poids de ses bois peut atteindre 25 kg. Ils sont formés de larges palettes bordées de pointes s'étendant latéralement. Les pattes sont longues et de coloration claire. La lèvre supérieure, préhensile, surplombe la mâchoire inférieure. L'élan porte une barbe. Il se nourrit de feuilles et de branchettes. Il nage très bien et mange aussi des plantes aquatiques qui croissent sous la surface de l'eau.

L'élan adulte ne doit redouter d'autres ennemis que l'homme. Les élan vivent généralement par petits groupes. Après une portée de 36 semaines, la vache met au monde tout au plus deux jeunes, qu'elle défend courageusement contre les attaques des loups, des ours et des renards.

211. RENDIER

Rangifer

Bij de Rendieren dragen zowel de wijfjes als de mannetjes een gewei. Wilde rendieren bewoonden eertijds alle gebergten van Skandinavië. Nu worden er nog zowat 45.000 exemplaren aangetroffen op de hoogvlakte in het Dovre-Fjeld in Zuid-Noorwegen. Ze komen ook nog voor op IJsland, Spitsbergen en Nova-Zembla. Vroeger moeten ze geleefd hebben in bijna gans Europa.

In Skandinavië en Rusland worden rendieren als huisdieren gehouden. Deze huisdieren zijn kleiner dan de wilde rendieren. Ze zijn zeer nuttig voor de bewoners van de poolgebieden. Het rendier is trekdier en draagdier. Het levert ook vlees, melk, kleding, leer, tenten en dekens. Van de pezen worden koorden gemaakt en van de geweien en beenderen allerlei werktuigen.

De rendieren vormen grote kudden die lange trektochten ondernemen. In de winter blijven ze in de bossen; in de zomer trekken ze, als een wandelend bos, door de toendra's, waar ze zich voeden met grassen en korstmossen (rendiermos).



211. — Rendier - Renne

211. RENNE

Rangifer

Chez les Rennes les femelles aussi bien que les mâles portent des bois. Des rennes sauvages habitaient autrefois toutes les régions montagneuses de la Scandinavie. A l'époque actuelle on en trouve encore quelque 45.000 exemplaires sur les hauts plateaux du Dovre-Fjeld en Norvège méridionale. Il en existe également en Islande et aux îles de Spitsbergen et de la Nouvelle-Zemble. Jadis ils doivent avoir existé dans presque toute l'Europe.

En Scandinavie et en Russie les rennes sont tenus comme animaux domestiques. Ces animaux domestiqués sont plus petits que les sauvages. Ils sont très utiles aux habitants des régions polaires. Le renne est un animal de trait et de somme. Il fournit également de la viande, du lait, des vêtements, du cuir, des tentes et des couvertures. De ses tendons on fait des cordes et ses bois et ses os sont utilisés pour la fabrication de toutes sortes d'outils.

Les rennes sont rassemblés en d'énormes troupeaux qui entreprennent de longues migrations. En hiver ils se tiennent dans les bois, en été ils migrent, comme une forêt en marche, par les toundras, où ils se nourrissent d'herbes et de lichens à rennes (cladonies).

212. GIRAF

Giraffa

De Giraf leeft in de boomsteppen en savannen van Afrika. Opvallend is de lange hals, die nochtans maar zeven wervels telt. De gevlekte vacht harmonieert goed met de bebladerde bomen. Evenals bij de steppe-zebra (n° 180), past de vachttekening zich aan naargelang de omgeving; men merkt duidelijke verschillen wanneer men van het noorden naar het zuiden gaat.

De giraf eet vooral bladeren van de schermacacia's. De bladeren, de takken en de bast worden met de lange tong afgerukt. Bij het drinken moet de giraf de voorpoten uitspreiden, om met de kop aan de grond te geraken. De giraffen leven met verschillende families bij elkaar. Alle twee jaar brengt het wijfje een jong ter wereld. Dit jong wordt door de ouders fel verdedigd met behulp van voor- en achterpoten, waarmee ze zeer goed kunnen slaan.


212. GIRAFE

Giraffa

La Girafe vit dans les steppes boisées et les savanes de l'Afrique. Sa silhouette au long cou, bien qu'il ne compte que sept vertèbres cervicales, est bien connue. Son pelage tacheté s'harmonise merveilleusement avec le feuillage des arbres. Le dessin de la robe varie, tout comme chez le zèbre des steppes, lorsqu'on va du nord au sud.

La girafe se nourrit principalement du feuillage des mimosées. Les feuilles, les branches et l'écorce sont arrachées avec la longue langue. Pour s'abreuver, la girafe doit largement écartier les pattes antérieures afin d'atteindre le niveau de l'eau avec sa bouche.

Les girafes vivent par groupes de plusieurs familles. Tous les deux ans la femelle met au monde un unique jeune, que les deux parents défendent farouchement contre les attaques des fauves, à l'aide aussi bien des pattes antérieures que des postérieures, avec lesquelles ils savent allonger de fortes ruades.



212. — Giraf - Girafe

213. OKAPI

Okapia

De Okapi leeft in het oerwoud van Afrika. Het is een kostbaar en zeldzaam dier. De vacht is kastanjebruin, de kop lichtgrijs. Achterlijf en poten zijn gestreept. Het zijn gewoonlijk alleen de mannetjes die hoorntjes dragen. De okapi leeft alleen of in paren. Met zijn lange blauwe tong rukt hij bladeren en vruchten van de bomen. De tong is zo lang dat de okapi zich zelfs in de oren kan likken.

De pygmeeën maken jacht op deze dieren om de huid, waaruit ze gordels vervaardigen. Vroeger meende men dat deze gestreepte gordels gemaakt waren van zebra-huid. De okapi werd eerst in 1900 ontdekt door de Europeanen, in de door pygmeeën bewoonde oerwouden ten noorden van de Kongo-rivier.

213. OKAPI

Okapia

L'Okapi vit dans les forêts vierges de l'Afrique. C'est un animal rare et précieux. Le pelage est brun marron, la tête gris clair. L'arrière-train et les pattes sont rayées. A de rares exceptions près, de petites cornes ne sont l'apanage que des mâles.

L'okapi vit solitairement ou par couples. A l'aide de sa langue bleuâtre, longue et flexible, il arrache les feuilles et les fruits des arbres. Sa langue est tellement longue que l'okapi peut même se lécher l'intérieur des oreilles. Les pygmées font la chasse à ces animaux pour s'emparer de la peau dont ils font des ceintures. Autrefois on croyait que ces ceintures rayées étaient faites de peaux de zèbre. L'okapi n'a été découvert par les Européens qu'en 1900, dans les forêts vierges au nord du fleuve Congo, habitées par les pygmées.



213. — Okapi - Okapi



214. — Gaffelantiloop - Antilope à cornes fourchues

214. GAFFELANTILOOP

Antilocapra

De Gaffelantiloop draagt eigenaardige horens. Deze zijn wel hol zoals bij de runderen, schapen en geiten, maar de hoornkokers zijn gevorkt en zijdelings samengedrukt en worden elk jaar afgeworpen. Na de bronsttijd vormt zich onder de oude hoornschede een nieuwe, waardoor de oude afvalt. Deze schede ontstaat door versmelting van haren om een beenpit op het voorhoofd. De wijfjes dragen kleine horens, die niet gevorkt zijn. Op de nek en op het kruis staan manen.

Vroeger leefden de gaffelantilopen in alle prairiën van Midden- en Westelijk Noord-Amerika. Op het nippertje werd het uitsterven van deze dieren in 1900 verhinderd. Ondergebracht in nationale parken, hebben ze zich weer kunnen uitbreiden.

214. ANTILOPE A CORNES FOURCHUES

Antilocapra

Les cornes de l'Antilope à cornes fourchues sont très curieuses. Elles sont creuses comme celles des bovins, des moutons et des chèvres, mais les étuis des cornes sont fourchus et latéralement comprimés. Elles sont jetées chaque année. Après l'époque du rut, un nouvel étui se développe en dessous de l'ancien et fait tomber celui-ci. Cet étui provient d'une agglomération de poils soudés autour d'une cheville osseuse sur le front. Les femelles ont de petites cornes non fourchues.


Une crinière existe au cou et à la croupe. Autrefois les antilopes à cornes fourchues se rencontraient dans toutes les prairies de l'Amérique Centrale et de l'ouest de l'Amérique du Nord. Leur extermination a été empêchée au tout dernier moment en 1900. Mises en sécurité dans des parcs nationaux elles ont de nouveau pu se multiplier.

215. ZEBOE

Bos indicus

De Zeboe is het bekende Indische bultrund, zo genoemd wegens de bult op de rug. Deze bult is geen vetbult, maar een spierbundel, die bij de stier veel beter ontwikkeld is dan bij de koe. We kunnen de bult, evenals de mooi gekleurde kossem aan keel en hals, bij de stier veeleer beschouwen als mannelijk imponeer-orgaan.

De zeboe is waarschijnlijk ontstaan door kruising van runderen met oerrunderen en gaur, of moet beschouwd worden als een afstammeling van het Voorindische oerrund (*Bos nomadicus*).



215. — Zeboe - Zébu

215. ZEBU

Bos indicus

Le Zébu est le « bœuf à bosse indien » bien connu. Il doit son nom à la bosse qu'il a sur le dos. Celle-ci n'est pas constituée de graisse, il s'agit plutôt d'un faisceau musculaire, qui est mieux développé chez le taureau que chez la vache. On peut considérer cette bosse, ainsi que le fanon joliment coloré, qui pend au-dessous du cou et de la gorge du taureau, comme un organe d'intimidation mâle.

Le zébu est probablement issu du croisement de bovins avec des bœufs sauvages primitifs et des gaur, ou bien il doit être considéré comme un descendant du *Bos nomadicus*, bœuf primitif des Indes.


216. BANTENG

Bibos banteng

De Banteng komt voor in Zuid-Birma, Thailand, Indo-China, Malakka, Java en Borneo. De bantengstier is ongeveer 1,50 m hoog, is donker grijsbruin gekleurd, bijna zwart, en heeft witte poten. De koe en de kalveren zijn echter roodbruin.

De rug vertoont geen bult. Een kenmerk is de grote, witte spiegel, die evenwel bij het Malakka-ras ontbreekt.

De banteng eet loof en gras en is een oerwoudebewoner. Hij leeft in kleine kuddes door een koe aangevoerd. Jong gevangen, kan hij gemakkelijk als huisdier worden opgefokt. De banteng is tamelijk zeldzaam geworden.



216. — Banteng - Bateng

216. BANTENG

Bibos banteng

Le Banteng se rencontre en Birmanie méridionale, en Thaïlande, en Indo-Chine, en Malaisie, à Java et à Bornéo. Le taureau atteint une hauteur de 1,50 m environ; il est gris foncé brunâtre, presque noir, et il a des pattes blanches. La vache et les veaux par contre sont brun-rouge.

Il n'y a pas de bosse sur le dos. Une de ses caractéristiques est le miroir blanc, étendu, qui fait cependant défaut chez la race de la Malaisie.

Le banteng se nourrit de feuilles et d'herbe et est un habitant de la forêt vierge. Il vit par petits troupeaux, sous la conduite d'une vache. Captivé jeune, il se domestique facilement. Le banteng est devenu assez rare.

217. GAYAL

Bibos frontalis

Een ander Aziatisch rund is de Gayal. Dit dier is als huisdier gefokt uit de grote Indische gaur, die voorkomt in de bergbossen van Voor- en Achter-Indië. De gayal is kleiner en plomper dan de gaur. Hij wordt gehouden in Oost-Bengalen en in het bergland tussen de Brahmapoetra en Tibet. Hij komt ook in verwilderde staat voor op verschillende plaatsen in Voor-Indië. Bij de gayal staan de horens zijwaarts omlaag gericht, bij de gaur echter naar achter en omhoog.

Niettegenstaande zijn gedrongen gestalte is de gayal een goede klimmer.

217. GAUR

Bibos frontalis

Le Gaur est un autre bovin asiatique. Cet animal est la forme domestique du grand gaur indien, originaire des bois montagneux des Indes et de l'Indochine. Ce gaur est plus petit et plus trapu que son congénère sauvage. On le tient comme animal domestique dans le Bengale oriental et dans les régions montagneuses entre le Brahmapoutre et le Thibet. Il se rencontre également redevenu sauvage, en plusieurs endroits des Indes. Chez le gaur domestique, les cornes pointent latéralement vers le bas; chez la forme sauvage par contre, elles sont dirigées vers l'arrière et vers le haut.

Nonobstant ses formes trapues, le gaur est bon grimpeur.



217. — Gayal - Gaur



218. — Muskusos - Bœuf musqué

218. MUSKUSOS

Ovibos moschatus

De wetenschappelijke naam « ovibos » toont aan dat dit dier kenmerken van de schapen (ovis), alsook kenmerken van de runderen (bos) vertoont. De Muskusos is nochtans het meest verwant met de runderen.

De muskusos onderscheidt zich van de andere runderen door volgende kenmerken : de horens zijn naar beneden gebogen en naar voren gericht. Hij is betrekkelijk klein, d.w.z. ongeveer 1,10 m hoog aan de schoft; de dichte vacht bestaat uit zeer lange, donkerbruine haren, die aan de achterrug kort worden. De poten zijn bedekt met gelig-witte haren. De staart is zeer kort. De snuit is behaard tot bijna aan de neusgaten.

De muskusos leeft in gebieden met strenge winters nl. het Noorden van Amerika en Groenland. Het dier leeft in benden van 20 tot 30 stuks. In de winter, bij de trek naar het zuiden, verenigen ze zich tot grote kudden.

218. BŒUF MUSQUE

Ovibos moschatus

Le nom scientifique « ovibos » démontre que cet animal possède des caractéristiques des moutons (ovis), ainsi que des bovins (bos). Toutefois, le Bœuf musqué présente le plus d'affinités avec les bovins.

Il se distingue des autres bovidés par les caractéristiques suivantes : les cornes sont recourbées vers le bas et dirigées vers l'avant. Il est de taille relativement petite, soit environ 1,10 m de hauteur au garrot; le pelage est touffu et se compose de très longs poils bruns, foncés, qui se raccourcissent vers l'arrière-train. Les pattes sont recouvertes de poils blancs jaunâtres. La queue est très courte. Le museau est couvert de poils jusqu'aux naseaux.

Le bœuf musqué vit dans des régions aux hivers extrêmement rigoureux, soit dans le nord de l'Amérique et dans le Groenland. L'animal vit par troupes de 20 à 30 individus. En hiver, lors de la migration vers le sud, ils se réunissent en des troupeaux plus importants.

219. WILDE BUFFEL

Bubalus bubalis

Enkele typische kenmerken van de buffels, waardoor deze zich onderscheiden van de echte runderen, zijn wel de breed uitgebogen, brede horens, de zware romp, de geringe beharing en de lange staart, die eindigt in een kwast.

De Wilde Buffel of Arni komt voor in Voor- en Achter-Indië en op de Indonesische eilanden. Uit deze wilde buffel werd de waterbuffel gefokt, die als huisdier wordt gehouden, en kleiner is dan zijn wilde voorvaderen. De wilde buffel leeft in de moerassige laagvlakten bij rivieren, meer- en zeeoeveren. De zeer brede hoeven en de weinig gereduceerde bijhoeven zorgen er voor dat het dier niet te diep in de modder zakt, niettegenstaande zijn kolossaal gewicht.



219. — Wilde Buffel - Buffle indien

219. BUFFLE INDIEN

Bubalus bubalis

Quelques caractéristiques typiques, par lesquelles les buffles se distinguent des vrais bovins, sont sans doute les grandes cornes, largement recourbées, le tronc massif, les poils clairsemés et la longue queue, se terminant sur une houppe.

Le Buffle sauvage ou Arni se rencontre aux Indes, en Indochine et dans les îles indonésiennes. C'est de ce buffle sauvage qu'est issu le buffle aquatique des Indes, qui est tenu comme animal domestique. Ce dernier est de plus petite taille que ses ancêtres sauvages.

Le buffle sauvage vit dans les plaines basses et marécageuses, près des rivières, des lacs et au bord de la mer. Les sabots très larges et les sabots latéraux peu réduits, empêchent que l'animal s'enfoncerait trop profondément dans la vase, nonobstant son poids considérable.

220. RODE BUFFEL

Bubalus nanus

De Rode Buffel wordt ook Dwergbuffel genoemd. Hij is kleiner dan de gewone Afrikaanse buffel of kafferbuffel (n° 221). De rode buffel werd vroeger als een aparte soort beschouwd; nu weet men echter dat alle Afrikaanse buffels slechts geografische vormen zijn van de soort « *Bubalus caffer* » (n° 221).

De rode buffel is roodbruin gekleurd en heeft aan zijn oorschelpen lange gekleurde haarfranjes. Zijn horens zijn kleiner dan die van de kafferbuffel, wat normaal is ingevolge zijn geringere afmetingen.



220. — Rode Buffel - Buffle rouge ou de forêt

220. BUFFLE ROUGE ou DE FORET

Bubalus nanus

Le Buffle rouge, également appelé Buffle nain, est plus petit que le buffle noir d'Afrique ou buffle des Cafres (n° 221). Le buffle rouge était autrefois considéré comme une espèce distincte; actuellement on sait que tous les buffles africains ne sont que des variétés géographiques de l'espèce « *Bubalus caffer* » (n° 221).

Le buffle de forêt est de coloration rouge-brun, ses pavillons d'oreille sont pourvus de franges de longs poils colorés. Les cornes sont plus petites que celles du buffle des Cafres; ceci est d'ailleurs en rapport avec sa taille plus petite.

221. KAFFERBUFFEL

Bubalus caffer

De Afrikaanse buffels bewonen alle landschappen van Afrika ten zuiden van de Sahara. Er zijn verschillende geografische vormen van de soort « *Bubalus caffer* », met aan het ene eind de grote Kafferbuffel en aan het andere eind de veel kleinere rode buffel (n° 220).

De kafferbuffel is een grote zwarte buffel met wijd uitgespreide horens. De horens bedekken het gehele voorhoofd en zijn gevaarlijke wapens. De stier bereikt een hoogte van 1,80 m. De koe is kleiner en haar horens zijn maar half zo groot.

Dit dier leeft in de steppen van Oost- en Zuid-Afrika.


221. BUFFLE NOIR D'AFRIQUE ou DES SAVANES, ou DES CAFRES

Bubalus caffer

Les Buffles noirs habitent toutes les régions de l'Afrique au sud du Sahara. Il existe plusieurs variétés géographiques de l'espèce « *Bubalus caffer* », comprenant à un bout le grand buffle des Cafres, à l'autre le buffle rouge, beaucoup plus petit (n° 220).

Le buffle noir est un animal grand et lourd, aux cornes largement écartées, qui couvrent tout le front et sont des armes de défense redoutables. Le taureau atteint une hauteur de 1,80 m, la vache est plus petite et ses cornes n'atteignent que la moitié de celles du mâle.

L'animal vit dans les steppes de l'Afrique orientale et du Sud.



221. — Kafferbuffel - Buffle noir d'Afrique, ou des savanes, ou des Cafres



222. — Amerikaanse Bison - Bison américain

222. BISON AMERICAIN

Bison bison

Le Bison américain est le « bison des indiens » proprement dit de nos récits de jeunesse, qui jadis peuplait les vastes prairies du continent nord-américain, par des troupeaux immenses. Dans la seconde moitié du siècle dernier, ils ont pratiquement été exterminés, par cupidité ou par simple plaisir de tuer. Le gouvernement est intervenu et les survivants ont été rassemblés dans des grandes réserves naturelles.

Le bison américain est fortement apparenté au bison d'Europe ou Wisent (n° 223). L'énorme tête massive est frappante, sa puissance est accentuée par la houppe noire et la barbe, qui le font sembler plus grande encore. L'avant-train, sur lequel tranche le corps recouvert de poils si courts qu'il semble être nu, est également impressionnant. Entre l'avant-train et l'arrière-train, il y a une disproportion prononcée, ce qui produit une impression peu harmonieuse.

223. WISENT of EUROPESE BISON

Bison bonasus

De Wisent wordt, eigenlijk ten onrechte, ook Europese bison genoemd. In voorhistorische tijden leefde er in Europa wel een bison, die we nog afgebeeld vinden in de woongrotten van ongeveer 40.000 jaar vóór Christus. Deze bison was echter een steppedier in tegenstelling tot de wisent, die als bosrunder ten tijde van de oude Germanen in de woeste Europese wouden leefde.

Overal in Europa worden schedels van de wisent gevonden. In Midden-Europa leefde hij tot in de 14^e en 15^e eeuw, daarna nog slechts in Polen en in Rusland. Vóór de eerste wereldoorlog vond men nog exemplaren in Polen en in de Kaukasus. Nu zijn beide groepen uitgeroeid, en vindt men de wisent alleen nog in gevangenschap.

De volwassen wisent is wel het grootste Europese zoogdier. Hij vertoont veel gelijkenis met de Amerikaanse bison (n° 222). De kroezige vacht is kastanjebruin. Opvallend is de franjebaard, die van kin tot borst afhangt, alsook de prachtige pluimstaart. Tussen bison en wisent is er een verschil in stand en vorm van de horens. De wisent verspreidt ook een muskusachtige geur, wat niet het geval is met de bison. De wisent is ook groter. Bij de koeien vallen de verschillen veel minder op.

223. BISON D'EUROPE ou WISENT

Bison bonasus

C'est à tort que le Wisent est également appelé « Bison d'Europe ». Lors de l'époque préhistorique, il a bien existé un bison en Europe; on le voit encore représenté dans les grottes d'habitation de $\pm$ 40.000 ans avant J.C. Ce bison cependant était un animal des steppes, contrairement au Wisent qui, au temps des anciens Germains, vivait comme bovidé des bois, dans les forêts primitives de l'Europe. Partout en Europe on a trouvé des crânes du wisent. En Europe centrale, il a encore survécu jusqu'au XIV^e ou au XV^e siècle et, plus tard encore, en Pologne et dans le Caucase. Actuellement ces deux groupes ont été exterminés; il n'en existe plus que quelques exemplaires en captivité.

Le wisent adulte est sans doute le plus grand des mammifères de l'Europe. Il ressemble beaucoup au bison américain (n° 222). Le pelage crépu est marron. La barbe frangée, qui lui pend du menton jusqu'à la poitrine, ainsi que la magnifique queue en éventail, sont très frappantes.

Entre le wisent et le bison, il y a aussi de la différence en ce qui concerne la position et la forme des cornes. Le wisent répand une odeur musquée, ce qui n'est pas le cas chez le bison. Le wisent est le plus grand des deux. Cette différence se remarque moins chez les vaches.



223. — Wisent of Europese Bison - Bison d'Europe ou Wisent

224. YAK

Poëphagus

Het vaderland van de Yak is het hoogland van Centraal-Azië. In afgelegen gebieden van Oost-Tibet zouden nog enkele kleine kudden leven. Een echte wilde yak is nog nooit in dierentuinen te zien geweest. Wel de kleine tamme yak, een voornaam huisdier. De wol van de vacht wordt door de nomaden gebruikt en de gedroogde mest dient als brandstof. De yak wordt tevens als lastdier gebruikt. Ook de melk en het vlees worden gewaardeerd.

De tamme yak is geelachtig, wit of gevlekt. De wilde vorm is bruin-zwart en zeer dicht behaard. De wilde yak is zeer gevaarlijk en een geduchte tegenstander. De stieren kunnen tot 1.000 kg zwaar worden en tot 2 m schouderhoogte bereiken. De koe is aanzienlijk kleiner.



224. — Yak - Yack

224. YACK

Poëphagus

La patrie du Yack est le haut plateau de l'Asie centrale. Dans certaines régions écartées de l'est du Thibet, il en existerait encore quelques petits troupeaux. Un véritable yack sauvage n'a jamais été vu dans les jardins zoologiques, mais bien le yack domestiqué, plus petit, animal domestique très précieux dans son pays. La laine de la fourrure est utilisée par les nomades et sa fiente séchée est utilisée comme combustible. Le yack sert également de bête de somme. La chair et le lait sont appréciés eux aussi.

Le yack domestique est jaunâtre, blanc ou tacheté. La forme sauvage est brun-noir et est pourvue d'une toison très touffue. Le yack sauvage est un adversaire dangereux et redoutable. Les taureaux peuvent peser jusqu'à 1.000 kg, et atteindre une hauteur de 2 m au garrot. La vache est beaucoup plus petite.

225. NIJLGAU

Boselaphus

De Nijlgau wordt ook Blauwe Bul genoemd. Hij is de Indische vertegenwoordiger van de woudantilopen. In tegenstelling met zijn Afrikaanse soortgenoten is bij de nijlgau de schoft hoger dan het achterdeel. De borst is breder dan het kruis.

De vacht is donkergrijs bij het mannetje, bruin bij het wijfje en het jong. De manen zijn zwart. Boven de hoeven zien we een typisch wit-en-zwarte tekening.


De nijlgau leeft in de open bossen, meestal nabij water. Hij wordt aangetroffen in Indië, Ceylon en de landen ten oosten van de golf van Bengalen, maar niet in Assam.

225. NILGAU

Boselaphus

Le Nilgau, encore appelé Bœuf bleu, est le représentant indien des antilopes des bois. Contrairement à ses congénères africains, il a le garrot plus haut que la croupe. La poitrine est plus large que l'arrière-train. Le pelage est gris foncé chez le mâle, brun chez la femelle et les petits. La crinière est noire. Au dessus des sabots, on voit un dessin typique en noir et blanc.

Le nilgau vit dans les bois clairs, le plus souvent à proximité de l'eau. Il se rencontre aux Indes, au Ceylan, et dans les pays à l'est du golfe de Bengale mais pas en Assam.



225. — Nijlgau - Nilgau



226. — Vierhoorn-antiloop - Tétracère

226. VIERHOORNANTILOOP

Tetracerus

Bij deze soort dragen de wijfjes geen horens, terwijl de mannetjes er twee paar bezitten : één gelegen boven de ogen, het ander op de top van het hoofd. Door bepaalde kenmerken van de structuur, alsook door de voorliefde voor beboste plaatsen, kunnen we de Vierhoornantiloop in verband brengen met de Afrikaanse bosbok (n° 231) en de nijlgau (n° 225).

Deze antiloop bewoont geheel Indië, uitgenomen Ceylon en de landen ten oosten van de golf van Bengalen.

De vierhoornantiloop leeft in paren. In januari of februari worden meestal twee jongen geboren.

226. TETRACERE

Tetracerus

Chez cette espèce les femelles ne portent pas de cornes, tandis que les mâles en ont deux paires, une située au-dessus des yeux et une seconde au sommet de la tête. Par certaines caractéristiques de sa structure, ainsi que par sa préférence pour des endroits boisés, le Tétracère se rapproche des guibs (bushbocks africains) et du nilgau (n° 231 et 225).

Le tétracère habite toute l'Inde, à l'exception du Ceylan et des pays à l'est du golfe de Bengale.

Il vit par paires. Les petits viennent au monde en janvier ou en février. Généralement il y en a deux.


227. ELAND-ANTILOOP

Taurotragus oryx

De Eland-antiloop bewoont Oost-Afrika, van de bronnen van de Nijl tot aan de Kaap. Hij leeft in de beboste vlakten, in de woudgalerijen langs de rivieren en op de bergflanken, soms tot op zeer grote hoogte.

De eland-antiloop schijnt een schakel te leveren tussen de antilopen en de runderachtigen. Deze veronderstelling wordt versterkt door het feit dat kruisingen bekomen werden tussen deze soort en de huisstier.

De vacht is bruin, helderder of grijsachtig met witte strepen op de flanken. Bij de oudere mannetjes verdwijnen deze strepen vaak. De mannetjes onderscheiden zich van de wijfjes door dikkere horens en door een bos lange haren op het voorhoofd.



227. — Eland-antiloop - Antilope-Élan

227. ANTILOPE-ELAN

Taurotragus oryx

L'Antilope-élan habite l'Afrique orientale, des sources du Nil jusqu'au Cap. Elle vit dans les plaines boisées, les galeries forestières le long des rivières et sur les flancs des montagnes, parfois jusqu'à très haute altitude.

L'antilope-élan paraît constituer un chaînon entre les antilopes et les bovins. Cette supposition est étayée par le fait que des croisements ont été obtenus entre cette espèce et le taureau domestique.


Le pelage est brun, fauve-clair ou grisâtre, avec des rayures blanches sur les flancs. Ces rayures disparaissent souvent chez les vieux mâles. Les mâles se distinguent par des cornes plus fortes que celles des femelles et par une brosse de longs poils sur le front.

228. REUS-ELANDANTILOOP

Taurotragus derbianus

Bij de Reus-elantantiloop is de streeptekening op de flanken blijvend. Deze dieren worden ook vooral gekenmerkt door de sterk gedraaide en lange horens, de zwarte hals en de langere manen. De vacht is bruinrood.

Deze elantantiloop voedt zich met bladeren, vruchten en zaden. Hij leeft in kudden, meestal bij de schaduwgevende bomen van de Afrikaanse savannen.



228. — Reuselantantiloop - Elan géant ou de Derby

228. ELAN GEANT ou DE DERBY

Taurotragus derbianus

Les rayures sur les flancs de l'Elan géant sont permanentes. Ces animaux sont surtout caractérisés par leurs longues cornes, fortement tournées, le cou noir et la longue crinière. Le pelage est brun-rouge.

L'élan géant se nourrit de feuillages, de fruits et de graines. Il vit par troupeaux, le plus souvent à proximité des arbres à ombrage des savanes africaines.

229. GROTE KOEDOE

Strepsiceros strepsiceros

De Grote Koedoe leeft in het oosten van Afrika, van de Boven-Nijl tot aan de Kaap. Hij bewoont de beboste heuvels en men vindt hem tot op hoogten van 2.000 m. De wijfjes leven in kleine troepen; ze worden slechts in de bronsttijd vervoegd door de mannetjes, die dan zeer strijdlustig kunnen worden.

De koedoe leeft van knoppen, jonge scheuten, bladeren en gras. Wanneer ze volledig ontwikkeld zijn, vertonen de horens elk drie spiraalwindingen. De donkerbruine vacht draagt op de flanken witte strepen, die vooral zeer duidelijk uitkomen bij de jonge dieren. De verlengde haren onder de hals worden bij de oudere mannetjes witachtig. Kenmerkend is ook de witte streep tussen de ogen, de brede oren en de dicht behaarde staart. De manen, donkerder gekleurd dan de rest, zetten zich voort op de voorkant van de rug.

229. GRAND KUDU

Strepsiceros strepsiceros

Le Grand Kudu vit dans l'est de l'Afrique, depuis le cours supérieur du Nil jusqu'au Cap. Il habite les collines boisées et monte jusqu'à des hauteurs de 2.000 m. Les femelles vivent par petites groupes; ce n'est qu'à l'époque du rut que les mâles se joignent à elles et peuvent devenir très belliqueux.

Le kudu se nourrit de bourgeons, de jeunes pousses, de feuilles et d'herbe. Lorsque les cornes ont atteint leur développement complet, chacune d'elles a trois spires. Sur les flancs du pelage rouge-brun, il y a des rayures blanches qui, chez les jeunes surtout, sont très apparentes. Les longs poils en dessous du cou deviennent blanchâtres chez les vieux mâles. D'autres caractéristiques sont : les lignes blanches entre les yeux, les longues oreilles et la queue touffue. La crinière, plus foncée que le reste du pelage, se prolonge sur le début du dos.



229. — Grote Koedoe - Grand Kudu



230. — Sitatoenga of Waterkoedoe - Situtunga ou Antilope des marais

230. SITATOENGA of WATERKOEDOE

Limnotragus

De Sitatoenga of Waterkoedoe leeft in de grote papyrusmoerassen van tropisch Afrika. Hij staat dikwijls tot aan de hielen in het water. Wanneer er gevaar dreigt, zoekt hij zijn heil in het water. Hij eet vooral bladeren en takken. De mooi gedraaide horens komen alleen bij het mannetje voor, en kunnen een spiraallengte van 90 cm bereiken. Het mannetje is bruingrijs met witte manen, het wijfje kastanjebruin met zwarte manen.

230. SITUTUNGA ou ANTILOPE DES MARAIS


Limnotragus

Le Situtunga ou Antilope des marais, encore appelé « Kudu aquatique », vit dans les vastes marécages à papyrus de l'Afrique tropicale. Il se tient souvent dans l'eau jusqu'aux poignets et talons. En cas de danger il se réfugie dans l'eau. Il mange de préférence du feuillage et des branches. Les cornes, joliment tournées, ne sont présentes que chez les mâles et peuvent atteindre une longueur en spirale de 90 cm. Le mâle est gris-brun, avec une crinière blanche, la femelle marron, à la crinière noire.

231. BOSBOK

Tragelaphus

De Bosbok wordt in geheel Afrika, ten zuiden van de Sahara, aangetroffen. Er zijn meerdere ondersoorten te onderscheiden in de verschillende streken. De bosbokken leven op beboste plaatsen en gaan 's nachts grazen, meestal alleen of met twee. Zij komen dikwijls tot op de plantages. De vacht is gestreept, zowel bij de volwassenen als bij de jongen. De horens, die niet geringd zijn, dragen langs voren een kiel. De manen groeien tot op de rug, terwijl de snuit naakt blijft. Het lichaam is op regelmatige wijze bedekt met tamelijk lange haren.



231. — Bosbok - Guib ou Antilope harnachée

231. GUIB ou ANTILOPE HARNACHEE (BUSHBOCK)

Tragelaphus

Le Guib se rencontre dans tout l'Afrique, au sud du Sahara. D'après les régions on en distingue plusieurs sous-espèces. Le guib vit dans les endroits boisés et il s'en va brouter pendant la nuit, généralement en solitaire ou par deux. Souvent il se hasarde jusqu'aux plantations. Le pelage est rayé, aussi bien chez les adultes que chez les animaux jeunes. Les cornes, qui ne sont pas annelées, ont une quille sur la partie antérieure. La crinière se prolonge jusque sur le dos, tandis que le museau reste glabre. Le corps est couvert, de façon irrégulière, par des poils assez longs.

232. BONGO

Booceros

De Bongo komt voor in de oerwouden van West- en Centraal-Afrika.

Dit dier is ongeveer zo groot als een edelhert, is prachtig gevormd en vertoont een mooie tekening : kastanjerood, onderbroken door 14-15 witte strepen. De horens, die een lengte van 60-80 cm kunnen bereiken, zijn liervormig gebogen. De binnenzijde van de poten is wit. Ter hoogte van de opperarm zien we een zwarte dwarsband. De witte delen camoufleren het dier goed in de schemer van zonlichtvlekken en slagschaduw van het onderhout.

De bongo leeft vooral in het bamboestruikgewas langs rivieren.



232. — Bongo - Antilope Bongo ou Bangana

232. ANTILOPE BONGO ou BANGANA

Booceros

Le Bongo se rencontre dans les forêts vierges de l'Afrique occidentale et centrale.

Cet animal est presque aussi grand qu'un cerf; il a de belles formes et le pelage présente de jolis dessins : rouge-marron, interrompu par 14-15 rayures blanches. Les cornes, qui peuvent atteindre une longueur de 60-80 cm, sont recourbées en forme de lyre. L'intérieur des pattes est blanc. A la hauteur de l'arrière-bras se remarque une bande transversale noire. Les parties blanches camouflent bien l'animal dans la pénombre des taches de lumière et d'ombre portée des sous-bois.

Le bongo vit surtout dans les jeunes bambous, le long des rivières.

233. GEWONE DUIKER

Sylvicapra grimmia

De Duiker behoort tot een groep van antilopen die hun naam danken aan de Afrikaanse Boeren. Deze dieren « duiken » inderdaad weg in het kreupelhout, iets waartoe zij door hun wigvormige kop, korte hals en naar achter ietwat oplopende rug, goed in staat zijn. In Kongo noemt men deze dieren gewoonlijk « Kashia ».

De gewone duiker leeft in de dichte kreupelbossen van de wijde Afrikaanse steppen en savannen van de Soedan tot de Kaap. Het dier is ongeveer een halve meter hoog. De kleur gaat van olijfgrauw tot donker geelbruin met zwartgespikkelde rug en witte buikzijde. Hij eet planten en ook kleine dieren.

233. DUIKER COMMUN ou CEPHALOPHE DE SAVANE


Sylvicapra grimmia

Le Duiker (plongeur) appartient au groupe d'antilopes qui doivent leur nom aux Boers sud-africains. Ces animaux plongent en effet dans les broussailles, mouvement qui leur est facilité par la tête en forme de coin, le cou court et le dos montant quelque peu vers l'arrière.

Au Congo ces animaux sont communément appelés « Kashia ». Le plus souvent, les femelles aussi bien que les mâles portent de petites cornes.

Le duiker commun vit dans les broussailles touffues des vastes steppes et savanes africaines, du Soudan jusqu'au Cap. La hauteur de l'animal est d'un demi-mètre environ. La couleur varie d'olive à brun-jaunâtre foncé, le dos est tacheté de noir et le ventre est blanc.

Le duiker commun ajoute des petits animaux à son régime végétarien.



233. — Gewone Duiker - Duiker commun ou Céphalophe de savane



234. — Bosduiker - Céphalophe à ventre clair

234. BOSDUIKER

Cephalophus leucogaster

De Bosduiker is, zoals de naam het duidelijk maakt, een bosdier. Hij leeft in de oerwouden en lichte boslandschappen van Afrika, vanaf Gambia in het westen tot Kenya in het oosten. Zelden worden deze dieren, die zeer schuw zijn, opgemerkt door de Europeanen.

De bosduikers zijn goede sluipers, maar kunnen ook klimmen. Om een bepaald loof te pakken te krijgen werken ze zich omhoog met behulp van de sterke ranken van de klimplanten.

Er komen veel kleurvariaties voor bij de bosduikers (zie ook n^o 235 en 236). De hier afgebeelde bosduiker wordt gekenmerkt door zijn lichte buikzijde. Ook de rest van het lichaam is gewoonlijk minder fel gekleurd dan bij de andere bosduikers.

234. CEPHALOPHE A VENTRE CLAIR

Cephalophus leucogaster

Le Céphalophe à ventre clair est un animal des bois. Il vit dans les forêts vierges et les régions boisées, ouvertes de l'Afrique, depuis la Gambie à l'ouest jusqu'au Kenya à l'est. Ce n'est qu'à de rares occasions que ces animaux, qui sont très craintifs, sont aperçus par des Européens.

Les céphalophes se coulent avec facilité à travers les bois, mais ce sont aussi de bons grimpeurs. Pour atteindre certains feuillages, ils se hissent en s'agrippant aux sarments les plus forts des plantes grimpantes.

Il y a plusieurs variétés de coloration chez les céphalophes (voir aussi les n^{os} 235 et 236). L'espèce représentée ici se distingue par son ventre clair. Le reste du corps est le plus souvent moins vivement coloré que chez les autres céphalophes.

235. ZWARTRUGDUIKER

Cephalophus dorsalis castaneus

De Zwartrugduiker is, zoals de vorige, een bosduiker die leeft in de Afrikaanse oerwouden en lichte boslandschappen.

De zwartrugduiker is gekenmerkt door een brede zwarte band in het midden van de rug tot aan de staart. De kleur van de vacht varieert van donkerrood tot bruinrood of kastanjebruin. Soms is de kleur ook wel wat lichter. De horens zijn eerder fijn, met ronde doorsnede aan de basis.

Dit dier komt voor van Sierra Leone tot Opper-Guinea en westelijk Kongo.



235. — Zwartrugduiker - Céphalophe marron à dos noir

235. CEPHALOPHE MARRON A DOS NOIR

Cephalophus dorsalis castaneus

Le Céphalophe marron à dos noir est un céphalophe des bois, comme le précédent. Il vit dans les forêts vierges africaines et dans les paysages forestiers ouverts.

Ce céphalophe se distingue par une longue bande noire, partant du milieu du dos jusqu'à la queue. La coloration du pelage varie du rouge foncé au brun-rouge ou marron. Parfois elle est même plus claire. Les cornes sont plutôt minces au profil circulaire à la base.

Cet animal se rencontre du Sierra Leone jusque dans la Haute-Guinée et au Congo occidental.

236. GOUDRUGDUIKER

Cephalophus sylvicultor

De Goudrugduiker wordt ook wel Reuzenduiker genoemd, daar hij de grootste vertegenwoordiger van de groep der duikers is.

Een ander, meer opvallend kenmerk, is de gele beharing van de rug, waarvan het achterste gedeelte bij gevaar wordt opgericht; hierdoor wordt de bijna naakte, donker gekleurde huid van het kruis beter zichtbaar, waartegen dan de lichtgele haren scherp afsteken.

De goudrugduiker doet op het eerste zicht een beetje denken aan een okapi en aan een tapir. De gehele vorm herinnert aan een tapir; de donkerbruine kleur, die aan de kop in lichtere tinten overgaat, en de lange tong, waarmee hij zich de oren kan reinigen, herinneren aan een okapi. Deze duiker wordt in Kongo beschermd.



236. — Goudrugduiker - Céphalophe des bois

236. CEPHALOPHE DES BOIS

Cephalophus sylvicultor

Le Céphalophe des bois est également appelé Céphalophe géant, car il est sans aucun doute le plus grand des représentants du groupe de céphalophes ou « duikers ».

Une autre caractéristique, plus apparente celle-ci, est la coloration dorée du dos, dont les poils de la partie postérieure sont dressés en cas de danger, ce qui fait apparaître la peau presque nue de la croupe, en fort contraste avec les poils jaune clair.

A première vue, le céphalophe des bois évoque un peu l'okapi et le tapir. Les formes rappellent celles du tapir; la couleur brun foncé, passant à des teintes plus claires à la tête, la longue langue avec laquelle il peut se nettoyer les oreilles, rappellent l'okapi. Ce céphalophe est protégé au Congo.

237. BLAUWBOKJE

Philantomba caerula

Het ongeveer 30 cm lange Blauwbokje is wel een dwergje onder de antilopen. Het diertje is nog kleiner dan een haas. De horentjes zijn zeer klein; het wijfje heeft er meestal geen. De pootjes zijn zo dun als potloden.

Het blauwbokje leeft in de dichte oerwouden van Afrika. Het zoekt bij voorkeur het dichte plantendek op, in de nabijheid van water. Het diertje verbergt zich dikwijls in kuilen die door andere dieren werden uitgegraven.

De kleur van de vacht is grauwbruin of donker blauwgrijs.

237. BOLOKO ou DUIKER BLEU

Philantomba caerula


Ce petit Duiker bleu, dont la longueur atteint 30 cm environ, est certainement un nain parmi les antilopes. La taille de l'animal est encore inférieure à celle d'un lièvre. Ses cornes sont minuscules. Généralement la femelle en est dépourvue. Les petites pattes sont aussi minces qu'un crayon.

Le Boloko vit au plus profond des forêts vierges de l'Afrique. Il recherche de préférence le couvert végétal le plus touffu, à proximité de l'eau. Le petit animal se cache souvent dans des trous creusés par d'autres animaux.

Le pelage est gris-brun ou gris-bleu foncé.



237. — Blauwbokje - Boloko ou Duiker bleu



238. — Sabelantiloop - Antilope noire

238. ANTILOPE NOIRE

Hippotragus niger

Cette antilope est ainsi appelée à cause de la couleur de sa robe foncée, qui va du brun foncé au noir brillant. Les femelles sont de couleur brun-châtain et les petits sont fauves. Les cornes sont ensiformes. Avec celles-ci l'animal se défend courageusement lorsqu'il est attaqué par des chiens. L'Antilope noire vit par petits troupeaux de six à douze animaux dans les savanes de l'Afrique orientale et jusqu'au Transvaal. Parfois l'on rencontre des mâles solitaires. Cet animal est protégé par la loi.

239. PAARDANTILOOP


Hippotragus equinus

De Paardantiloop wordt ook Basterdgemsbok genoemd.

De kleur van de vacht is vaalrood. Kenmerkend zijn ook het zwarte masker aan het aangezicht, de witte vlekken voor de ogen en de grote oren met kwasten aan de uiteinden. De naar achter gebogen horens zijn sterk geringd.

De paardantiloop geeft de voorkeur aan struikrijke en zelfs beboste streken in de nabijheid van waterlopen. De kudde, 12 tot 25 stuks, bestaat uit een mannetje, de wijfjes en de jongen, die tegen het einde van het jaar geboren worden.

Het verspreidingsgebied van deze antilope is Afrika, ten zuiden van de Sahara.



239. — Paardantiloop - Antilope chevaline ou rouanne

238. SABELANTILOOP

Hippotragus niger

Deze antilope wordt ook Zwarte Antilope genoemd wegens zijn vacht, die donkerbruin tot glanzend zwart is. De wijfjes zijn kastanjebruin en de jongen rosachtig. De naam Sabelantiloop dankt het dier aan zijn horens. Hiermede verdedigt het zich stoutmoedig, wanneer het door honden wordt aangevallen.

De sabelantiloop leeft in kleine kuddes van zes tot twaalf dieren in de steppen van Oost-Afrika tot in Transvaal. Men ontmoet soms ook wel afzonderlijke mannetjes.

Dit dier is beschermd door de wet.

239. ANTILOPE CHEVALINE ou ROUANNE

Hippotragus equinus

Le pelage de l'Antilope chevaline ou rouanne est de coloration rouge-fauve. Son masque noir est caractéristique, ainsi que les taches blanches devant les yeux et les grandes oreilles à touffes de poils aux extrémités. Les cornes, recourbées vers l'arrière, sont fortement annelées.

L'antilope chevaline recherche de préférence les endroits broussailleux et même les régions boisées, à proximité des cours d'eau. Les troupeaux de 12 à 25 individus se composent d'un mâle, de femelles et de jeunes qui viennent au monde vers la fin de l'année.

L'aire de dispersion est l'Afrique, au sud du Sahara.


240. NOORD-AFRIKAANS HARTEBEEST

Alcelaphus buselophus

In de antilopenstam der koeantilopen kunnen we drie hoofdgroepen onderscheiden : de eigenlijke koeantilopen of hartebeesten (n° 240 en 241), de lierantilopen (n° 242 en 243) en de gnoes (n° 244).

De hartebeesten zijn bewoners van savannen en steppen: ze geven een onevenwichtige indruk. De kop is zeer lang, terwijl de hoge, opvallend smalle romp sterk afhelt, van de hoge bultige voorschouft naar het veel lagere kruis. De lange staart draagt een kwast. Op de lange, alhoewel sierlijke kop, staan de S-vormig gebogen, hoekige horens.

Het Noordafrikaans Hartebeest is lichtrood gekleurd. Dit dier is uitgeroeid. Het laatste exemplaar is in 1923 in de Parijse dierentuin gestorven.



240. — Noordafrikaanse Hartebeest - Bubale de Jackson

240. BUBALE DE JACKSON

Alcelaphus buselophus

Dans la tribu des bubales, on distingue trois groupes principaux, soit les bubales proprement dits (n° 240 et 241), les antilopes à cornes lyriformes (n° 242 et 243) et les gnous (n° 244).

Les bubales sont des habitants des savanes et des steppes. Ils ont des formes disproportionnées. La tête est étirée et étroite, tandis que le corps, haut et remarquablement étroit descend en pente, du garrot gibbeux vers l'arrière-train beaucoup plus bas. La longue queue se termine sur une houppie.

Sur la tête gracieuse, bien que longue, il y a des cornes anguleusement recourbées en forme de S. Le Bubale de Jackson était de coloration rouge-clair. L'animal est exterminé, le dernier individu étant mort en captivité en 1923 au jardin zoologique de Paris.

241. LICHTENSTEINS HARTEBEEST

Alcelaphus lichtensteinii

Het Lichtensteins Hartebeest of Konzi komt uit de binnenlanden van Mozambique. Het is een grote soort, met een glanzend kastanjebruin « zadel » over de rug en geelbruine flanken. De horens zijn kort en opvallend dik aan de basis.


De hartebeesten leven in voedselrijke streken in grote groepen, dikwijls in gezelschap van zebra's, Grant- en Thomson-gazellen en struisvogels. Wanneer één dier van de groep schrikt, slaat de ganse kudde op de vlucht. Worden ze in 't nauw gedreven, dan storten ze zich als stieren op hun vervolgers. In de bronsttijd kunnen de mannetjes hevig vechten, waarbij dan de horens kletterend tegen elkaar slaan.

241. BUBALE DE LICHTENSTEIN


Alcelaphus lichtensteinii

Le Bubale de Lichtenstein ou Konzi est originaire de l'intérieur de la Mozambique. C'est une grande espèce, avec une « selle » brun-marron brillante sur le dos. Les flancs sont jaune-brun. Les cornes sont courtes, remarquablement grosses à la base.

Les bubales vivent dans les régions les plus riches en nourriture, par grands troupeaux, souvent en compagnie de zèbres, de gazelles de Grant et de Thomson et d'autruches. Lorsque l'un des individus est effrayé, toute la troupe prend la fuite. Quand ils sont acculés, ils se jettent sur leurs poursuivants, comme des taureaux. Pendant le période du rut, les mâles se livrent à de violents combats en se frappant des cornes avec grand fracas.



241. — Lichtensteinse Hartebeest - Bubale de Lichtenstein



242. — Sassaby - Antilope topi ou Hyemera

242. SASSABY

Damaliscus lunatus

De Sassaby behoort tot de lierantilopen, die hun naam danken aan de vorm van de horens. Deze antilooft heeft een zeer lange, smalle en eigenaardig gevormde kop. De haarvacht is prachtig zijdeachtig bruin, met zwarte plekken op de kop, de schouders en de dijen. De horens gaan vanaf de basis reeds ver uit elkaar. Dit dier komt nog vrij talrijk voor in de steppen tussen de Oranjerivier en Nyassaland.

242. ANTILOPE TOPI ou HYEMERA

Damaliscus lunatus

L'Antilope topi appartient aux antilopes à cornes lyriformes. Elle a une tête très longue, étroite et de forme bizarre. La robe est d'un brun soyeux magnifique, avec des taches noires sur la tête, les épaules et les cuisses. Dès la base, les cornes s'écartent largement. L'animal se rencontre encore en assez grand nombre dans les savanes entre la rivière Orange et le Nyassaland.

243. BLESBOK

Damaliscus pygargus

De Blesbok is een lierantilooft, die vroeger in groot aantal de steppen van Zuid-Afrika bevolkte. De blanken hebben niettemin kans gezien deze grote massa's uit te roeien. Nog enkele honderden stuks werden gespaard en leven in reservaten en op farms in Oranje-Vrijstaat en Transvaal. De blesbok onderscheidt zich door een grote witte spiegel en een witte bles.



243. — Blesbok - Blesbok

243. BLESBOK

Damaliscus pygargus

Le Blesbok est également une antilope à cornes lyriformes qui autrefois peuplait les savanes de l'Afrique du Sud en nombre impressionnant. Les Blancs ont profité de ces concentrations pour pratiquement exterminer ces grandes masses d'ongulés. Seuls quelques centaines d'individus ont été épargnés et vivent actuellement dans des réserves et sur des « farms » de l'Etat libre d'Orange et du Transvaal.


Le blesbok se distingue par un grand miroir blanc ainsi que par un chanfrein blanc.

244. WITBAARDGNOE

Connochaetes taurinus

De horens van een gnoe gelijken op die van een buffel, terwijl het lijf en de staart heel veel weg hebben van die van een paard. De Witbaardgnoe heeft, naast de typische zwarte staart, nog witgele halsmanen. Hij mist het eigenaardige huidklierveld onder de ogen, dat de andere gnoes wel hebben. Hij verspreidt bijgevolg niet de typische geur om soortgenoten te helpen de groep terug te vinden.

De naam « gnoe » werd door de Hottentotten gegeven en is ontleend aan het geluid dat het dier laat horen. Wanneer een gnoe onrustig is, klinkt een gebrom en gebries, waarbij dikwijls met een voorpoot wordt gestampt. De Boeren noemen het dier ook « wildebeest » wegens zijn « bokkesprongen » en woest op hol slaan.



244. — Witbaardgnoe - Gnou à barbe blanche

244. GNOU A BARBE BLANCHE

Connochaetes taurinus

Les cornes d'un gnou ressemblent à celles d'un buffle et son corps ressemble à celui d'un cheval, dont il a aussi la queue.

En plus de cette queue noire et typique, le Gnou à barbe blanche a une crinière jaune-blanc. Le champ de glandes cutanées spécifiques en dessous des yeux, qui caractérisent les autres gnous, font défaut chez lui. En conséquence l'animal ne répand pas l'odeur « sui generis », qui aide ses congénères à retrouver le troupeau lorsqu'ils s'en sont écartés.

Le nom « gnou » lui a été conféré par les Hottentots et est dérivé du bruit que fait entendre l'animal. Lorsque le gnou est inquiet, il fait retentir des grondements et des hennissements, souvent accompagnés de trépidations d'une patte antérieure. Les Boers appellent l'animal aussi « Wildebeest » (bête sauvage) à cause de ses cabrioles et sa façon sauvage de s'emballer.

245. BRUINE WATERBOK

Kobus defassa

De waterbokken onderscheiden zich door de gebogen en aan de punten samenlopende horens van de mannetjes. De staart reikt tot aan de hielen en is voorzien van een kwast.

Waterbokken leven in open landschappen nabij water, en zijn van Senegal tot aan de Kaap verspreid. Soms komen ze ook wel voor in droge steppen of kaal bergland.

De Bruine Waterbok leeft in de steppen van Gambia, dwars door Afrika tot Oost-Soedan en van daar zuidwaarts langs het Kongo-bekken.

Hij voelt zich thuis in het moeras en nabij het water; hij staat vaak midden in een rivier.

245. DEFASSA ou WATERBUCK


Kobus defassa

Les Defassas se distinguent par leurs cornes courbées, dont les extrémités se rejoignent. La queue atteint les talons et se termine sur une houppe.

Les Waterbucks vivent dans des régions découvertes tout près de l'eau et sont répandus du Sénégal jusqu'au Cap. Parfois ils se rencontrent également dans les savanes arides ou dans des régions montagneuses dénudées.

Le waterbuck brun vit dans les savanes de la Gambie, à travers toute l'Afrique jusqu'au Sénégal oriental et de là, vers le sud, le long du bassin du Congo.

Il se sent chez lui dans les marais et près de l'eau. On le voit souvent debout, au milieu d'une rivière.



245. — Bruine Waterbok - Defassa ou Waterbuck



246. — Lechwe - Cob des marais ou Lechwe

246. LECHWE

Onotragus leche

De Lechwe behoort tot de zogenaamde « bastaardwaterbokken ». Deze zijn lichter gebouwd dan de echte waterbokken. In grootte komen ze ongeveer overeen met damherten.

De kleur van de vacht is rossig zandgeel met wit aan de ogen, de kin, de borst en de buik. De poten zijn van voren zwart.

De lechwe leeft in het Zambesigebied. Hij verwijderd zich nooit ver van het water, en wanneer er gevaar dreigt, vlucht hij het water in. Samen met de sitatoenga (n° 230) is hij de antilope die het meest aan het water gehecht is. Hij is trouwens een zeer goede zwemmer.

246. COB DES MARAIS ou LECHWE

Onotragus leche

Le Cob des marais appartient au groupe désigné sous le nom de « waterbucks bâtards ». Ceux-ci sont plus légèrement bâtis que les vrais « waterbucks ». Par la taille ils ressemblent aux daims.


La robe est jaune-sable roux avec du blanc aux yeux, au menton, à la poitrine et au ventre. La partie antérieure des pattes est noire.

Le Lechwe vit dans la région zambésienne, il ne s'éloigne jamais fort loin de l'eau et, en cas de danger, il s'y réfugie. Avec le situtunga (n° 230), c'est l'antilope la plus liée à un habitat aquatique. C'est aussi un excellent nageur.

247. KOB-WATERBOK

Adenota

De Kob-waterbokken zijn veel kleiner dan de vorige waterbokken. Ze bewonen Equatoriaal Afrika van Guinea tot Oeganda. De kob-waterbok, met zijn roodbruine vacht, heeft lange horens die een beetje S-vormig gebogen zijn. Dit dier leeft in kleine kuddes op open grasland aan de rand van moeras- en laagland.



247. — Kob-waterbok - Kob de Thomas

247. KOB DE THOMAS

Adenota

Les kobs aquatiques sont beaucoup plus petits que les waterbucks précédents. Ils habitent l'Afrique équatoriale, de la Guinée à l'Uganda.

Le Kob de Thomas, avec sa robe bigarrée, a de longues cornes, quelque peu recourbées en forme de S.

L'animal vit par petits troupeaux dans des herbages découverts au bord de marécages et des plaines basses.

248. RIETBOK

Redunca

Tot de rietbokken behoren wel de kleinste waterboksoorten.

De Rietbok leeft in open landschappen met rietgras begroeid, ten zuiden van de Sahara. De kleur van de vacht gaat van grijs tot levendig roodbruin. De pluimstaart is langs onder wit en wordt bij het vluchten rechtop gehouden. De horens zijn recht, alleen aan de punt wat naar voren gebogen.

De rietbok vlucht niet in het water, hij schuwt het eerder. Hij zoekt dekking in het droge rietveld, of zelfs in korenvelden, wanneer hij daartoe de gelegenheid krijgt.



248. — Rietbok - Antilope des Roseaux ou Bohor

248. ANTILOPE DES ROSEAUX ou BOHOR

Redunca

Les plus petits des waterbucks appartiennent au groupe des antilopes des roseaux.

Le Bohor vit dans les paysages découverts, couverts de laïches, au sud du Sahara. La couleur du pelage va du gris au rouge-brun vif. La queue en éventail est blanche en dessous et est tenue dressée lors de la fuite. Les cornes sont droites, quelque peu courbées en avant aux pointes.

L'Antilope des roseaux ne se réfugie pas dans l'eau, elle la craint plutôt. Elle cherche du couvert dans des champs de roseaux fanés et même dans des champs de blé, lorsqu'elle en a l'occasion.

249. KLIPSPRINGER

Oreotragus

De Klipspringer leeft in paren op de rotsen van de hooglanden, van 600 tot 2.500 m hoog. Hij komt voor in bijna alle gebergten van Afrika, vanaf Ethiopië tot in het zuid-westen. Door zijn levenswijze, en eveneens door zekere kenmerken van de lichaamsbouw, nl. die van de schedel, herinnert hij aan de gems.

De haren van de pels zijn dik en hol. De vacht is mooi getekend, olijfgroen-zwart gespikkeld. De binnenzijde van de oren vertoont een opvallende signaaltekening.

Opvallend is ook dat dit kleine diertje steeds op de punten van de hoefjes loopt. Het springt met een ongelooflijke snelheid van de ene rotspunt op de andere. De klipspringer eet gras en planten.


249. SAUTEUR DES ROCHES

Oreotragus


Le Sauter des roches vit par paires sur les rochers des régions élevées, à des altitudes allant de 600 à 2.500 m. Il est présent dans la presque totalité des montagnes de l'Afrique, depuis l'Abyssinie jusque dans le sud-ouest. Par son genre de vie et également par certains caractères de structure, par exemple ceux du crâne, il rappelle le chamois.

Les poils du pelage sont gros et creux. Le pelage montre de jolis dessins : tacheté de jaune-olive-noir. L'intérieur des oreilles contient un dessin-signal original. Il mange de l'herbe et du feuillage.

Le façon de courir de ce petit animal est remarquable : toujours sur la pointe de ses petits sabots. Il saute avec une vitesse incroyable d'une pointe de rocher à l'autre.



249. — Klipspringer - Sauter des roches



250. — Oribie - Oribi

250. ORIBIE

Ourebia

De Oribie en de vlakbok (n° 251) behoren ook, zoals de klipspringer (n° 249) tot de groep van de dwergspringers. De mannetjes worden gekenmerkt door hun korte en rechte horentjes. Het zijn meestal kleine antilopen: de grootste is niet groter dan een gems, de kleinste is iets groter dan een haas (dwergantiloop n° 252).

De oribie bewoont de steppen van Afrika. De haarvacht is vosrood, met een sneeuw-witte buikzijde. Hij steekt niet ver boven het hoge gras uit; bij gevaar springt hij telkens zeer hoog naar boven, waarschijnlijk om zijn omgeving te verkennen. De oribies leven meestal in paren, goed verborgen door het hoge gras.

250. ORIBI

Ourebia

L'Oribi et le raphicère (n° 251), ainsi que le sauteur des roches (n° 249), appartiennent au groupe des sauteurs nains. On reconnaît les mâles à leurs petites cornes courtes et droites. Ce sont généralement des antilopes de petite taille; la plus grande ne dépasse pas la taille du chamois, tandis que la plus petite, l'antilope naine (n° 252) est un peu plus grande qu'un lièvre.

L'oribi habite les savanes de l'Afrique. La livrée est fauve-rouge, la partie ventrale d'un blanc neigeux. Il ne dépasse pas de beaucoup les hautes herbes et, en cas de danger, il exécute des bonds énormes, sans doute pour reconnaître les alentours.


Les oribis vivent presque toujours par couples, bien cachés par les hautes graminées.

251. VLAKBOK

Raphicerus

De Vlakbok is wat kleiner dan de oribie (n° 250). Het mannetje draagt de typische rechte horentjes van de dwergspringers. De vlakbok leidt een verborgen leven in het dichte struikgewas in de nabijheid van water. Zijn verspreidingsgebied is Zuid- en Oost-Afrika.

Er zijn twee vormen te onderscheiden bij de vlakbokken. De Boeren noemen ze respectiefflijk de steenbok (*R. campestris*) en de grijsbok (*R. melanotis*). Beide vormen zijn vosrood van kleur. De grijsbok heeft witte haren in de pels en bij de steenbok ontbreken de bijhoeffjes.



251. — Vlakbok - Raphicère

251. RAPHICERE

Raphicerus

Le Raphicère est encore plus menu que l'oribi (n° 250). Le mâle porte les petites cornes droites des sauteurs nains. Le raphicère mène une vie cachée dans les broussailles touffues, à proximité de l'eau. Son aire de dispersion est le sud et l'est de l'Afrique.

On connaît deux formes de raphicères. Les Boers les appellent « Steenbok » (*R. campestris*), et « Grijsbok » (*R. melanotis*). Les deux formes sont de coloration fauve-renard. Chez le second, il y a des poils blancs dans le pelage, tandis que chez le premier, les sabots latéraux font défaut.

252. DWERGANTILOOP

Hylornus batesi

De Dwergantilopen zijn wel de kleinste evenhoevige herkauwers. De schouderhoogte bereikt slechts 25 cm. De rechte horentjes zijn maar 3,5 cm lang. Het zijn roodbruin gekleurde diertjes, die zeer behendig het struikgewas doorsluipen. De onderzijde van het lichaam is spierwit. De allerkleinste soort is de hier afgebeelde Bates-springer, die nog kleiner is dan de bekende Royal-antiloop van de Goudkust. De Bates-springer leeft in het oerwoudgebied van equatoriaal West-Afrika.



252. — Dwergantiloop - Hylornus ou Antilope naine

252. HYLARNUS ou ANTILOPE NAIN

Hylornus batesi

Les Antilopes naines sont, sans aucun doute, les plus petits des ruminants artiodactyles. La hauteur au garrot ne dépasse pas 25 cm. Les petites cornes droites n'ont qu'une longueur de 3,5 cm. Ce sont de petits animaux de coloration rouge-brun, qui se coulent très adroitement entre les broussailles. Le dessous du corps est blanc comme neige. L'espèce la plus petite est l'Hylarnus de Bates, figuré ici, qui est encore plus menu que l'antilope royale bien connue de la Côte d'Or. L'hylarnus vit dans la région des forêts vierges de l'Afrique tropicale occidentale.

253. GIRAFGAZELLE


Litocranius

Als men aan een gazelle denkt, ziet men een sierlijk, lichtvoetig dier voor ogen. De meeste gazellen zijn trouwens zo. De Girafgazelle en de gazellen uit Tibet en Mongolië vallen evenwel een beetje uit de toon. De girafgazelle heeft haar naam niet gestolen: kijken we maar naar de lange hals en de lange poten! De haarvacht is aan de bovenkant roodbruin en onderaan geelbruin. De girafgazelle leeft in de droge mimosabossen, vanaf zuidelijk Ethiopië en Somaliland tot Tanganjika. Zij is een bladeter. Is de hals nog niet lang genoeg om tot aan de bladeren te reiken dan gaat zij op de achterpoten staan, terwijl zij met de voorpoten tegen de boom steunt.

253. GAZELLE GIRAFOÏDE ou GUERÉNOUK

Litocranius

Lorsqu'on évoque la silhouette d'une gazelle, on se représente un animal gracieux, léger. La plupart des gazelles présentent en effet cet aspect, mais le Guéré nouk et les gazelles du Thibet et de la Mongolie s'en écartent quelque peu. La Gazelle girafoïde n'a pas volé son nom. Regardons seulement ce long cou et ces hautes pattes. Le pelage est rouge-brun au dessus, jaune-brun en dessous. Le guéré nouk vit dans les bois arides de mimosées, depuis l'Abyssinie méridionale et la Somalie jusqu'au Tanganika. Il se nourrit de feuillage. Lorsque le cou n'est pas long assez pour atteindre les feuilles, il se dresse sur les pattes de derrière, en s'appuyant contre l'arbre avec les pattes antérieures.



253. — Girafgazelle - Gazelle girafoïde ou Guéré nouk



254. — Springbok - Springbok

254. SPRINGBOK

Antidorcas

De Springbok bewoont de halfwoeste vlakten van Zuid-Afrika. Gewoonlijk leeft hij in kleine kuddes van enkele exemplaren. Deze kleinere kuddes verenigen zich tot grote bendes ter gelegenheid van de trek, op zoek naar betere graslanden. Ze worden dan vaak achtervolgd door leeuwen, luipaarden of hyena's die vermoeide of zieke dieren aanvallen.

De springbok draagt achteraan de rug een beurs, gevormd door een huidplooi, bedekt met zeer lange haren. De springbok heeft waarlijk zijn naam niet gestolen: hij kan sprongen maken van 5 tot 7 meter. Bij het springen, en ook wanneer het dier wordt opgehitst, ontplooit zich de ruzzak en vormt aldus een witte kam. De springbok is het nationale dier van Zuid-Afrika.

254. SPRINGBOK

Antidorcas

Le Springbok habite les plaines semi-désertiques de l'Afrique du Sud. Le plus souvent il vit par petits troupeaux de quelques individus. Ces petits troupeaux se réunissent en grandes bandes lors des migrations, à la recherche de meilleurs pâturages. C'est à ces occasions qu'ils sont souvent poursuivis par des lions, des léopards ou des hyènes, qui attaquent les animaux fatigués ou malades.

Sur le dos du springbok se trouve une bourse, formée par un repli de la peau, recouverte de très longs poils. Le springbok n'a pas volé son nom. Il est capable d'effectuer des bonds de 5 à 7 m. Pendant qu'il exécute ces sauts, ou encore lorsque l'animal est excité, la poche dorsale se déploie et forme ainsi une crête blanche.

Le springbok est l'animal national de l'Afrique du Sud.

255. GAZELLE

Gazella dama

Er zijn meer dan vijftig verschillende vormen van gazellen beschreven. Ze gelijken allemaal wel goed op elkaar. In grootte komen ze overeen met reeën. Zowel de mannetjes als de wijfjes dragen liervormig gebogen horens.

De afgebeelde vorm is de Dama-gazelle. Haar mooie haarvacht is roodbruin en wit van kleur, de poten zijn rank en hoog. Het gezichtsmasker is duidelijk getekend, en de witte vlek van het kruis strekt zich puntvormig uit op de rug. Er zijn van deze soort verschillende ondersoorten bekend in Noordwest-Afrika.



255. — Gazelle - Gazelle Dama

255. GAZELLE DAMA

Gazella dama

Plus de cinquante formes de gazelles ont été décrites, bien que toutes se ressemblent assez bien. Par la taille elles se rapprochent du chevreuil. Les femelles aussi bien que les mâles portent des cornes recourbées en forme de lyre.

La forme représentée est la Gazelle Dama. La jolie livrée est brun-rouge et blanche, les pattes sont grêles et hautes. Le dessin du masque est très distinct et la tache blanche sur la croupe s'étend en partie sur le dos. Dans le nord-ouest de l'Afrique l'on connaît plusieurs sous-espèces de cette espèce.

256. IMPALA of PALA

Aepyceros

Bij de Pala dragen de wijfjes geen horens, terwijl die van de mannetjes soms prachtig ontwikkeld zijn.

Kenmerkend voor dit dier zijn de borstels aan de hielen van de achterpoten. Deze borstels zijn gevormd door speciale klieren, die omringd zijn door lange, zwarte haren.

De pala's verblijven in de steppen of in de struikgewasbossen van Oost-Afrika. Ze leven in kuddes van enkele stuks, waaronder slechts één volwassen mannetje. De jonge mannetjes verenigen zich in aparte kuddes.

256. IMPALA, PALA, ou MPALA

Aepyceros

Chez les Impalas, les femelles ne sont pas pourvues de cornes, tandis que celles du mâle sont parfois magnifiquement développées.

Les touffes aux talons des membres postérieurs sont caractéristiques pour ces animaux. Ces touffes sont formées par des glandes particulières, entourées de longs poils noirs.

Les impalas vivent dans les savanes ou les bois broussailleux de l'est de l'Afrique. Ils vivent par troupeaux de quelques individus, parmi lesquels il n'y a qu'un seul mâle. Les mâles subadultes se réunissent en des troupeaux séparés.



256 — Impala of Pala - Impala, Pala ou Mpala

257. GEMS

Rupicapra

Bij de Gems dragen beide geslachten typische horens die aan de top haakvormig zijn omgebogen. Dit dier is een goede bergbeklimmer. Het wordt thans beschermd en verzorgd door jachtopzichters. Het verspreidingsgebied van de verschillende rassen strekt zich uit over de hogere gebieden van de Alpen, de Appenijnen, de Abruzzes, de Pyreneeën, de Karpaten, Klein-Azië, de Kaukasus en Noord-Iran.

De gems is in de zomer roodbruin tot geel, in de bronstijd (november tot december) zwartbruin tot zwart met lange rugmanen. Op kop en hals staan veel witte haren. Bij het mannetje zwellen in de bronstijd twee in de nek gelegen klieren op en verspreiden een sterke bokkegeur.

257. CHAMOIS ou ISARD

Rupicapra

Chez les Chamois les deux sexes sont pourvus de cornes typiques, uniformes aux extrémités. Ces animaux sont de bons alpinistes. Actuellement ils sont protégés et surveillés par des gardes-chasse. L'aire de dispersion des différentes races s'étend sur les parties les plus élevées des Alpes, des Appenins, des Abruzzes, des Pyrénées, des Carpathes, de l'Asie Mineure, du Caucase et du nord de l'Iran.

En été, le chamois est brun-rouge à jaunâtre, à l'époque du rut (novembre à décembre) brun-noir à noir, avec une longue crinière dorsale. A la tête et au cou, il y a une grande quantité de poils blancs. A l'époque du rut, deux glandes situées au cou du mâle, gonflent et répandent une forte odeur de bouc.



257. — Gems - Chamois ou Isard



258. — Sneeuwgeit - Chèvre des Montagnes Rocheuses

258. SNEEUWGEIT

Oreamnos

De Sneeuwgeit of Sneeuwgems kan in verschillende zones tot op hoogten van 4.000 m worden aangetroffen. Het dier komt voor in het Noordamerikaanse Rotsgebergte, van Alaska tot Montana. Zowel in de zomer als in de winter draagt de sneeuwgeit een dichte vacht van lange witte haren. De horens lijken op die van een geit. Wanneer ze achtervolgd wordt, toont de sneeuwgeit een ongelooflijke klimkunst, niettegenstaande haar grootte en gewicht. Mannetjes en wijfjes leven in kleine roedels bijeen. In mei zonderen de drachtige wijfjes zich af om hun jongen ter wereld te brengen.

258. CHEVRE DES MONTAGNES ROCHEUSES


Oreamnos

La Chèvre des Montagnes Rocheuses se rencontre dans des zones différentes, à des altitudes pouvant aller jusqu'à 4.000 m. L'animal habite les Montagnes Rocheuses de l'Amérique du Nord, depuis l'Alaska jusqu'au Montana. Aussi bien en été qu'en hiver, le pelage de la chèvre des Montagnes Rocheuses est touffu et composé de longs poils blancs. Les cornes ressemblent à celles de la chèvre. Lorsqu'elle est poursuivie, elle fait preuve d'exceptionnelles qualités d'escaladeuse, nonobstant sa taille et son poids. Mâles et femelles vivent ensemble par hardes. Au mois de mai, les femelles s'isolent pour la mise bas des petits.

259. RUNDERGEMS

Budorcas taxicolor

De Rundergems behoort tot een oude diersoort. Zij is een overblijfsel van een eens talrijk en wijd verspreid geslacht. De rundergems is een merkwaardig dier, men zou zeggen een soort combinatie van verschillende hoordieren: muskusos, gems, geit, rund en gnoe. Zij leeft in het gebergte van Zuidoost-Azië en China. Zij klimt zeer goed, ook al maakt zij een wat plumpe indruk. De kop hangt bij het gaan naar omlaag.



259. — Rundergems - Takine

259. TAKINE

Budorcas taxicolor

Le Takine appartient à une forme animale archaïque. Il est le vestige d'une espèce autrefois très nombreuse et très répandue.

Le takine est un animal remarquable, on dirait un ramassis de plusieurs bêtes à cornes: bœuf musqué, chamois, chèvre, bovidé et gnoe. Il vit dans les montagnes du sud-est de l'Asie et de Chine. Il est excellent grimpeur malgré son aspect quelque peu trapu. Pendant la marche, la tête est tenue baissée.

260. BEZOARGEIT

Capra aegayrus

De Bezoargeit bezit de typische geitesik. Zij is krachtiger gebouwd dan de huisgeit. De vacht is roestbruin en wordt naar de buik toe lichter. De horens zijn zijdelings samengedrukt en van dikke knobbels voorzien; ze krommen zich naar achter en bij de volwassen bokken vormen ze zelfs een halve cirkel.

De bezoargeit leeft nu nog op de bergen van Kreta en in West-Azië; groepen van 40 tot 50 stuks grazen op de bergweiden.



260. — Bezoargeit - Chèvre sauvage de Perse

260. CHEVRE SAUVAGE DE PERSE

Capra aegayrus

La Chèvre sauvage de Perse possède la barbe typique de l'espèce. Elle est plus fortement bâtie que la chèvre domestique. Le pelage est brun-rouille. La coloration du ventre en est plus claire. Les cornes sont latéralement comprimées et fortement bosselées; elles sont recourbées vers l'arrière et, chez les boucs adultes, elles forment même un demi-cercle.

Les chèvres sauvages de Perse vivent encore actuellement dans les montagnes de Crète et en Asie occidentale. Par groupes de 40 à 50 individus, elles broutent dans les pâturages alpestres.

261. TOER

Capra turus

De Toer leeft in het oostelijk deel van de Kaukasus. Hij is van de steenbok te onderscheiden door de eigenaardige horens, die namelijk de dwarsribbels missen.

De baard of « geitesik » is bij de toer weinig opvallend.

Het aantal nog levende toers wordt geschat op 2 à 3.000 dieren.

261. BOUQUETIN CAUCASIEN

Capra turus

Le Bouquetin caucasien vit dans la partie orientale du Caucase. Il se distingue du bouquetin européen par une particularité des cornes, sur lesquelles les cannelures transversales font défaut. Chez le bouquetin, la « barbe de chèvre » typique est peu apparente.

Le nombre de bouquetins caucasiens vivant encore actuellement, est estimé à deux ou trois mille exemplaires.



261. — Toer - Bouquetin caucasien



262. — Moeflon - Mouflon d'Europe

262. MOUFLON D'EUROPE

Ovis musimon

Le Mouflon d'Europe, mouton sauvage européen, vit encore dans les montagnes de la Sardaigne et de la Corse. Cet animal possède de grandes cornes recourbées vers l'arrière. Celles-ci peuvent atteindre une longueur de 85 cm chez les mâles et peser jusqu'à 5 kg, tandis que les femelles n'en portent pas ou tout au plus de très courtes, d'une longueur de 5 à 6 cm. La coloration des mouflons est d'un beau brun marron. Sur le dos du mâle, le bélier, il y a généralement une selle d'un blanc sale.

Cet animal a été réintroduit en Europe Centrale, où il vécut autrefois dans les steppes boisées des pays montagneux. Les mouflons vivent par hardes sous la conduite du bouc le plus fort.

263. POLO-SCHAAP

Ovis poli

Het Polo-schaap werd genoemd naar de ontdekker Marco Polo. Het is een zeer groot schaap, dat de gestalte bereikt van ons edelhert. De horens zijn ook reusachtig groot, en kunnen 170-190 cm meten. Aan de basis bereiken ze een omtrek van 40 cm.

Het polo-schaap is een bergdier van Centraal-Azië, dat tot op hoogten van 6.000 m kan worden aangetroffen. Niettegenstaande zijn grootte is het een behendig klimmer. De geslachten leven gescheiden. Alleen tegen de bronsttijd, in de winter, zoeken ze elkaar op.



263. — Polo-schaap - Marco Polo

262. MOEFLON

Ovis musimon

De Moeflon, een Europees wild schaap, leeft nog op de bergen van Sardinië en Korsika. Dit dier heeft grote naar achter gebogen horens. Deze horens kunnen bij het mannetje 85 cm lang worden en tot 5 kg wegen, terwijl de wijfjes er geen dragen of slechts horens van 5 tot 6 cm lang bezitten. De moeflon is mooi kastanjebruin gekleurd. De ram (het mannetje) heeft meestal op de rug een vuilwit zadel.

Dit dier werd in Midden-Europa ingevoerd, waar het vroeger leefde in de bossteppen van de gebergten. De moeflon leeft in roedels onder de leiding van een sterke bok.

263. MARCO POLO

Ovis poli

Ce mouton sauvage doit son nom à l'explorateur Marco Polo. Il s'agit d'un très grand mouton sauvage, qui atteint la taille de notre cerf. Les cornes également sont gigantesques et peuvent mesurer entre 170 et 190 cm. A la base, elles ont une circonférence de 40 cm.

Le Marco Polo est un animal des montagnes de l'Asie Centrale, qui peut se rencontrer à des altitudes de 6.000 m. Malgré sa taille, c'est un excellent grimpeur. Les sexes vivent séparés. Ce n'est qu'à l'époque du rut, en hiver, qu'ils recherchent la compagnie des représentants de l'autre sexe.

264. AFRIKAANSE ZEEKOE

Trichechus senegalensis

De Afrikaanse Zeekoe heeft een ronde staart. Ze wordt ook Lamantijn genoemd. Ze zwemt ver de rivieren op, zo ver zelfs dat er in het Tsaad-meer worden aangetroffen. De rug van het dier is donkerblauw, de buik is lichter gekleurd. De lengte van een volwassen dier gaat van 3 tot 5 meter.

De zeekoe leeft van waterplanten. In de dierentuin eet ze sla, witloof en andijvie. Ze heeft een gespleten, beweeglijke en behaarde bovenlip, waarvan de twee helften worden gebruikt als grijporganen bij het plukken van waterplanten. De vinnen helpen ook wel bij het in de bek duwen van het voedsel.

Het wijfje werpt normaal één jong, zelden twee.



264. — Afrikaanse Zeekoe - Lamantin africain

264. LAMANTIN AFRICAIN

Trichechus senegalensis

Le Lamantin africain a une queue arrondie. Il est également appelé « vache marine ». Il remonte les rivières, si loin même qu'on l'a retrouvé jusque dans le lac Tchad. Le dos de l'animal est bleu foncé, le ventre est plus clair. La longueur de l'animal adulte varie entre 3 et 5 mètres.

Le lamantin africain se nourrit de plantes aquatiques. Au jardin zoologique, il mange de la salade, de la chicorée et des endives. La lèvre supérieure est tendue, mobile et poilue. Les deux moitiés sont utilisés comme organes de préhension lors de la cueillette des plantes aquatiques. Les nageoires sont également utilisées pour pousser la nourriture dans la gueule.

La femelle met au monde un petit, rarement deux.

265. ZWARTACHTIGE BOOMDAMAN

Dendrohyrax dorsalis

De Zwartachtige Boomdaman is een boomklipdas, een echt boomedier. Hij leeft in West- en Centraal-Afrika, en eet vooral bladeren en vruchten. Het is een nachtdier, dat zich schuilt in boomholten.

De vacht is zwart met een lange, licht gekleurde rugstreep. Een ideale plaats voor een boomedier is een hoge oerwoudboom, die overwoekerd wordt door varens, orchideeën, mossen, korstmossen en lianen. Daar vindt het dier al wat het maar wensen kan.

De boomklipdassen maken een merkwaardig geluid. Het begint met een soort gekwaak, dat overgaat in een gegil als dat van varkens. Daartussen klinken nog schrille fluittonen.


265. DAMAN ABORICOLE NOIRÂTRE

Dendrohyrax dorsalis

Le Daman noirâtre, comme son nom l'indique, est un daman des arbres, un animal arboricole complet. Sa nourriture principale se compose de feuilles et de fruits. Il vit en Afrique occidentale et centrale.

C'est un animal nocturne, qui se réfugie dans des creux d'arbre. Le pelage est noir avec une longue rayure dorsale claire. L'endroit de prédilection du daman arboricole est un arbre élevé de la forêt vierge, envahi par une végétation luxuriante de fougères, d'orchidées, de mousses, de lichens et de lianes. Ici l'animal trouve tout ce qu'il peut désirer.

Les damans arboricoles émettent des bruits très curieux. Cela commence par une sorte de coassement, passant à des cris perçants, comme ceux des cochons, entrecoupés de sifflements aigus.



265. — Zwartachtige Boomedier - Daman arboricole noirâtre



266. — Daman der lava's van Kivoe - Daman des laves du Kivu

266. DAMAN DER LAVA'S VAN KIVOE

Dendrohyrax arboreus

Deze daman behoort tot hetzelfde geslacht als de vorige (n° 265). Hij is ook een boomklipdas. Gewoonten en levenswijze komen overeen met deze van de boomdaman. Hij verschilt er o.a. van door de kleur van de vacht, die bij deze daman donker grijsbruin is. Voor enkele andere kenmerken, zie n° 265.

Deze daman komt zeer talrijk voor op de gestolde lava van de vulkanen nabij het Kivoemeer. De Europeanen noemen dat dier verkeerdelijk de « lava-rat ». In andere gebieden van Kongo leeft het hoofdzakelijk in dichte bossen of beboste savannen.

266. DAMAN DES LAVES DU KIVU

Dendrohyrax arboreus

Ce daman appartient à la même espèce que le précédent (n° 265). Il s'agit également d'un daman arboricole. Les mœurs et le genre de vie de cet animal correspondent à ceux du daman arboricole. Il en diffère e.a. par la couleur du pelage qui est gris-brun foncé. Pour d'autres caractéristiques, voir le n° 265.


Ce daman se rencontre en grand nombre sur la lave solidifiée des volcans près du lac Kivu. C'est à tort que les Européens appellent cet animal « rat des laves ». Dans d'autres régions du Congo, il vit surtout dans des bois touffus ou des savanes boisées.

267. AFRIKAANSE OLIFANT

Loxodonta africanus

De Afrikaanse Olifant heeft een laag en bol voorhoofd. De driehoekige oorschelpen zijn zeer groot. Dit dier kan wel 3,70 m hoog worden en tot 6.000 - 7.000 kg wegen. De enorme stoottanden of slagstanden zijn sterk ontwikkelde snijtanden en geen hoektanden. Bij deze olifant kunnen de stoottanden elk een gewicht van 100 kg bereiken. De poten zijn echte zuilen. De teentoppen zijn omgeven door hoefjes, vier aan de voorpoten, drie aan de achterpoten. De olifant steunt niet op deze hoefjes, maar wel op een eeltkussen, onder vingers en tenen gelegen, dat het gewicht elastisch opvangt.

De Afrikaanse olifant is een steppedier. Hij leeft in kudden, onder leiding van een oude bul. De draagtijd duurt 20-24 maanden. Het jong is slechts na 9 tot 10 jaar geslachtsrijp. De maximum leeftijd is 50-60 jaar.



267. — Afrikaanse Olifant - Eléphant d'Afrique

267. ELEPHANT D'AFRIQUE

Loxodonta africanus

Le front de l'éléphant d'Afrique est bas et convexe. Les pavillons d'oreille triangulaires sont très grands. Cet animal peut atteindre une hauteur de 3,70 m et peser de 6.000 à 7.000 kg. Les énormes défenses sont des incisives fortement développées et non pas des canines. Chez cet éléphant, les défenses peuvent atteindre un poids de 100 kg chacune. Les pattes sont de véritables piliers. Le bout des doigts est entouré de petits sabots, quatre aux pattes antérieures, trois aux pattes postérieures. L'éléphant ne s'appuie pas sur ces sabots, mais sur une pelote calleuse située sous les doigts et les orteils, qui sert de tampon amortisseur au poids énorme de l'animal.

L'éléphant d'Afrique est un animal des savanes. Il vit par troupes, sous la conduite d'un vieux mâle. La gestation dure de 20 à 24 mois. Ce n'est qu'au bout de 9 à 10 ans que le petit est pubère. La longévité est de 50 à 60 ans au maximum.


268. INDISCHE OLIFANT

Elephas indicus

De Indische Olifant onderscheidt zich van de Afrikaanse door zijn hoog en hol voorhoofd. Zijn oorschelpen zijn kleiner en ietwat vierhoekig. Hij is ook kleiner : 3 m hoog en 4.000 kg zwaar.

Deze olifant heeft aan de voorpoten vijf hoefjes, aan de achterpoten vier. De stootanden van de mannetjes zijn hoogstens 1 m lang, terwijl ze bij de wijfjes nog kleiner zijn en vroeg uitvallen.

De Indische olifant is een bosbewoner. Hij leeft in kudden van 10-20 dieren, onder de leiding van een oude koe, die een jong heeft. De bullen schijnen in de omgeving van de kudde rond te dwalen. Buiten de mens heeft de olifant geen vijanden. Langzaam maar zeker worden de olifanten teruggedrongen naar natuurreservaten en dierentuinen. In de vrije natuur wordt hun bestaan ten zeerste bedreigd.



268. — Indische Olifant - Eléphant indien

268. ELEPHANT INDIEN

Elephas indicus

L'Eléphant indien se distingue de celui d'Afrique par son front haut et concave. Les pavillons d'oreille sont plus petits et quelque peu quadrangulaires. En outre il est plus petit : hauteur 3 m et poids 4.000 kg.

Cet éléphant a cinq petits sabots aux pattes antérieures et quatre aux pattes postérieures. Les défenses du mâle ont tout au plus 1 m, tandis que celles des femelles sont encore plus courtes et tombent prématurément. L'éléphant indien est un habitant des bois. Il vit par troupes de 10-20 animaux, sous la conduite d'une femelle suitée. Il semble que les mâles rôdent aux alentours du troupeau.

A part l'homme, l'éléphant n'a pas d'ennemi. Lentement mais sûrement, les éléphants sont refoulés vers les réserves naturelles et les jardins zoologiques. Dans la nature, leur existence est de plus en plus menacée.

269. AARDVARKEN

Orycteropus

Nu leven er nog alleen Aardvarken in Midden- en Zuid-Afrika. In vroegere tijdperken kwamen ze ook voor in Europa en Azië. Er zijn wel verschillende ondersoorten gekend in Afrika.

Aardvarken bewonen boomarme streken, steppen en savannen. In dichte bossen komen ze niet voor.

Een juiste beschrijving geven van dit dier is moeilijk. In elke houding maakt het een andere indruk. Het lichaam is gedrongen, de rug gebogen en de lange staart herinnert aan die van een kangoeroe. Het aardvarken steunt ook wel eens op deze staart. Op de kop staan « ezelsoren ». De snuit doet aan die van een varken denken, maar is langer gerekt. De beharing is erg verschillend : soms nagenoeg afwezig, dan weer een spaarzame beharing. Er zijn zelfs aardvarken met een donker haarkleed. Met het klimaat hebben deze verschillen niets te maken. Het voedsel bestaat uit insecten, vooral termieten. Aardvarken zijn nachtdieren. Overdag slapen ze in holen in de grond, die ze zelf uitgraven.

269. ORYCTEROPE

Orycteropus

Actuellement, les Oryctérope ne vivent plus qu'en Afrique centrale et méridionale. A des époques reculées, ils vivaient également en Europe et en Asie. En Afrique on en connaît plusieurs sous-espèces.

Les oryctéropes habitent des régions pauvres en arbres, des steppes et des savanes. On ne les rencontre pas dans les bois touffus.

Donner une description exacte de cet animal est difficile. Dans chacune de ses attitudes, il provoque une impression différente. Le corps est ramassé, le dos est courbé et la longue queue rappelle celle du kangourou, d'ailleurs l'oryctérope s'appuie parfois dessus. A la tête il y a des « oreilles d'âne ». Le museau fait penser au groin d'un cochon, mais il est plus étiré. Le revêtement pileux également est très variable : parfois à peu près absent, parfois parcimonieusement distribué. Il y a aussi des exemplaires au pelage foncé. Ces différences n'ont aucun rapport avec le climat. La nourriture se compose d'insectes, principalement de termites.

Les oryctéropes sont des animaux nocturnes. Pendant la journée, ils dorment dans des trous qu'ils creusent eux-mêmes.



269. — Aardvarken - Oryctérope



270. — Grote Miereneter - Grand Fourmilier

270. GROTE MIERENETER

Myrmecophaga

De Grote Miereneter is een zeer eigenaardig dier. Zijn langharige staart kan wel tot 1 m lang worden. De totale lengte is ongeveer 2,30 m. De vacht is donkergrijs. Een driehoekige, zwarte, witgerande vlek loopt van de borst naar de achterzijde van de rug. De hersenen zijn maar klein.

Voor vijanden moet het dier niet vrezen, daar het zeer snel is in zijn reacties. De gespierde voorpoten, met hun scherpe klauwen, zijn uitstekende verdedigingsorganen.

De grote miereneter komt voor in de beboste delen van Zuid-Amerika. Hij voedt zich hoofdzakelijk met mieren, termieten en insecten. Hij maakt een opening in een termietenheuvel, een mierenhoop of een boomstronk die door insecten bewoond is. De lange tong wordt in de opening gestoken en de insecten blijven er aan kleven.

Het wijfje werpt één jong af, dat gedurende zijn eerste levensmaanden op de rug wordt gedragen.

270. GRAND FOURMILIER

Myrmecophaga

Le Grand Fourmilier est un animal d'apparence bizarre. Sa queue à longs poils peut avoir une longueur de 1 m. La longueur totale est de 2,30 m environ. Le pelage est gris foncé. Une tache triangulaire noire, bordée de blanc, part de la poitrine pour aboutir à la naissance de la queue. Le cerveau est plutôt petit.

L'animal ne doit pas beaucoup craindre des ennemis, car il est très rapide dans ses réactions. Les pattes antérieures musclées, avec leurs griffes acérées sont d'excellents organes défensifs.

Le grand fourmilier se rencontre dans les régions boisées de l'Amérique du Sud. Il se nourrit essentiellement de fourmis, de termites et d'insectes. Il pratique une ouverture dans une termitière, une fourmilière ou dans un tronc d'arbre habité par des insectes. La longue langue gluante, à laquelle les insectes restent collés, est ensuite introduite dans l'ouverture.

La femelle met au monde un unique petit qui, pendant les premiers mois de son existence, est porté sur le dos.

271. TAMANDOEIA

Tamandua

De Tamandoeia is kleiner dan de grote miereneter. Zijn snuit is ook korter, terwijl de oren evenwel groter zijn.

De tamandoeia is een boombewoner van Zuid-Amerika. Zijn staart is dan ook een grijpstaart. De haakvormige klauwen helpen eveneens bij het klimmen. In de bomen zoekt deze behendige klimmer naar termieten en mieren, die hun nesten hebben in stammen, takken of tussen slingerplanten. De kleur en tekening van de haarvacht van de tamandoeia verschillen van streek tot streek. Opvallend is zijn enorme lichaamskracht. Hij verdedigt zich zoals de grote miereneter: hij gaat rechtop zitten en slaat tegelijkertijd met beide armen krachtig toe.



271. — Tamandoeia - Tamandua tétradactyle

271. TAMANDUA TETRADACTYLE

Tamandua

Le Tamandua tétradactyle est plus petit que le grand fourmilier. Son museau est plus court, tandis que les oreilles sont plus grandes.

Le tamandua est un animal arboricole de l'Amérique du Sud, dont la queue est préhensile. Les griffes crochues lui sont également utiles pour grimper. C'est dans les arbres que ce grimpeur habile recherche les termites et les fourmis qui font leur nid dans les troncs, dans les branches ou entre les plantes grimpantes. La coloration et les dessins du pelage varient assez bien de région à région. La vigueur du tamandua est remarquable. Il se défend comme le grand fourmilier: il se dresse sur son séant et il frappe en même temps énergiquement de ses deux pattes antérieures.

272. DWERGMIERENETER

Cyclopes

De Dwergmiereneter wordt niet groter dan een eekhoorn. De korte snuit is een weinig gebogen. De vacht is zacht en meestal roodachtig bruin. De dwergmiereneter is een nachtdier van de tropische bossen van Zuid-Amerika en het eiland Trinidad. Zijn staart is een echte rolstaart, die aan het uiteinde naakt is.

Het jong wordt door de ouders op de rug gedragen en gevoed met een pap van vermorzelde insecten, die uit de maag der ouders wordt opgebraakt.

Deze miereneter kan iemand lelijke wonden toebrengen.



272. — Dwergmiereneter - Fourmilier nain ou Cyclope didactyle

272. FOURMILIER NAIN ou CYCLOPE DIDACTYLE

Cyclopes

Le Fourmilier nain ne devient pas plus grand qu'un écureuil. Le museau court est légèrement recourbé. Le pelage doux est généralement brun rougeâtre. Le fourmilier nain est un animal nocturne des bois tropicaux de l'Amérique du Sud et de l'île Trinidad. Sa queue est une véritable queue préhensile, dont l'extrémité est nue.

Le petit est porté sur le dos des parents, qui le nourrissent d'une bouillie d'insectes écrasés, régurgitée de l'estomac des parents.

Ce fourmilier peut infliger de vilaines blessures.

273. TWEEVINGERIGE LUIAARD

Choloepus didactylus

De Tweevingerige Luiard heeft een eigenaardig voorkomen, zoals hij daar hangt in de bomen, met de rug naar beneden. Het ruige, wollige haar ligt in strengen en kan op de rug wel 15 cm lang worden. Het haarkleed is bedekt met allerlei andere organismen. In en op het haar van dit dier leven drie verschillende, aan onze meelmotten verwante vlindertjes. Ook blauwe en groene wieren leven op de vacht en verlenen er een goede schutkleur aan. De snuit is kort. De tanden bezitten geen email en groeien steeds door. De voorste ledematen dragen twee sikkelvormige klauwen, de achterste hebben er drie.

De luiard is een traag dier. Hij eet, slaapt en paart in de bomen. Het verspreidingsgebied gaat over Midden- en Zuid-Amerika, van Nicaragua tot ongeveer 25° zuiderbreedte.

273. PARESSEUX DIDACTYLE

Choloepus didactylus

Le Paresseux didactyle est d'apparence bizarre, suspendu comme il est dans les arbres, le dos tourné vers le sol. Les poils hirsutes et laineux, sont disposés par tresses et peuvent avoir une longueur de 15 cm sur le dos. Le pelage est couvert de toutes sortes d'autres organismes. Dans et sur la fourrure de cet animal vivent trois espèces de petits papillons, apparentés à nos mites de la farine. Des algues bleues et vertes vivent également sur le pelage et lui confèrent une excellente coloration de camouflage.

Le museau est court. Les dents sont dépourvues d'email et croissent continuellement. Les membres antérieurs sont pourvus de deux griffes falciformes, les postérieurs en ont trois.

Le paresseux est un animal lent. Il vit, dort et s'accouple dans les arbres. L'aire de dispersion s'étend sur l'Amérique Centrale et du Sud, du Nicaragua à environ 25° de latitude sud.



273. — Tweevingerige Luiard - Paresseux didactyle



274. — Drievingerige Luiaard of Aï - Paresseux Tridactyle

274. DRIEVINGERIGE LUIAARD of Aï

Bradypus tridactylus

De Drievingerige Luiaard of Aï is kleiner dan de vorige soort. De haarvacht is in gevangenschap zilver- tot asgrauw, in de vrije natuur echter groen door de algen. Het mannetje heeft op de rug een gele vlek en wordt daarom ook wel zonne-luiaard genoemd.

Deze dieren bezitten, in tegenstelling met andere zoogdieren, niet zeven maar negen halswervels. Zo zijn ze in staat hun kop over wel 180° te draaien.

Er is gewoonlijk maar één jong per worp. Dit diertje is bij de geboorte niet veel groter dan een duim en het klimt gedurende vele weken op het lichaam van de moeder rond.

274. PARESSEUX TRIDACTYLE

Bradypus tridactylus

Le Paresseux tridactyle ou Aï est plus petit que l'espèce précédente. En captivité, le pelage est gris argenté ou gris cendré; dans la nature cependant, il est vert à cause des algues. Sur le dos du mâle, il y a une tache jaune et cela lui vaut d'être parfois appelé « paresseux solaire ».

Contrairement aux autres mammifères, ces animaux n'ont pas sept, mais bien neuf vertèbres cervicales, de sorte qu'ils ont la possibilité de tourner la tête à plus de 180°.

Généralement il n'y a qu'un petit par portée. A la naissance, celui-ci n'est pas beaucoup plus grand qu'un pouce et, pendant de longues semaines, il circule sur le corps de sa mère.

275. BRUINBEHAARDE GORDELDIER

Chaetophractus villosus

Dit is het Bruinbehaarde Gordeldier dat gewoonlijk in dierentuinen wordt aangetroffen. Het leeft in Bolivië, Chili, Argentinië en Uruguay.

Het dier kan, ook in gevangenschap, tot 15 jaar oud worden. Het is meer behaard dan de andere gordeldieren. We kunnen haren zien te voorschijn komen tussen de verschillende gordels. Ook de ledematen en de buik zijn bedekt met lichtbruine haren.

Het bruinbehaarde gordeldier eet hoofdzakelijk insecten.



275. — Bruinbehaarde Gordeldier - Quirquincho ou Tatou velu

275. QUIRQUINCHO ou TATOU VELU

Chaetophractus villosus

Le Quirquincho est le Tatou que l'on rencontre généralement dans les jardins zoologiques. Il vit en Bolivie, au Chili, en Argentine et en Uruguay.

L'animal peut atteindre l'âge de 15 ans, même en captivité. Il est plus velu que les autres tatous. On peut voir apparaître les poils entre les diverses bandes. Les membres et le ventre sont également couverts de poils brun-clair.

Le quirquincho se nourrit essentiellement d'insectes.

276. REUZENGORDELDIER

Priodontes

Het Reuzengordeldier is wel het grootste gordeldier. Het leeft in de oerwouden van het Amazonegebied, vooral in de nabijheid van rivieren. Het volwassen reuzengordeldier kan wel 1 m lang worden en zijn klauwen bereiken dan een lengte van 12 cm. Het dier is in staat zich bijna helemaal op te rollen. Dikwijls zit het echter op achterpoten en staart, terwijl de voorpoten de grond openkrabben.

Het reuzengordeldier heeft wel 90 tot 100 kleine tanden. Het is dus zeker niet « tandarm ».



276. — Reuzengordeldier - Tatou géant

276. TATOU GEANT

Priodontes

Le Tatou géant est sans nul doute le plus grand des tatous ou armadilles. Il vit dans les forêts vierges de l'Amazonie, surtout à proximité de l'eau. L'animal adulte peut avoir une longueur de 1 m tandis que ses griffes atteignent une longueur de 12 cm. L'animal est capable de se rouler presque entièrement en boule. Souvent cependant il se tient assis sur les pattes postérieures et la queue, tandis que les pattes antérieures grattent le sol. Le tatou géant possède bien 90 à 100 petites dents. Ce n'est donc certainement pas un « édenté ».

277. KAALSTAARTGORDELDIER

Cabassous unicinctus

Het Kaalstaartgordeldier leeft in het vochtige oerbos. De staart is enkel aan de bovenkant bedekt met huidschilden, verder is hij naakt. De kop is zeer klein en draagt grote, ronde oorschelpen.

Dit dier eet hoofdzakelijk insecten. Het is een goede graver en kan reusachtige gangen aanleggen, tot wel vijf meter diep. Het pantser beschermt het tegen vijanden, maar ook tegen de druk van de aarde.

Het hier afgebeelde dier leeft in Guyana, Brazilië, Paraguay en Peru.

277. CABASSOU

Cabassous unicinctus

Le Cabassou vit dans la forêt vierge humide. La queue n'est recouverte de plaques cutanées que sur le dessus, pour le reste elle est nue. La tête est très petite et porte de grands pavillons d'oreille arrondis.

Cet animal dévore presque exclusivement des insectes. Il est très bon fouisseur et il est capable de creuser des galeries d'une grande étendue et jusqu'à des profondeurs de près de cinq mètres. La carapace le protège contre ses ennemis, mais également contre l'énorme pression de la terre.

L'animal représenté vit aux Guyanes, au Brésil, au Paraguay et au Pérou.



277. — Kaalstaartgordeldier - Cabassou



278. — Kogelgordeldier - Tatou « Mataco » ou « Apaza »

278. KOGELGORDELDIER

Tolypeutes conoruss

De Kogelgordeldieren worden ook Apaza's genoemd. Het zijn kleine dieren, van 40 tot 50 cm lang. Bij gevaar rollen ze zich, zoals een egel, op tot een kogel. Kop en staart passen daar dan precies in. Ze krabben voortdurend in de grond, op zoek naar insecten. Gangen graven ze niet. Het kogelgordeldier loopt op de toppen van de tenen. In opgerolde toestand heeft het niet veel vijanden te vrezen. Alleen de jagoeear en de Andeswolf kunnen de bek zo ver opensperren, dat ze de kogel met één beet kunnen openbreken.

278. TATOU « MATACO » ou « APAZA »

Tolypeutes conoruss

Les Matacos ou Apazas sont de petits animaux d'une longueur de 40 à 50 cm. En cas de danger, ils se roulent en boule, comme des hérissons. La tête et la queue s'y adaptent complètement. Continuellement, ils grattent le sol à la recherche d'insectes. Ils ne creusent pas des galeries. Ces tatous courent sur le bout des doigts. Roulés en boule ils ne doivent redouter presque aucun ennemi. Seuls le jaguar et le loup des Andes sont capables d'ouvrir une gueule large assez pour pouvoir ouvrir la boule d'un coup de dent.

279. NEGENGORDELIG GORDELDIER

Dasyus novemcinctus

Het Negengordelig of Langstaartig Gordeldier heeft kleine en zachte, bijna leerachtige schubben. Bij gevaar kan het dier zeer vlug zijn, en zich zeer snel ingraven. De oorschelpen zijn groot. Het gehoor is nochtans niet bepaald goed ontwikkeld. Het belangrijkste zintuig is de neus. De voortplanting gebeurt op een merkwaardige wijze. Uit één eicel ontwikkelen zich wel vier embryo's, die dus later een identieke vierling vormen. Het negengordelig gordeldier leeft in Zuid-Amerika, niet alleen in het oerwoud, maar ook in de steppen en zelfs tot op zeer grote hoogten in het bergland.



279. — Negengordelig Gordeldier - Tatou à neuf bandes

279. TATOU A NEUF BANDES

Dasyus novemcinctus

Le Tatou à neuf bandes ou à longue queue possède des écailles douces presque comme du cuir. En cas de danger, cet animal sait être très agile et s'enfuit rapidement. Les pavillons d'oreille sont grands. Malgré cela, l'ouïe n'est pas très fine, le sens le plus développé étant l'odorat.

La reproduction se fait d'une façon curieuse. Jusqu'à quatre embryons peuvent se développer à partir d'un seul ovule, qui plus tard donneront naissance à des quadruplés identiques.

Le tatou à neuf bandes vit en Amérique du Sud, non seulement dans la forêt vierge, mais également dans les savanes et même jusqu'à des altitudes très élevées dans les montagnes.

280. ZESGORDELIG GORDELDIER

Dasypus sexcinctus

Het Zesgordelig Gordeldier heeft tussen het rug- en schouderpantser zes brede gordels. Het is een nachtdier, dat overdag in zijn hol slaapt, soms wel twee meter onder de grond. Het voedsel bestaat voornamelijk uit insecten. Naast insecten worden ook nog allerlei planten verorberd.

Na een draagtijd van twee maanden, brengt het wijfje twee jongen ter wereld, en dit meestal tweemaal per jaar.

Evenals de andere soorten is het zesgordelig gordeldier een bewoner van Zuid-Amerika.



L.H.

280. — Zesgordelig Gordeldier - Tatou à six bandes

280. TATOU A SIX BANDES

Dasypus sexcinctus

Le Tatou à six bandes a, entre la carapace de l'épaule et celle du dos, six larges bandes. C'est un animal nocturne qui dort dans son terrier pendant la journée. Celui-ci est parfois situé à près de 2 m sous terre. La nourriture principale consiste en insectes. A côté de ces insectes, il dévore également toutes sortes de plantes.

Après une portée de deux mois, la femelle met au monde deux petits et ceci généralement deux fois par an. Tout comme les espèces précédentes, le tatou à six bandes est un habitant de l'Amérique du Sud.

281. MAZZA-GORDELDIER

Dasypus Mazzai

Over het Mazza-gordeldier is slechts weinig geweten. Dit dier werd pas in 1938 ontdekt. Het leeft in de valleien van Noordoost-Argentinië, vooral in de streek van Salta, maar misschien komt het ook in andere gebieden voor.


Het Mazza-gordeldier heeft acht gordels. Het is tamelijk groot in vergelijking met de meeste andere soorten. De oren zijn nogal plat, en de staart eindigt op een punt.

281. MOULITA A LONGUES OREILLES

Dasypus Mazzai

On ne connaît que fort peu de choses au sujet du Moulita à longues oreilles. Cet animal n'a été découvert qu'en 1938. Il vit dans les vallées du Nord-est de l'Argentine, principalement dans la région de Salta, mais il est fort possible que l'on peut le rencontrer dans d'autres régions encore.

Le moulita a huit bandes. Il est de taille relativement grande en comparaison avec la plupart des autres espèces. Les oreilles sont plutôt aplaties et la queue se termine en pointe.



L.H.

281. — Mazza-gordeldier - Moulita à longues oreilles



282. — Harig Gordeldier - Tatou velu

282. HARIG GORDELDIER

Cryptophractus pilosus

Bij het Harig Gordeldier is het lichaam zozeer bedekt met haren, dat de gordels van het pantser haast niet meer zichtbaar zijn. Vooral op de rug is de beharing zeer dicht. Op de buik kan men echter de buikplooien duidelijk onderscheiden. In het geheel zijn er tien gordels.

Het harig gordeldier is kleiner dan de meeste andere soorten. Het komt voor in Peru, en waarschijnlijk ook in enkele andere gebieden.

282. TATOU VELU

Cryptophractus pilosus

Le corps du Tatou velu est tellement recouvert de poils que les bandes de sa carapace ne sont presque plus visibles. C'est surtout sur le dos que cette pilosité est la plus dense. Au ventre par contre, on peut facilement distinguer les replis ventraux. En tout il y a dix bandes.

Le tatou velu est plus petit que la plupart des autres espèces. Il se rencontre au Pérou et probablement aussi dans d'autres régions.

283. GORDELMOL

Chlamyphagus truncatus

De Gordelmol of Schildmol is niet groter dan een 15 cm. Hij wordt aangetroffen in de droge streken van West-Argentinië en Bolivië. Zilverwit haar bedekt de kop en de buikzijde. Het pantser ligt grotendeels los op de rug. Het stijve achterpantser is weer met de rug vergroeid en is onbeweegbaar. Het dier is een goede graver. Wanneer er gevaar dreigt kruipt het in zijn hol; het onbeweegbare achterschild vormt een sluitstuk voor de ingang. Vooral 's nachts komt dit van pas, wanneer de schildmol aan de oppervlakte komt en zich nooit ver van zijn hol verwijdert.



283. — Gordelmol - Chlamyphore tronqué

283. CHLAMYDOPHORE TRONQUE

Chlamyphagus truncatus

La longueur du Chlamyphore tronqué ne dépasse pas 15 cm. On le rencontre dans les régions arides de l'Argentine occidentale et de la Bolivie. La tête et le ventre sont recouverts de poils d'un blanc argenté. En grande partie, la carapace repose lâchement sur le dos. Le bouclier rigide de l'arrière-corps est de nouveau soudé au dos et est immobile.


L'animal est un bon fouisseur et lorsqu'il est menacé, il se réfugie dans son terrier, le bouclier immobile de l'arrière-corps faisant office de fermeture. C'est surtout la nuit que cela lui vient bien à propos, lorsque le chlamyphore remonte à la surface tout en ne s'éloignant pas trop de l'entrée de son terrier.

284. STEPPENSCHUBDIER

Manis temmincki

Het Steppenschubdier leeft in Zuid- en Oost-Afrika. Met zijn dikke schubben heeft het iets weg van een kruipdier of reptiel.

Het steppenschubdier mist de naakte staartpunt van de volgende soorten (n° 285 en 286). Het is daarentegen een goede duiker en zwemmer en wordt over 't algemeen in de nabijheid van water gevonden. Wanneer er gevaar dreigt, kan het dier zeer lang onder water blijven. Andere manieren om zich te verdedigen zijn: zich oprollen of zich te weer stellen. De kracht van een schubdier is enorm. Bij gevaar wordt ook wel een onaangename muskusgeur afgescheiden door een klier, gelegen nabij de anus.



284. — Steppenschubdier - Pangolin africain terrestre ou géant

284. PANGOLIN AFRICAIN TERRESTRE ou GEANT

Manis temmincki

Le Pangolin terrestre ou géant vit dans le sud et l'est de l'Afrique. Avec ses grosses écailles, il a quelque peu l'aspect d'un reptile.

Chez le pangolin terrestre, l'extrémité glabre de la queue, qui caractérise les autres espèces (n° 285 - 286), fait défaut. Par contre, il est bon plongeur et nageur et se rencontre généralement à proximité de l'eau. Lorsqu'il est menacé par un danger quelconque, l'animal est capable de demeurer très longtemps sous l'eau. D'autres moyens de défense sont: s'enrouler en boule ou résister. La force d'un pangolin est énorme. En cas de danger une odeur musquée désagréable est parfois sécrétée par une glande située près de l'anus.

285. LANGSTAARTBOOMSCHUBDIER

Manis longicaudata

Het Langstaartboomschubdier leeft in West- en Centraal-Afrika. De naam wijst reeds op een bijzonder kenmerk: de lange staart, die ongeveer twee derden van de totale lengte uitmaakt. De romp met de kop heeft een lengte van 40 cm, de staart 70 cm. De schubben zijn groter dan bij het witbuikschubdier (n° 286).

Het langstaartboomschubdier is een boomedier dat uitstekend kan klimmen. De staart, waarvan de onderzijde aan de punt kaal is, is een grijpstaart. Het dier kan er zich zo goed mee vastslingeren als een slingeraap. Op de grond is het niet zo behendig. Bij gevaar rolt het dier zich op, zoals trouwens alle schubdieren.

285. PANGOLIN AFRICAIN ARBORICOLE A LONGUE QUEUE

Manis longicaudata

Le Pangolin arboricole à longue queue vit en Afrique occidentale et centrale. Le nom commun indique un détail qui lui est particulier: la longue queue, qui prend à peu près deux tiers de la longueur totale. Le corps, avec la tête, a une longueur de 40 cm, la queue mesure 70 cm. Les écailles sont plus grandes que celles du pangolin à ventre blanc (n° 286). Le pangolin à longue queue est un animal arboricole et un excellent grimpeur. La queue, dont l'extrémité est glabre en dessous, est préhensile. L'animal peut fort bien s'en servir pour s'agripper à la façon des singes voltigeurs. A terre il n'est pas aussi adroit. En cas de danger l'animal se roule en boule, comme tous les pangolins d'ailleurs.



285. — Langstaartboomschubdier - Pangolin africain arboricole à longue queue



286. — Witbuikschubdier - Pangolin africain arboricole tricuspide ou à ventre blanc

286. WITBUIKSCHUBDIER

Manis tricuspis

Het Witbuikschubdier leeft eveneens in West- en Centraal-Afrika. Ook bij dit schubdier is de staart opvallend lang. Het is tevens een boombdier, en het heeft veel gelijkenis, wat zijn levensgewoonten betreft, met het langstaartboomschubdier (n° 285). Zijn schubben zijn echter kleiner. Het witbuikschubdier is zeer algemeen in Kongo. Het schijnt zich bijna overal op te houden in bosachtige streken.

286. PANGOLIN AFRICAIN ARBORICOLE TRICUSPIDE ou A VENTRE BLANC

Manis tricuspis

Le Pangolin à ventre blanc vit également en Afrique occidentale et centrale. Chez ce pangolin aussi, la queue est très longue. Il s'agit également d'une espèce arboricole et son genre de vie correspond à beaucoup d'égards à celui du précédent (n° 285). Les écailles sont cependant plus petites. Le pangolin à ventre blanc est très commun au Congo. On le rencontrerait un peu partout dans les régions boisées.

287. GROENLANDSE WALVIS

Balaena mysticetus

De Groenlandse Walvis behoort tot de echte walvissen (Balaenidae). Bij deze dieren maakt de kop ongeveer een vierde tot een derde van de lichaamslengte uit.

De Groenlandse walvis kan 15 tot 20 m (zelden 24 m) lang zijn. De staartvin is 7,5 m breed en de plompe borstvinnen zijn 2,5 m lang. De kleur is gewoonlijk blauwzwart met een grauwwitte vlek aan de kin en dikwijls een onregelmatige band van dezelfde kleur aan de staartwortel. Soms zijn deze dieren ook gevlekt of bijna zwart. Het soortelijk gewicht is zeer laag ingevolge de dikke speklaag van ongeveer 20-25 cm. Dode dieren drijven dan ook boven.

De Groenlandse walvis werd sterk achtervolgd. Reeds in het midden van de negentiende eeuw stond het dier op uitsterven. Aan de Europese zijde van de Noordelijke IJszee is hij nagenoeg verdwenen. Er schijnen nog exemplaren te leven in de Beringzee en aan de Amerikaanse zijde van de Poolzee. De jacht op de Groenlandse walvis is sedert 1937 door een internationale overeenkomst verboden.


287. BALEINE FRANCHE

Balaena mysticetus

La Baleine franche appartient aux vraies baleines (Balénidés). Chez ces animaux, la tête prend environ un quart à un tiers de la longueur du corps.

La baleine franche peut atteindre une longueur de 15-20 m (rarement 24 m). La nageoire caudale a une longueur de 7,5 m, et les nageoires pectorales épaisses ont une longueur de 2,5 m. Généralement la coloration est bleu-noirâtre avec une tache blanc-grisâtre au menton et parfois une bande irrégulière de la même couleur au couard. Parfois aussi ces animaux sont tachetés ou presque noirs. Le poids spécifique est très bas grâce à la grosse couche de graisse de 20 à 25 cm environ. De ce fait, des animaux morts flottent à la surface de l'eau.

La baleine franche a été fortement pourchassée. Déjà au milieu du dix-neuvième siècle, l'animal était sur le point d'être exterminé. Du côté européen de la mer polaire boréale, elle semble avoir à peu près disparue. Des exemplaires existaient encore dans la mer de Behring et du côté américain de la mer polaire. La chasse à la baleine franche est interdite depuis 1937 par une convention internationale.




287. — Groenlandse Walvis - Baleine franche

288. BLAUWE VINVIS

Balaenoptera musculus

De Blauwe Vinvis is zeker het grootste nog levende dier en vermoedelijk ook de grootste soort die ooit geleefd heeft. Men heeft eens een wijfje gemeten dat 34,59 m lang was. De rug is grijs, de buik lichtgrijs tot wit, met onregelmatige, bijna donkergrijze vlekken. Op de rug bevindt zich een kleine vin, een huidplooi, die niet door been wordt gesteund.

De blauwe vinvis komt vooral voor in de zeeën rondom de Zuidpool, maar ook in de arctische wateren. In de tropen en gematigde streken is hij alleen aanwezig voor de voortplanting. Het dier onderneemt trektochten en verplaatst zich van het ene halfrond naar het andere. Het voedt zich met walvisaas of kriel, dat voornamelijk bestaat uit kleine kreeftjes. Het jong wordt geboren na een draagtijd van 10 maanden en het wordt gedurende ongeveer 8 maanden gezoogd. Bij zijn geboorte is het ongeveer 7 meter lang.



L.H

288. — Blauwe Vinvis - Baleinoptère de Sibbald ou Rorqual bleu

288. BALEINOPTERE DE SIBBALD ou RORQUAL BLEU

Balaenoptera musculus

Le Rorqual bleu est sans aucun doute le plus grand animal vivant et probablement la plus grande espèce ayant jamais existée. On a pu mesurer une femelle qui avait une longueur de 34,59 m. Le dos est gris, le ventre gris-clair à blanc, avec des taches irrégulières, presque gris-foncé. Sur le dos il y a une nageoire, un repli de la peau, qui n'est pas soutenue par des os.

Le rorqual bleu se rencontre le plus souvent dans les mers entourant le Pôle Sud, mais aussi dans les eaux arctiques. Il n'est présent, sous les tropiques et les régions tempérées, que pour la reproduction. L'animal entreprend des migrations et se rend d'un hémisphère à l'autre.

Il se nourrit de clio, plancton à baleine qui se compose essentiellement de petites crustacés.

Le petit vient au monde après une gestation de 10 mois et il est allaité pendant 8 mois environ. A sa naissance, il a une longueur de près de 7 m.

289. NOORDSE VINVIS

Balaenoptera borealis

De Noordse Vinvis wordt niet langer dan 17 m. Hij is ook wat plomper dan de vorige soort. De grote rugvin zit reeds vóór het laatste derde deel van het lichaam. De rug is blauwzwart, de buik glanzend wit, met een schijn van rood.

Het voedsel bestaat uit verschillende soorten kleine kreeftjes, die gemakkelijk blijven hangen tussen de 330 zwarte baleinen aan weerszijden in de muil. De economische waarde van de Noordse vinvissen is maar klein. Hun traanopbrengst is gering. 's Zomers leven ze in de Noordelijke en Zuidelijke poolzeeën. 's Winters komen ze tot in de tropische wateren.


289. RORQUAL DE RUDOLPHI ou DES COLINS (Merlan noir)

Balaenoptera borealis

Ce rorqual n'atteint qu'une longueur de 17 m. Il est légèrement plus trapu que l'espèce précédente. La grande nageoire dorsale se trouve déjà avant le dernier tiers du corps. Le dos est bleu-noir, le ventre blanc brillant, au reflet rouge.

La nourriture se compose de plusieurs espèces de petits crustacés, qui sont facilement retenue par les 330 fanons noirs qui pendent de part et d'autre de la gueule.

La valeur économique des Rorquals de Rudolphi est peu élevée. Leur production en huile est minime. En été ils vivent dans les mers polaires boréales et australes. En hiver ils s'aventurent jusque dans les mers tropicales.



L.H

289. — Noordse Vinvis - Rorqual de Rudolphi ou des colins (Merlan noir)



290. — Bultrug - Baleine à bosse

290. BULTRUG

Megaptera nodosa

De Bultrug is wel één der plompste walvissen. Vooral opvallend zijn de zeer lange borstvinnen, die, bij een lichaamslengte van 15 m, wel 4 m lang kunnen zijn. Aan boven- en onderkaak, bij de borstvinnen en buikplooien, heeft deze walvis knobbels, die veroorzaakt worden door allerlei parasieten (walvisluizen, zee-pokken, eendenmossels, enz.). De rug is zwart gekleurd, terwijl het wit van de buikzijde een onregelmatige tekening vertoont. Er zijn ook exemplaren die geheel zwart zijn.

De bultrug is een kosmopoliet. Vooral in warme en gematigde zeeën komt hij voor. Het voedsel bestaat uit walvisaas en kleine vissen.

290. BALEINE A BOSSE

Megaptera nodosa

La Baleine à bosse est sans aucun doute une des formes les plus lourdes de l'ordre des baleines. Ses très longues nageoires pectorales qui, pour une longueur du corps de 15 m, peuvent être longues de 4 m, sont remarquables. Aux mâchoires supérieures et inférieures, aux nageoires pectorales et aux replis ventraux de cette baleine, il y a des nodosités, causées par toutes sortes de parasites (cyames, balanes, bernacles, etc.).

Le dos est de coloration noire, tandis que le blanc du côté ventral montre un dessin irrégulier. Il y a également des individus qui sont entièrement noirs. La baleine à bosse est un cosmopolite. Elle est surtout présente dans les mers chaudes et tempérées. La nourriture se compose de clio et de petits poissons.

291. GRIJZE WALVIS

Rhachianectes glaucus

De Grijze Walvis is zo goed als uitgeroeid. Zijn verspreidingsgebied werd gevormd door de kustwateren in het noorden van de Stille Oceaan.

De kleur is blauw- tot donkergrijs, met vuilwitte vlekken, daar waar parasieten de huid hebben beschadigd.

De grijze walvis is een primitieve, weinig gespecialiseerde baardwalvis. De kop is klein, de baleinen zijn kort en staan ver uit elkaar. Lange haren staan in rijen boven en terzijde van de kop.

Daar deze walvis dicht bij de Amerikaanse kust leefde, werd er reeds vroeg op gejaagd door Indianen en Eskimo's. Door deze jacht verminderde hun aantal niet sterk. Het is pas wanneer Amerikaanse kolonisten de jacht overnamen, dat dit dier na een halve eeuw bijna uitgeroeid werd. In 1937 werden strenge maatregelen getroffen ter bescherming van de grijze walvis.



291. — Grijze Walvis - Baleine grise

291. BALEINE GRISE

Rhachianectes glaucus

La Baleine grise est quasiment exterminée. Son aire de dispersion se situait dans les eaux côtières du nord de l'océan Pacifique.

La couleur est gris bleuâtre à gris foncé, avec des taches blanc-sale, là où les parasites ont abîmé la peau.

La baleine grise est une baleine à fanons primitive, peu spécialisée. La tête est petite, les fanons sont courts et assez distants les uns des autres. Il y a des rangées de longs poils au-dessus et sur les côtés de la tête.

Comme cette baleine vivait près des côtes de l'Amérique, les Indiens et les Esquimaux ont fait la chasse depuis des époques reculées. Cette chasse cependant ne réduisait pas fortement leur nombre. Ce n'est que lorsque les colons américains ont repris la chasse, que l'animal a été presque exterminé au bout d'un demi-siècle. En 1937 des mesures de protection sévères à l'égard de la baleine grise ont été prises.


292. POTVIS

Physeter catodon

De Potvis is gemakkelijk te onderscheiden van andere walvissen door de opvallende vorm van de kop. Het is een dier van nagenoeg 15 m lang. Een derde van het grote lichaam wordt ingenomen door de min of meer vierkante kop, die tot vijf meter lang en drie meter hoog kan worden. De gewone potvis heeft de wereldliteratuur veroverd als de « Moby Dick » van de roman van Herman Melville.

Deze walvis werd sterk vervolgd, vooral door de Amerikanen. Dit dier leverde immers het spermaceti of walschot (voor het vervaardigen van kaarsen) en het kostbare amber, dat door de parfumbrikanten tegen goud werd afgewogen. Potvissen zijn zeer levendig en springen soms geheel uit het water op. Ze leven in alle warme zeeën en maken lange trektochten. Hun hoofdvoedsel bestaat uit inktvissen.

De kleur is gewoonlijk grijsachtig zwart of donker grijsbruin; de buikzijde is veel lichter, soms wel geheel wit.



292. — Potvis - Cachalot

292. CACHALOT

Physeter catodon

La Cachalot se distingue facilement des autres baleines par la forme typique de la tête. C'est un animal d'une longueur de 15 m environ. Un tiers du grand corps est pris par la tête plus ou moins quadrangulaire, qui peut avoir une longueur de cinq mètres et une hauteur de trois mètres. La cachalot commun a conquis la littérature mondiale comme « Moby Dick » du roman de Herman Melville.

Cette baleine a été fortement pourchassée, surtout par les Américains. L'animal fournissait en effet le spermaceti ou blanc de baleine (pour la fabrication de bougies) et l'ambre précieux qui valait son pesant d'or pour les fabricants de parfums.

Les cachalots sont très alertes et ils sautent parfois complètement hors de l'eau. Ils vivent dans toutes les mers chaudes et entreprennent des migrations très étendues. Leur nourriture principale se compose de seiches.

La coloration est généralement noir-grisâtre ou brun-grisâtre foncé, le côté ventral est plus clair, parfois tout à fait blanc.

293. DWERGPOTVIS

Kogia breviceps

De Dwergpotvis lijkt wel op de potvis, maar is veel kleiner (3-6 m). Zijn kop is ronder en de rugvin is sikkelvormig. In de kop zit ook spermaceti of walschot. De rug is donkerbruin tot zwart, de buik lichtgrijs tot wit.


Deze kleine potvis leeft in alle wereldzeeën behalve de beide poolzeeën. Hij behoort tot de zeer zeldzame walvisachtigen; alleen langs de Atlantische kust van Noord-Amerika wordt hij nog wel eens gesignaleerd.

293. KOGIA A TETE COURTE


Kogia breviceps

La Kogia ressemble bien au cachalot mais il est beaucoup plus petit (3-5 m); la tête est plus arrondie et la nageoire dorsale est falciforme. Sa tête contient également du blanc de baleine ou spermaceti. Le dos est brun foncé à noir, le ventre gris clair à blanc.

Ce petit cachalot vit dans toutes les mers du monde, à l'exception des deux mers polaires. Il appartient aux cétacés très rares; on le signale encore quelquefois le long des côtes atlantiques de l'Amérique du Nord.



293. — Dwergpotvis - Kogia à tête courte



294. — Butskop - Baleine à bec commune

294. BALEINE A BEC COMMUNE

Hyperoodon rostratus

La Baleine à bec appartient à la famille des dauphins longirostres, qui doivent leur nom à leur museau pointu, transformé en une sorte de bec allongé. La baleine à bec est certainement l'espèce la plus connue de cette famille. La longueur du corps atteint 8 à 9 m. Elle a été fortement pourchassée, de sorte que le nombre de baleines à bec a notablement diminué au cours du siècle dernier. De ce fait il y a eu une réduction dans la chasse; actuellement l'animal semble heureusement augmenter en nombre.

La baleine à bec se caractérise par sa tête de forme bizarre. Le bec dépasse de 30-60 cm. Le front fortement bombé le surmonte presque perpendiculairement. La tête est séparée du tronc par une légère dépression. La narine ne donne accès qu'à un seul conduit nasal, celui de droite, celui de gauche se terminant en cul de sac. La baleine à bec nage très rapidement et peut demeurer longtemps sous l'eau. On la chasse uniquement dans l'Atlantique nord.

294. BUTSKOP
Hyperoodon rostratus

De Butskop behoort tot de familie van de snaveldolfijnen, die hun naam danken aan de spitse, snavelachtig uitgegroeide snuit. De butskop is wel de bekendste soort van deze familie. De lichaamslengte bereikt 8 à 9 m. Hij werd fel achtervolgd, zodat het aantal butskoppen gedurende de laatste eeuw sterk afgenomen is. De jacht erop is dan ook verminderd; de laatste tijd schijnen deze dieren gelukkig weer wat talrijker te worden. De butskop is gekenmerkt door zijn eigenaardige kop. De snavel steekt 30-60 cm naar voren. Bijna loodrecht daarop staat het sterk gewelfde voorhoofd. De kop is gescheiden van de romp door een lichte inzinking. Het neusgat geeft slechts toegang tot één neusgang, de rechter; de linker eindigt blind. De butskop kan zeer vlug zwemmen en lang onder water blijven. Hij wordt alleen gejaagd in het noorden van de Atlantische oceaan.


295. WITTE DOLFIJN

Delphinapterus leucas

De Witte Dolfijn, ook wel Beloega genoemd, is een bewoner van de ondiepe, arctische kustwateren en riviermonden in geheel noordelijk Eurazië, Canada en Alaska.

De witte dolfijn wordt zwart geboren. Het volwassen dier is glanzend wit. Alleen de buitenkant van de staartvin is grauw-bruin. De witte dolfijn wordt 3,5 tot 5,5 m lang. Het dier heeft een duidelijke nek. Het voedsel bestaat uit inktvissen en schaaldieren.

Voor de Eskimo's en de bewoners van Noord-Siberië was de beloega vanwege zijn vlees, traan en huid, de belangrijkste walvis. Dit dier is de luidruchtigste onder al de walvissen.



295. — Witte Dolfijn - Dauphin blanc ou Belouga

295. DAUPHIN BLANC ou BELOUGA

Delphinapterus leucas

Le Dauphin blanc ou Belouga est un habitant des eaux côtières et des embouchures des rivières arctiques peu profondes de toute l'Europe septentrionale, du Canada et de l'Alaska.

A sa naissance, le dauphin blanc est noir. L'adulte est blanc brillant. Seul l'extérieur des nageoires caudales est gris brun. Il atteint une longueur de 3,5 à 5,5 m. L'animal a un cou distinct. La nourriture consiste en seiches et en crustacés.

Pour les Esquimaux et les habitants du nord de la Sibérie, le belouga était la baleine la plus importante, à cause de sa chair, de son huile et de sa peau. Cet animal est le plus bruyant de toutes les baleines.

296. NARWAL

Monodon monoceros

De Narwal behoort tot dezelfde familie als de witte dolfijn. Hij leeft in de Noordelijke IJszee en wordt 4-5,5 m lang. De kop is afgerond. Het gebit is sterk gedegeneerd. Jonge dieren hebben nog enkele snijtanden in de bovenkaak, doch deze verdwijnen spoedig. Alleen bij de mannetjes ontwikkelen de beide buitenste snijtanden, waarvan de rechter steeds weer verdwijnt. De linker groeit uit tot een 2-2,75 m lange, fraai gedraaide stoottand. Zelden worden dieren gevangen waarvan beide stoottanden goed ontwikkeld zijn. De narwal kan wel een half uur onder water blijven. Bij het spuiten laat hij een fluitend geluid horen.



296. — Narwal - Narval

296. NARVAL

Monodon monoceros

Le Narval appartient à la même famille que le dauphin blanc. Il vit dans la mer polaire boréale et atteint une longueur de 4-5,5 m. La tête est arrondie. La dentition est fortement dégénérée. Les animaux jeunes ont encore quelques incisives dans la mâchoire supérieure, mais celles-ci disparaissent rapidement. Ce n'est que chez les mâles que les deux incisives extérieures, dont celle de droite disparaît continuellement, se développent. Celle de gauche croît jusqu'à atteindre une longueur de 2-2,75 m et se présente sous la forme d'une défense joliment tournée. Très rarement on capture des animaux dont les deux défenses sont bien développées. Le narval peut demeurer près d'une demie-heure sous l'eau. Lorsqu'il souffle, il émet un bruit sifflant.

297. ZWAARDWALVIS

Orcinus orca

De Zwaardwalvis is het grootste roofdier dat op aarde leeft. Hij vreest zelfs de grootste walvis niet. Het mannetje kan wel 9 m lang worden. Het wijfje is maar half zo groot. De rugvin is zwaardvormig en kan bij de bul wel een meter hoog worden. Ook de borstvinnen zijn bijzonder groot. De kop is tamelijk klein. Het vervaarlijke gebit bestaat in elke kaakhelft uit 10-14 zeer grote, scherpe, kromme tanden. De zwaardwalvis is kosmopoliet. Hij jaagt in kuddes op grote en kleine vissen, dolfijnen, tuimelaars en robben. Zelfs de grootste walvissen valt hij aan. De zwaardwalvis is zeer behendig en snel. Hij haalt een snelheid van bijna 40 km per uur.

297. EPAULARD

Orcinus orca

L'Épaulard est le plus grand des carnassiers vivants sur la terre. Il ne craint même pas la plus grande des baleines. Le mâle peut avoir une longueur de 9 m. La femelle est de moitié plus petite. La nageoire dorsale est ensiforme et chez le mâle, elle peut atteindre une hauteur de près d'un mètre. Les nageoires pectorales sont également très grandes. La tête est plutôt petite. La dentition formidable se compose, dans chaque moitié de la mâchoire, de 10-14 très grandes dents acérées et recourbées. L'épaulard est cosmopolite. Il chasse, par troupes, des poissons de grande et de petite taille, des dauphins, des tursions et des phoques. Il attaque même les plus grandes baleines. L'épaulard est très agile et très rapide. Il atteint la vitesse de près de 40 km à l'heure.



297. — Zwaardwalvis - Epaulard



298. — Ganges-Dolfijn - Sou-sou du Gange

298. GANGES-DOLFIJN

Platanista gangetica

De Ganges-Dolfijn leeft in kleine scholen in de stroomgebieden van de Indus, Ganges en Bramapoetra. De lengte bereikt ten hoogste 2,7 m. De hals is goed ontwikkeld en het dier kan dan ook goed zijn kop zijdelings bewegen. Deze dolfijn is praktisch blind. Het oog is klein en de lens ontbreekt. Het gezicht zou toch weinig van pas komen in het troebele water waarin het dier leeft. De kleur is donkergrijs tot zwart.

De Ganges-dolfijn eet bodemvissen, mosselen, kreeftjes en andere waterdieren. Zoals bij alle rivierdolfijnen valt de smalle, snavelvormige, zeer ver uitgegroeide snuit sterk op.

298. SOU-SOU DU GANGE

Platanista gangetica

Le Sou-sou du Gange vit par petites troupes dans les bassins de l'Indus, du Gange et du Brahmapoutre. La longueur atteint tout au plus 2,70 m. Le cou est bien développé, ce qui permet à l'animal de mouvoir sa tête latéralement. Ce dauphin est pratiquement aveugle. L'œil est petit et le cristallin fait défaut. La vue serait tout de même de peu d'utilité dans les eaux bourbeuses dans lesquelles vit l'animal. La couleur est gris foncée à noire. Le sou-sou du Gange mange des poissons de fond, des moules, des écrevisses et d'autres animaux aquatiques. Comme chez tous les dauphins de rivière, son museau étroit, rostriforme, très allongé, est caractéristique.



299. — Gestreepte Eekhoorn - Ecoreuil à pattes rouges

299. GESTREEPTE EEKHOORN

Funisciurus phyrhopus

De Gestreepte Eekhoorn is een boomdier van middelmatige grootte. Het leeft in Afrika in bossen of savannen. De haarvacht is zacht en donker. De kop is langer dan bij de meeste andere Afrikaanse eekhoorns. Het is een schoon diertje, met lichte strepen op de pels. De pootjes zijn roodbruin, de buikzijde wit. Zoals de meeste eekhoorns slaat hij bij gevaar een alarmkreet: « kek-kek ». Dit gaat dan meestal gepaard met slaan van de staart. Gedurende het heetste van de dag rust hij, terwijl hij vooral actief is in de morgen en de late namiddag.

Hij eet vooral zaden, noten, vruchten, alsook wel insecten en eieren van vogels en kruidieren.

299. ECUREUIL A PATTES ROUGES

Funisciurus phyrhopus

L'Ecoreuil à pattes rouges est un animal nocturne de taille moyenne. Il vit en Afrique dans les bois et les savanes. Le pelage est doux et foncé. La tête est plus longue que chez les autres écoreuils africains. C'est un beau animal, au pelage rayé de clair. Les pattes sont rouge-brun, le ventre est blanc. Tout comme la plupart des écoreuils, en cas de danger, il émet un cri d'alarme « kek-kek », qui s'accompagne le plus souvent de battements de la queue. Pendant les heures les plus chaudes de la journée il se repose, tandis qu'il est surtout actif le matin et tard l'après-midi.

Il se nourrit principalement de graines, de noisettes, de fruits, ainsi que d'insectes, d'œufs d'oiseaux et de reptiles.

300. PALMEEKHOORN

Ratufa indica

De Palmeeekhoortjes verschillen onderling zeer in grootte en uiterlijk. Sommige, zoals bv. de Reuzeneekhoorn (hier afgebeeld), zijn zo groot als een marter. Deze reuzeneekhoorn leeft in Indië en de Indische archipel. Hij leeft in de bossen, waar hij in de boomkruinen grote nesten bouwt van bladeren en takken. Hij springt van boom tot boom op zoek naar voedsel. Alleen gedurende de heetste middaguren rust hij. Zijn sprongen kunnen wel de zes meter bereiken. In gevangenschap kan de reuzeneekhoorn zeer tam en aangenaam worden.



300. — Palmeeekhoorn - Ecureuil de Malabar

300. ECUREUIL DE MALABAR

Ratufa indica

Les Ecureuils de Malabar diffèrent beaucoup entre eux au point de vue taille et aspect. Certains, comme p. ex. l'Ecureuil géant, représenté ici, sont aussi grands qu'une martre. Cet écureuil géant vit aux Indes et dans l'archipel indien. Il vit dans les bois où il se construit de grands nids de feuilles et de branches dans la cime des arbres. Il saute d'arbre à arbre à la recherche de nourriture. Ce n'est que pendant les heures les plus chaudes, aux environs de midi, qu'il se repose. Il est capable d'effectuer des sauts de près de six mètres. En captivité l'écureuil de Malabar peut devenir très apprivoisé et de caractère très doux.

301. OLIEPALMEEKHOORN

Proroxerus Stangeri

De Oliepalmeeekhoorn heeft een lange zwart-wit gestreepte staart. Het is een tamelijk grote eekhoorn: de lichaamslengte bereikt 75 cm, de staart meegerekend. De rugzijde is donkerder dan de buikzijde. De haarvacht is dik en zacht aan de bovenkant; aan de onderkant staan er veel minder haren, en deze is dan ook bijna naakt.

Er zijn verschillende vormen van oliepalmeeekhoorns gekend, waarvan de meeste in Kongo voorkomen. Zaden, noten en vruchten maken hun hoofdvoedsel uit. Nesten worden gemaakt in boomholten. Per worp zijn er drie of vier jongen.

301. GRAND ECUREUIL A VENTRE NU

Proroxerus Stangeri

Le Grand Ecureuil à ventre nu a une longue queue rayée de noir et de blanc. C'est un écureuil assez grand: la longueur du corps atteint 75 cm, la queue comprise. Le dos est plus foncé que le ventre. Le pelage du dessus est touffu et doux. Au-dessous, il y a beaucoup moins de poils, cette partie étant presque nue.

On connaît plusieurs formes du grand écureuil à ventre nu, dont la plupart sont originaires du Congo. Des graines, des noisettes et des fruits constituent leur régime principal. Les nids sont construits dans des creux d'arbre. Il y a de trois à quatre petits par portée.



301. — Oliepalmeeekhoorn - Grand écureuil à ventre nu



302. — Gestreepte eekhoorn - Eureuil rayé des montagnes

302. GESTREEPTE EEKHOORN

Tamiscus vulcanorum

De Gestreepte Eekhoorn is tamelijk klein. De lichaamslengte, de staart meegerekend, is ongeveer 28 cm. De haarvacht is zacht. Deze soort komt vooral voor in het hooggebergte van Centraal-Afrika, rondom de grote meren. Zij is zeer karakteristiek voor het gebied der Kongolese vulkanen. Maar zelfs binnen dit gebied kunnen nog drie ondersoorten onderscheiden worden.

302. ECUREUIL RAYÉ DES MONTAGNES

Tamiscus vulcanorum

L'Eureuil rayé des montagnes est plutôt petit. La longueur de son corps, queue comprise, est de 28 cm environ. Le pelage est doux. Cette espèce se rencontre surtout sur les hautes montagnes de l'Afrique Centrale, autour des grands lacs. Elle est caractéristique pour la région des volcans congolais, mais même dans cette région on peut encore distinguer trois sous-espèces.

303. GRONDEEKHOORN

Marmota marmota

De hier afgebeelde Grondeekhoorn is de Alpenmarmot; dit dier wordt ook wel mormeldier genoemd. De Alpenmarmot leeft in haar diep in de bodem gegraven hol. Een familie bestaat gewoonlijk uit de ouders en een paar generaties nakomelingen. Dit dier leeft op grote hoogten in de Alpen en de Karpaten. Het gaat 7 à 8 maanden in winterslaap. De lichaamstemperatuur daalt dan tot 9° C. Bij gevaar laten deze dieren een doordringend gefluit horen, waarna de hele familie onder de grond verdwijnt.



303. — Grondeekhoorn - Marmotte des alpes

303. MARMOTTE DES ALPES

Marmota marmota

La Marmotte « écureuil terrestre » représenté ici, est celle des Alpes. Elle vit dans son terrier, profondément creusé sous terre. Une famille se compose généralement des parents et de quelques générations de descendants. Cet animal vit à de grandes hauteurs dans les Alpes et dans les Carpathes. Il hiberne pendant 7 à 8 mois. La température corporelle descend alors jusqu'à 9° C. En cas de danger, ces animaux émettent un sifflement perçant; à ce signal toute la famille disparaît sous terre.

304. KLEINE VLIEGENDE EEKHOORN

Sciuropterus alboniger

De Kleine Vliegende Eekhoorn leeft in Indië en op enige eilanden van Indonesië. Het is een lief diertje, nogal donkerbruin langs de rugzijde, eerder wit langs de buikzijde. De staart is mooi pluimvormig.

Dit diertje kan goed zweven tussen de bomen, dank zij de vlieghuid of patagium, die tussen voor- en achterpoten gespannen staat. Deze vlieghuid wordt gesteund door een kraakbenig staafje, dat een uitgroeisels is van de handwortel.



304. — Kleine vliegende eekhoorn - Sciuroptère bicolore

304. SCIUROPTÈRE BICOLORE

Sciuropterus alboniger

Ce petit écureuil volant vit aux Indes et dans quelques îles de l'Indonésie. C'est un gentil petit animal, assez brun foncé du côté dorsal, plutôt blanc du côté ventral. Il a une jolie queue en panache.

Le Sciuroptère bicolore plane avec facilité entre les arbres, grâce à sa membrane parachute (patagium) tendue entre les pattes antérieures et postérieures. Cette membrane est soutenue par une petite tige cartilagineuse, excroissance du poignet.

305. BEVER

Castor fiber

De Euraziatische bever, hier afgebeeld, is ongeveer 95 cm lang. De Amerikaanse bever is wat kleiner. De bever is een bekende stuwambouwer. Door deze dammen wordt het water op peil gehouden. Het gebied boven de dam heeft daardoor veel minder van droge zomers te lijden, en op deze manier ontstonden dus, met medewerking van de bever, vruchtbare landen en loofbossen.

Opvallend bij dit dier zijn de korte ledematen, de zwemvliezen tussen de tenen, en de platte staart. De staarthuid is verhoornd. De staart doet dienst als roer bij het zwemmen. Bij gevaar kloppen de bevers met de staart alarm. De bever is een sociaal dier, dat leeft en werkt in groepsverband.

305. CASTOR D'EUROPE

Castor fiber

Le Castor d'Europe, représenté ici, a une longueur d'environ 95 cm. Le castor américain est un peu moins grand. Le castor est un bâtisseur de barrages bien connu. Par l'existence de ces barrages, le niveau de l'eau est maintenu à une hauteur constante, ce qui a pour effet que la région en amont du barrage souffre beaucoup moins de la sécheresse de certains étés. C'est de cette manière que se sont développés, grâce à la collaboration des castors, des terres fertiles et des bois de feuillus.

Caractéristiques pour cet animal sont ses membres courts, les palmures entre les doigts et la queue aplatie. La peau de celle-ci est écailleuse. La queue fait office de gouvernail lors de la nage. En cas de danger, les castors frappent l'eau de la queue en signal d'alarme. Le castor est un animal sociable. Il vit et travaille en compagnie de ses congénères.



305. — Bever - Castor d'Europe



306. — Vliegende slaapmuis - Anomalure pygmée

306. VLIEGENDE SLAAPMUIS

Idiurus

De Vliegende Slaapmuis heeft haar naam niet gestolen. Het dier bezit immers een vlieghuid en in grootte en uiterlijk heeft het veel weg van een hazelmuis. De staart is opvallend lang. Zonder kwast is hij al anderhalf maal zo lang als kop en romp samen. De onderkant van de staart draagt kleine, tandvormige hoornschubben. Op de staart staan drie rijen lange rechtopstaande haren, die de staart tot een zeer goed stuurapparaat maken bij het vliegen. Dit is echter geen echt vliegen, maar veeleer een zweven; de familie waartoe dit dier behoort (stekelstaarteeekhoorns), wordt dan ook ten onrechte Afrikaanse vliegende eekhoorns genoemd.

De vliegende slaapmuis leeft in grote troepen in hoge bomen. Zij eet vermoedelijk meer insecten dan plantaardig voedsel.

306. ANOMALURE PYGMEE

Idiurus

Cet « écureuil volant » mérite bien son nom. L'animal est en effet pourvu d'une membrane parachute. Par la taille et par l'aspect, il ressemble assez bien au muscardin. La queue est remarquablement longue; sans panache, sa longueur dépasse déjà de plus de la moitié celle de la tête et du corps réunis. La côté inférieur de la queue porte de petites écailles cornées, denticulées. Sur la queue se dressent trois rangées de poils rigides, qui font de celle-ci un très bon gouvernail pendant le vol. Il ne s'agit cependant pas d'un vol proprement dit, mais plutôt d'un vol plané, et la famille à laquelle appartient l'animal (anomalures), est à tort appelée « écureuils volants africains ».

L'Anomalure pygmée vit par grandes bandes dans les arbres élevés. Il mange probablement plus d'insectes que de la nourriture végétale.



307. — Grijs stekelstaarteeekhoorn - Petit anomalure gris

307. GRIJZE STEKELSTAARTEEKHOORN

Anomalurus pusillus

De Grijs Stekelstaarteeekhoorn behoort tot dezelfde familie als de vliegende slaapmuis (n° 306). Het is een echt boomedier, dat klimt als een spanrups. De staart doet dienst als vijfde poot.

Zijn naam heeft dit dier te danken aan de puntige hoornschubben, waarmee de onderzijde van de staart bedekt is. Zijn voedsel bestaat uit bladeren, noten en bloemen. De stekelstaarteeekhoorn gaat 's nachts op zoek naar voedsel. Er zijn vele vormen en verschillende kleurvariëteiten gekend.

307. PETIT ANOMALURE GRIS

Anomalurus pusillus

Le Petit Anomalure gris appartient à la même famille que l'anomalure pygmée (n° 306). C'est un animal arboricole complet. Il grimpe comme la chenille arpeuse. La queue fait office de cinquième membre.

Le côté inférieur de la queue est couvert d'écailles cornées pointues. La nourriture se compose de feuillage, de noix et de fleurs. Le petit anomalure gris sort la nuit, à la recherche de nourriture. On en connaît plusieurs formes et variétés de coloration.

308. WITBUIKSTEKELSTAARTEEKHOORN

Anomalurus neavei

De Witbukstekelstaartekhoorn behoort tot hetzelfde geslacht als de vorige soort (n° 307). De buikzijde is zeer licht van kleur, bijna wit. De rugzijde is grijs, de keel bruinachtig.

Deze eekhoorn is wat groter dan de vorige en heeft een lichaamslengte van 70 cm, terwijl de grijze stekelstaartekhoorn slechts een lengte bereikt van 40 cm.

De witbukstekelstaartekhoorn leeft in de savannen van Katanga en omliggende streken.

308. ANOMALURE A VENTRE BLANC DU KATANGA

Anomalurus neavei

L'Anomalure à ventre blanc du Katanga appartient à la même espèce que la précédente (n° 307). Le côté ventral est de coloration très claire, presque blanche. Le dos est gris, la gorge brunâtre.

Cet anomalure est un peu plus grand que le précédent, et la longueur du corps est de 70 cm, tandis que le petit anomalure gris atteint à peine 40 cm. L'anomalure à ventre blanc vit dans les savanes du Katanga et de régions avoisinantes.



308. — Witbukstekelstaartekhoorn
Anomalure à ventre blanc du Katanga

309. SPRINGHAAS

Pedetes caffer

De Springhaas gelijkt eigenlijk weinig op andere knaagdieren, en het is moeilijk het dier een juiste systematische plaats te geven in het dierenrijk. De springhaas heeft een haasachtige kop en achterpoten. Hij is een goede springer. Bij de vlucht kan hij sprongen maken van 6 tot 10 meter. Zijn oorschelpen zijn wel lang, doch gelijken niet op die van een haas. De bekendste vorm is wel de hier afgebeelde Kaapse Springhaas, die in de woestijnen woont van de Kaap tot Angola en Uniamwesi.

De vacht is bruinachtig geel, de onderzijde wit. Zowel de knaagtanden als de kiezen groeien even hard aan als ze afslijten.

De springhaas is een nachtdier en eet vooral wortels, loof, vruchten en insecten. Hij is zeer gevaarlijk voor cultuurgewassen.

309. PEDETE ou LIEVRE SAUTEUR

Pedetes caffer

Le Pédète ressemble en fait fort peu aux autres rongeurs et il est difficile de lui attribuer une place systématique exacte dans le règne animal.

Le Lièvre sauteur a une tête et des pattes léporines. Il est très bon sauteur. Lorsqu'il est poursuivi, il peut effectuer des bonds de 6 à 10 m. Ses pavillons d'oreille, bien que longs, ne ressemblent nullement à ceux du lièvre. La forme la plus connue est certainement celle du lièvre sauteur du Cap (représenté ici), qui habite les déserts, depuis le Cap jusqu'à l'Angola et l'Uniamwezi.

Le pelage est jaune brunâtre, le ventre est blanc. Les canines aussi bien que les dents mâchelières croissent aussi rapidement qu'elles ne s'usent.

Le pédète est un animal nocturne et il mange surtout des racines, de la verdure, des fruits et des insectes. Il est très nuisible aux plantes cultivées.



309. — Springhaas - Pédète ou lièvre sauteur



310. — Oost-Kongolese springmuis - La gerboise de l'Est du Congo

310. OOST-KONGOLESE SPRINGMUIS

Tatera nigrita

De Oost-Kongolese Springmuis behoort tot de woelmuisachtigen. Het is een savanne-bewoner van Oost-Kongo. De kleur van de haarvacht is aan de buikzijde zeer licht, aan de rugzijde donkerder. De staart is langs onder bruinachtig, soms zelfs zwart. De pootjes zijn over 't algemeen wit. De lichaamslengte varieert tussen 12 en 17 cm. Deze diertjes zijn gevaarlijk daar ze de pest kunnen verspreiden. Het zijn nachtdiertjes. Ze graven vaak ingewikkelde nesten, tot op diepten van één meter, met verscheidene in- en uitgangen. Hun voedsel bestaat uit zaden, groene plantendelen, wortels, insecten.

310. LA GERBOISE DE L'EST DU CONGO

Tatera nigrita

La Gerboise de l'est du Congo appartient aux arvicolidés (campagnols). C'est un habitant des savanes de l'est du Congo. La coloration du pelage est très légère sur le ventre, plus foncée sur le dos. Le côté inférieur de la queue est brunâtre, parfois même noir. Les pattes sont généralement blanches. La longueur du corps varie de 12 à 17 cm.

Ces petits animaux sont dangereux, car ils peuvent propager la peste. Ce sont des animaux nocturnes. Ils creusent souvent des nids compliqués, jusqu'à des profondeurs d'un mètre, avec plusieurs entrées et sorties. Leur nourriture consiste en graines, parties vertes de plantes, racines, insectes, etc.

311. ZWARTE RAT

Rattus rattus

De Zwarte Rat behoort tot de familie van de muizen van de Oude Wereld. Deze familie telt wel zeventig geslachten. Het geslacht « Rattus » zou meer dan 550 vormen omvatten.

De zwarte rat is een zeer taai dier. Jongen, die in lichaamsbouw of gedrag abnormaal zijn, worden aan hun lot overgelaten. Niettegenstaande dit feit gaan ze er niet op achteruit wat hun aantal betreft, dit ingevolge hun zeer grote vruchtbaarheid.

De zwarte rat is schadelijk: eerst en vooral door haar grote eetlust, vervolgens door het overbrengen van ziektekiemen, en door het feit dat ze alles besnuffelt en aanvreet.

De zwarte rat is waarschijnlijk afkomstig uit Zuid-oost-Azië. Reeds voor de Romeinse tijd begonnen die ratten hun zwerftocht en kwamen ze met schepen de Europese havens binnen. De schade die ze in alle landen aanrichten belooft zeker in de miljarden. Ook in België komt de zwarte rat voor (zie Album « Dieren van België », n° 32).



311. — Zwarte rat - Rat noir congolais

311. RAT NOIR CONGOLAIS

Rattus rattus

Le Rat noir appartient à la famille des muridés de l'ancien monde. Cette famille compte au moins une septantaine d'espèces. L'espèce Rattus comprendrait plus de 550 formes.

Le rat noir est un animal très résistant. Des petits, dont la structure ou le comportement sont anormaux sont abandonnés à leur sort. Malgré cela ils ne rétrogradent pas en ce qui concerne leur nombre, car ils sont très prolifiques.

Le rat noir est très nuisible, d'abord par son appétit énorme, ensuite parce qu'il est vecteur d'infections et par le fait qu'il flaire et qu'il ronge tout ce qu'il rencontre.

Le rat noir est probablement originaire du sud-est de l'Asie. Dès avant l'époque romaine, ces rats ont commencé leurs vagabondages et, à bord de bateaux, ils ont pénétré dans les ports européens.

Les dégâts qu'ils commettent dans tous les pays peuvent se chiffrer par des milliards. Le rat noir se rencontre également en Belgique (voir album « Animaux de Belgique », n°32).

312. LEGGADA

Leggada bella

De Leggada behoort tot de ware muizen. Het diertje leeft in Afrika en Zuid-west-Azië. Het lichaam is spaarzaam bedekt met korte haartjes, hetgeen een zeer zachte indruk verwekt.

De leggada is zeer klein en de staart is gewoonlijk korter dan het lichaam. De lichaamslengte is slechts 5-8 cm. De buikzijde is over 't algemeen zeer licht tot wit van kleur.

In Kongo alleen zijn al vier ondersoorten van « Leggada bella » gekend.



312. — Leggada - Leggada joli

312. LEGGADA JOLI

Leggada bella

Le Leggada appartient à la famille de vraies souris. Ce petit animal vit en Afrique et dans le sud-ouest de l'Asie. Le corps est couvert de poils courts, clairsemés, provoquant une impression de très grande douceur.

Le leggada est très petit et la queue est généralement plus courte que le corps, dont la longueur n'atteint que 5-8 cm. Le ventre est le plus souvent de coloration très claire à blanche.

Rien qu'au Congo, on connaît quatre sous-espèces de « Leggada bella ».

313. OORRAT

Otomys tropicalis

De Oorrat dankt haar naam aan de brede oren, die aan de basis met lange haren bedekt zijn. De Boeren noemen dit dier ook wel vlei- of veldrat. De oorratte leven gewoonlijk in moerassige streken. Vandaar de Engelse benaming: « swamprats ». De staart van deze dieren is kort en behaard en is gewoonlijk donkerder van boven dan van onder. De kop is eerder rond.

Oorratte komen voor in Afrika, van Soedan tot aan de zuidelijke top van het continent. In Kongo alleen zijn wel vier ondersoorten te onderscheiden.

313. RAT A LARGES OREILLES

Otomys tropicalis

Le Rat à larges oreilles doit son nom à ses larges oreilles, couvertes à la base de longs poils. Les Boers l'appellent aussi « vlei- ou veldrat » (rat des champs). Les rats à larges oreilles vivent généralement dans des régions marécageuses, d'où le nom anglais « swamprat ». La queue de ces animaux est courte et velue et elle est ordinairement plus foncée au-dessus qu'en dessous. La tête est plutôt arrondie. Les rats à larges oreilles se rencontrent en Afrique, du Soudan jusqu'à la pointe la plus méridionale du continent. Rien qu'au Congo on peut distinguer quatre sous-espèces.



313. — Oorrat - Rat à larges oreilles



314. — Grasmuis - Rat strié

314. GRASMUIS

Lemnisca striatus

De Grasmuis is zeer opvallend getekend met witte stippels, die zich verenigen tot overlangse lijnen. De lichaamslengte bedraagt nooit meer dan 13 cm. Slechts drie vingers aan de voorpoten zijn goed ontwikkeld. Grasmuizen worden doorheen gans het Afrikaanse continent aangetroffen. Ze leven zowel op graslanden als in bossen, moerassen en struikgewas. De hier afgebeelde grasmuis wordt vooral aangetroffen in open stroken in de bossen, o.a. in het oosten van Kongo. Ze leeft in nesten, die ze zelf maakt met gras. Bij bosbranden verbergt ze zich echter in holen van andere dieren. Per worp zijn er meestal twee tot vijf jongen. In sommige gevallen werden er ook twaalf jongen opgemerkt. Meestal eet de grasmuis zachte zaden, naast bananen, aardappelen en maniok. In gevangenschap is ze een alleseter.

314. RAT STRIE

Lemnisca striatus

Le pelage du Rat strié est marqué de façon très apparente de taches blanches, qui se réunissent en rayures longitudinales. La longueur du corps ne dépasse jamais 13 cm. Trois doigts seulement aux pattes antérieures sont bien développés. Les rats striés se rencontrent partout en Afrique. Ils vivent aussi bien sur des herbages que dans des bois, des marais ou des broussailles.

Le rat strié figuré ici se rencontre surtout dans les clairières, e.a. dans l'est du Congo. Il vit dans des nids qu'il se confectionne lui-même avec de l'herbe. Mais lors des feux de forêts, il se réfugie dans des terriers d'autres animaux. Par portée, il y a généralement deux à cinq petits. Dans certains cas on a même trouvé douze jeunes. Généralement, le rat strié mange des graines tendres à côté de bananes, de patates douces et de manioc. En captivité il est omnivore.

315. TEPELRAT

Mastomys coucha

De Tepelrat heeft als typisch kenmerk een zeer groot aantal tepels, die in een ononderbroken reeks geplaatst zijn aan de zijde van het lichaam, en niet in twee groepen zoals dat bij andere ratten het geval is.

Deze rat is niet zeer groot. Een lichaamslengte van 14 cm wordt niet overschreden. De haarvacht is fijn en zacht, met hier en daar lange haren. Op medisch gebied is deze rat zeer belangrijk, daar het een « huisdier » is, dat dikwijls drager is van de vlooien die de pest overbrengen.

De hier afgebeelde tepelrat is een Kongolese soort.



315. — Tepelrat - Rat à nombreuses mamelles

315. RAT A NOMBREUSES MAMELLES

Mastomys coucha

Le Rat à nombreuses mamelles possède comme caractéristique typique un très grand nombre de mamelles qui sont disposées en une série ininterrompue des deux côtés du ventre et non pas en deux groupes comme chez les autres rats.

Ce rat n'est pas très grand, et une longueur corporelle de plus de 14 cm n'est pas dépassée. Le pelage est fin et doux, avec par-ci par-là de longs poils. Au point de vue médical, ce rat est très important, car il s'agit d'un animal qui fréquente les habitations humaines et est souvent porteur de puces, transmetteuses de la peste.

Le rat à nombreuses mamelles, figuré ici, est une espèce congolaise.

316. BRUINE HAMSTERRAT

Cricetomys gambianus

De Bruine Hamsterrat is als een reus onder de muizen. Ze is in tropisch Afrika berucht om haar grote vraatzucht. Haar naam dankt ze aan het feit dat ze « hamstert », (d.w.z. een voorraad opdoet) in zelf gegraven holen of verlaten termietenheuvels. De zweepvormige staart is even lang als het lichaam, en het uiteinde ervan is wit.

De hamsterrat zorgt zeer goed voor haar jongen en zelfs voor andere weeskinderen. Deze rat is uitsluitend vegetariër.



316. — Bruine hamsterrat - Rat de Gambie

316. RAT DE GAMBIE

Cricetomys gambianus

Le Rat de Gambie est un géant parmi les muridés. En Afrique tropicale, on le craint pour sa voracité. Il est aussi connu sous le nom de « Rat Hamster », car il accumule des provisions dans des cavités qu'il creuse lui-même, ou dans des termitières abandonnées. La queue en forme de fouet, dont l'extrémité est blanche, est aussi longue que le corps.

Le rat de Gambie montre beaucoup de sollicitude pour ses petits et même pour des orphelins d'autres familles. Ce rat est exclusivement végétarien.

317. GRONDBOORDER

Heliophobus argenteocinereus

De Grondboorder behoort tot de molratten, die zeer goed aangepast zijn aan een ondergronds leven. Hun lichaam is torpedovormig en plomp. Ze hebben een zachte pels en korte poten. De voorpoten zijn voorzien van graafnagels. De ogen zijn niet groter dan een speldekop. De korte staart is bijna onzichtbaar. De lange knaagtanden steken vooruit. Met deze tanden graven ze in de aarde. De voorpoten werpen dan de losgemaakte aarddelen naar achter. Zoals alle molratten, is ook de grondboorder lichtschuw.

Molratten leven in oostelijk Afrika ten zuiden van de Sahara tot aan de Kaap.

317. RAT-TAUPE ARGENTE

Heliophobus argenteocinereus

Les Rats-taupes sont bien adaptés à une vie souterraine. Leur corps est trapu et fusiforme. Le pelage est doux. Les pattes sont courtes, et les antérieures sont pourvues d'ongles fouisseurs. Les yeux ne sont pas plus grands qu'une tête d'épingle. La courte queue n'est presque pas visible. Les longues incisives sont proéminentes, et c'est avec ces dents qu'ils creusent la terre tandis que les pattes antérieures rejettent la terre ainsi dégagée vers l'arrière. Comme tous les rats-taupes, celui-ci craint la lumière.

Les rats-taupes vivent en Afrique orientale, du sud du Sahara jusqu'au Cap.



317. — Grondboorder - Rat-taupe argenté



318. — Vulkaan-slaapmuis - Muscardin des volcans

318. VULKAAN-SLAAPMUIS

Claviglis vulcanicus

De Vulkaan-slaapmuis behoort waarschijnlijk tot de penseelstaartslaapmuisen. Deze komen voor in de bossen ten zuiden van de Sahara, tot en met Transvaal.

Zoals de naam reeds doet vermoeden, komt de vulkaan-slaapmuis vooral voor in vulkanische streken. De vacht is bijzonder dik en wollig. De staart is kort, maar gelijkmatig dubbel behaard. Het is een nachtdier met grote ogen. Ook de oren zijn groot en weinig behaard. Het voedsel bestaat uit noten, amandelen en verschillende soorten vruchten en soms ook wel uit kleine diertjes.

318. MUSCARDIN DES VOLCANS

Claviglis vulcanicus

Le Muscardin des volcans appartient probablement aux muscardins à queue en pinceau. Ceux-ci se rencontrent dans les bois au sud du Sahara et de là jusqu'au Transvaal.

Comme son nom le fait présumer, le muscardin des volcans, vit surtout dans des régions volcaniques. Le pelage est particulièrement touffu et laineux. La queue est courte mais uniformément et doublement poilue. Il s'agit d'un animal nocturne. Les yeux sont grands, ainsi que les oreilles qui sont peu velues. La nourriture se compose de noisettes, d'amandes et de diverses sortes de fruits et, parfois aussi de petits animaux.

319. STEKELVARKEN

Hystrix stegmanni

Bij het Stekelvarken is het lichaam bedekt met stekels. Er zijn lange, dunne en buigzame stekels en andere die korter, dikker en steviger zijn. Ze zitten los in de huid.

Het stekelvarken is een schemering- en nachtdier, dat in zelf gegraven holen of rotsspelen slaapt. Zijn snijtanden zijn goed ontwikkeld. Het dier is tamelijk traag. Wanneer het met rust wordt gelaten is het ongevaarlijk. Wordt het echter in het nauw gedreven, dan valt het aan met zeer snelle bewegingen en vlug heeft de aanvaller enkele stekels in zijn huid. Vat een vijand het dier bij de kop, dan laat de kophuid los en de aanvaller heeft de bek vol huid en stekels.

De hier afgebeelde soort leeft in vulkanische streken van Afrika.



319. — Stekelvarken - Porc-épic du Kivu

319. PORC-ÉPIC DU KIVU

Hystrix stegmanni

Le corps du Porc-épic est couvert de piquants. Il y a des piquants longs, minces et flexibles et d'autres qui sont plus courts, plus gros et plus durs. Ils tiennent lâchement à la peau.

Le porc-épic est un animal crépusculaire et nocturne, qui dort dans des terriers qu'il creuse lui-même ou dans des fentes de rocher. Ses incisives sont bien développées. L'animal est plutôt lent. Lorsqu'on ne le dérange pas, il est inoffensif. Dès qu'il se sent menacé, il attaque avec des mouvements très rapides et l'assaillant a très vite quelques piquants dans la peau. Si un ennemi prend l'animal par la tête, la peau se détache et l'attaquant se retrouve le museau plein de peau et de piquants.

320. KWASTSTAARTSTEKELVARKEN

Atherurus centralis

Het hier afgebeelde Stekelvarken behoort tot de Afrikaanse soorten. De stekels zijn plat en voorzien van een lengtegroef. Ze zijn korter dan bij de gewone stekelvarkens (zie n° 319). De staart is bedekt met harde schubben, en eindigt op een penseelvormige pluim, die uit witachtige, buigzame hoornvormingen bestaat, welke als ratel kunnen gebruikt worden. De kwaststaartstekelvarkens graven uitgebreide bouwwerken in de grond. Soms wonen ze ook in verlaten termietennesten. Het zijn zeer levendige dieren.

320. PORC-ÉPIC A QUEUE EN ÉPI

Atherurus centralis

Le porc-épic figuré ici appartient aux espèces africaines. Les piquants sont aplatis et pourvus d'une rainure longitudinale. Ils sont plus courts que chez les porcs-épics ordinaires (voir n° 319). La queue est couverte d'écailles dures et se termine sur un épi penicillé, se composant de substances cornées, blanches et flexibles, qui peut être utilisé comme une espèce de crécelle.

Les Porcs-épics à queue en épi creusent des galeries très étendues sous terre. Parfois ils habitent des termitières abandonnées. Ce sont des animaux très actifs.



320. — Kwaststaartstekelvarken - Porc-épic à queue en épi

321. GUINEES BIGGETJE

Cavia porcellus

Het is niet duidelijk hoe het Guinees biggetje aan zijn naam is gekomen. Met een jong varken heeft het niets gemeen. Het gepiep lijkt ook niet op het geschreeuw van biggetjes. Met Guinea heeft het diertje ook niet veel uitstaans. Vele dieren danken evenwel hun naam, niet aan het land van herkomst, maar aan een of ander havenplaats op hun weg naar Europa.

De Guinees biggetjes leven in alle delen van Zuid-Amerika, behalve in de oerwouden van de Amazone en de daaraan in het noorden en oosten grenzende gebieden.

Ze worden vaak als huisdieren gehouden. Het zijn lieve diertjes met hun ronde kopjes, zwarte kraal oogjes, snuffelneusjes en vlugge bewegingen. Ze zijn ook van zeer groot nut als proefdieren bij wetenschappelijk onderzoek naar bestrijdingsmiddelen van infectieziekten.

321. COBAYE


Cavia porcellus

L'origine du nom commun néerlandais du Cobaye, « Guinees biggetje » (petit cochon de Guinée) est incertaine. Il n'a rien de commun avec un jeune porc. Le pépiement ne ressemble pas non plus aux cris d'un cochon de lait. Et on ne voit pas bien le rapport avec la Guinée. Beaucoup d'animaux cependant doivent leur nom, non pas au pays d'origine, mais à l'un ou l'autre port situé sur leur chemin vers l'Europe.

Les cobayes vivent dans toutes les régions de l'Amérique du Sud, sauf dans les forêts vierges de l'Amazonie et des régions avoisinantes au nord et au sud. Ils sont souvent tenus comme animaux domestiques. Ce sont de gentils petits animaux, à la tête arrondie, aux petits yeux, au nez fureteur et aux mouvements vifs et alertes. Ils sont également très utiles comme animaux de laboratoire pour des recherches scientifiques dans la lutte contre des maladies infectieuses.



321. — Guinees biggetje - Cobaye



322. — Mara of Patagonische haas - Mara ou lièvre de Patagonie

322. MARA of PATAGONISCHE HAAS

Dolichotis patagonica

De Patagonische Haas of Mara lijkt wel op een kortorige haas. Hij heeft lange poten en aan de tenen van de achterpoten zitten hoefachtige klauwen. Hij is een snelle loper en kan sprongen maken van wel twee meter.

Hij leeft in de pampa's, de boomloze droogtesteppe en andere halfwoestijnen van Argentinië en Patagonië. Hij gaat vooral 's nachts op zoek naar plantaardig voedsel. Bij de staartwortel heeft de mara een « spiegel » van witte haren. Deze spiegel dient als signaal om in het donker soortgenoten terug te vinden. Het wijfje brengt in een zelf gegraven hol twee tot drie jongen ter wereld.

322. MARA ou LIEVRE DE PATAGONIE

Dolichotis patagonica

Le Lièvre de Patagonie ou Mara ressemble assez bien à un lièvre à oreilles courtes. Il a de longues pattes et des griffes en forme de sabot aux doigts des membres postérieurs. C'est un coureur rapide et il peut faire des bonds de près de deux mètres. Il vit dans les pampas, les steppes arides, dénuées d'arbres et d'autres semi-déserts de l'Argentine et de la Patagonie. C'est surtout la nuit qu'il va à la recherche de nourriture végétale. A la naissance de la queue du mara, il y a un grand « miroir » de poils blancs. Ce miroir sert de signal de ralliement aux congénères, pour se retrouver dans l'obscurité. La femelle met au monde dans un terrier creusé par elle-même, de deux à trois petits.

323. ZOUTPANMARA

Dolichotis salinicola

Deze mara of patagonische haas is kleiner dan de vorige (n° 322). Zoals bij de vorige soort is het staartje zeer kort; het is niet langer dan 45 mm. De bovenzijde van het lichaam is grijsachtig, de onderzijde witachtig. De haarvacht is dicht en het dier lijkt ook wel op een langpotige haas. Voor andere kenmerken en gewoonten, zie ook n° 322.



323. — Zoutpanmara - Mara des salines

323. MARA DES SALINES

Dolichotis salinicola

Ce mara ou lièvre de Patagonie est plus petit que le précédent (n° 322). Tout comme chez l'espèce précédente, la queue est courte et ne dépasse pas 45 mm.

Le dessus du corps est grisâtre, le ventre blanchâtre. Le pelage est touffu et l'animal ressemble assez bien à un lièvre à longues pattes.

Pour d'autres caractéristiques et pour le genre de vie, voir le n° 322.


324. WATERZWIJN of CAPIBARA

Hydrochoerus capybara

Het Waterzwijn of Capibara is wel een reus onder de knaagdieren. Een volwassen mannetje kan 1 m lang worden en 50 kg wegen, een enkele maal zelfs 100 kg.

Capibara's leven in Venezuela, Guyana, Brazilië en Paraguay. Ze worden meestal gevonden daar waar rivieren door het oerwoud stromen en ook in moerassige gebieden. Wanneer er gevaar dreigt, begeeft de kudde zich te water en het blijkt dan dat deze dieren zeer goed kunnen zwemmen. Tussen de tenen van de achterpoten hebben ze zwemvliezen. Hun voedsel bestaat uit gras, waterplanten, schors, jonge loten, enz.

Het waterzwijn is een zacht, vriendelijk en slim dier. Het mannetje heeft gewoonlijk een harem rond zich van wijfjes van verschillende leeftijd.



324. — Waterzwijn of capibara - Capybara

324. CAPIBARA

Hydrochoerus capybara

Le Capybara de l'Amérique du Sud est le géant parmi les rongeurs. Un mâle adulte peut atteindre une longueur de 1 m et peser 50 kg, exceptionnellement même 100 kg.

Les capybaras vivent au Vénézuéla, aux Guyanes, au Brésil et au Paraguay. On les trouve le plus souvent là où les rivières traversent la forêt vierge et dans des régions marécageuses. Menacés par un danger quelconque, le troupeau se rend à l'eau, et ces animaux se montrent alors très bons nageurs. Ils ont d'ailleurs des palmures entre les doigts des pattes postérieures. La nourriture se compose d'herbes, de plantes aquatiques, d'écorces, de jeunes pousses, etc.

Le capybara est un animal doux, d'humeur placide et intelligent. Le mâle est généralement accompagné d'un harem de femelles d'âges différents.

325. PACARANA

Dinomys branickii

Een Pacarana is nog altijd een grote zeldzaamheid. Pas in 1872 werd het dier voor het eerst waargenomen in het gebergte van Peru.

De pacarana is een traag dier. Hij zoekt dekking tegen zijn vijanden in rotsspleten en holen. Hij leeft in de bergregenwouden van de oostelijke Andes-voorgebergten van Columbië tot Bolivia.

Het voedsel van de Pacarana bestaat uit planten. Het dier is ongeveer 60 cm lang; de dichtbehaarde staart meet 30 cm. De pels is hoofdzakelijk grijs, de rug meer zwartachtig met twee rijen witte vlekken langs de ruggegraat.

325. DINOMYS DE BRANICKY

Dinomys branickii

Le Dinomys est, actuellement encore, une grande rareté. Ce n'est qu'en 1872 que l'animal a été observé dans les montagnes du Pérou.

Le dinomys est un animal lent. Pour se garantir contre ses ennemis, il se réfugie dans des cavernes et dans des crevasses de rochers. Il vit dans les forêts de montagne humides des promontoires orientaux des Andes, depuis la Colombie jusqu'à la Bolivie.

La nourriture du dinomys se compose de végétaux. Cet animal atteint une longueur d'environ 60 cm; la queue touffue mesure 30 cm. La couleur dominante de la fourrure est le gris; le dos est plus noirâtre, avec deux rangées de taches blanches le long de l'épine dorsale.



325. — Pacarana - Dinomys de branicky



326. — Azara-agouti en gewone agouti - Agouti d'azarae et agouti ordinaire

326. AZARA-AGOUTI en GEWONE AGOUTI

Dasyprocta azarae en *Dasyprocta aguti*

Op de afbeeldingen n^o 326 en 327 zien we verschillende leden van de agouti-familie. Deze dieren horen thuis op de grond in het oerwoud. Hun voedsel, hoofdzakelijk vruchten, vinden ze daar in grote hoeveelheden. De naam Agouti is afkomstig van het Indiaanse woord « akouti », dat vruchtenknager betekent. De agouti is een sierlijk diertje, hoog op de poten en ongeveer 40 cm lang. Het verspreidingsgebied gaat van Mexico tot aan de zuidgrens van de altijd groene vegetatie in Argentinië.

Bij de agouti's is een hele reeks soorten en ondersoorten, in allerlei kleuren, gekend.

326. AGOUTI D'AZARAE et AGOUTI ORDINAIRE

Dasyprocta azarae et *Dasyprocta aguti*

Sur les figures n^o 326 et 327, on voit plusieurs membres de la famille des agoutis. Ces animaux sont liés au sol de la forêt vierge. Ils y trouvent leur nourriture, essentiellement des fruits, en grande quantité. Le nom Agouti est originaire du mot indien « akouti », qui signifie « rongeur de fruits ».

L'agouti est un petit animal gracieux, haut sur pattes et d'une longueur de 40 cm environ. L'aire de dispersion va du Mexique jusqu'à la limite méridionale de la végétation vivace en Argentine.

On connaît une multitude d'espèces et de sous-espèces d'agoutis, avec des pelages aux colorations les plus variées.

327. GOUDEN AGOUTI en MEXICAANSE AGOUTI

Dasyprocta aurea en *Dasyprocta Mexicana*

Nog twee voorbeelden van de kleine hypernerveuze Agouti's. Voortdurend zijn ze op gevaar bedacht en klaar tot een snelle vlucht. Onder elkaar zijn ze onverdraagzaam en echte nijdassen. In gevangenschap zijn deze kleine, aanhankelijke diertjes zeer geliefd.

Voor enkele andere eigenschappen en leefwijze verwijzen we terug naar n^o 326.



327. — Gouden agouti en mexicaanse agouti - Agouti doré argentin et agouti mexicain

327. AGOUTI DORE ARGENTIN et AGOUTI MEXICAIN

Dasyprocta aurea et
Dasyprocta Mexicana

Encore deux exemples de ces petits Agoutis hypernerveux. Ils sont sans cesse aux aguets et prêts à une fuite rapide en cas de danger. Entr'eux ils sont insupportables et de véritables grincheux. En captivité par contre, ces petits animaux sont prompts à s'attacher et très gentils. Pour d'autres particularités et le genre de vie, nous renvoyons au n^o 326.

328. PACA

Agouti paca

De Paca leeft van Mexico tot Argentinië. De vacht is aan de rugzijde rood-bruin, met aan elke kant vijf rijen witte vlekken. De buikzijde is geelachtig wit. De staart is slechts een stompje.

Pas bij schemering verlaat de paca zijn hol. De gitzwarte grote ogen gloeien in het donker koperrood. Op de kop staan grote, lichtgekleurde tastharen.

De ondergrondse hollen worden met de vier poten tegelijk gegraven, met behulp nog van de knaagtanden.

De paca is een echte vechtersbaas. Met zijn grote snijtanden kan hij zijn vijanden erge verwondingen toebrengen.



328. — Paca - Paca

328. PACA

Agouti paca

Le Paca vit depuis le Mexique jusqu'en Argentine. Le pelage du dessus est rouge-brun, avec de chaque côté cinq rangées de taches blanches. Le côté ventral est blanc jaunâtre. La queue n'est qu'un moignon.

Ce n'est qu'au crépuscule que le paca quitte son terrier. Les yeux d'un noir de jais brillent dans l'obscurité, d'une lueur rouge cuivrée. A la tête, il y a de longs poils sensoriels de coloration claire.

Le paca creuse ses terriers souterrains en s'aidant des quatre pattes à la fois et en utilisant les incisives.

Cet animal est un véritable batailleur. Avec ses grandes incisives, il peut infliger de graves blessures à ses ennemis.

329. CHINCHILLA

Chinchilla lanigera

De Chinchilla is zeer bekend om zijn wondermooie pels, als zijde zo zacht, en met een kleur van licht-asgrauw tot zilver. Vroeger leefden de chinchilla's in zeer groot aantal in de bergen van Chili en Bolivia. Ze kwamen voor op de kale rotswanden, hoog boven de boomgrens. Ze voedden zich met mos, gras en plantenwortels.

Nu zijn deze diertjes in het wild bijna uitgeroeid. Tegenwoordig worden ze o.a. ook gekweekt in de Verenigde Staten en Canada. Zo zijn er daar nu een 2.500.000 dieren, die weer fokmateriaal geleverd hebben voor andere landen.

329. CHINCHILLA

Chinchilla lanigera

Le Chinchilla est bien connu, grâce à sa fourrure superbe, douce comme de la soie et de coloration gris-cendré clair à argentée. Autrefois les chinchillas vivaient par grandes quantités dans les montagnes du Chili et de la Bolivie. Ils fréquentaient les flancs de rochers dénudés, au-dessus de la limite des arbres. Ils se nourrissaient de mousses, d'herbes et de racines de plantes.

Actuellement, ces petits animaux sont presque exterminés à l'état sauvage. A présent, on les élève e.a. aux Etats-Unis et au Canada. C'est ainsi qu'actuellement il y a là environ 2.500.000 de ces animaux, qui ont fourni du matériel d'élevage pour d'autres pays.



329. — Chinchilla - Chinchilla



330. — Haasmuis - Lagidium

330. HAASMUIS

Lagidium pallipes

De Haasmuis komt voor in Peru, Bolivië, Chili, Argentinië en Patagonië. Zij leeft daar op droge, ruwe rotsen, soms tot op 5.000 m hoogte. Zij is nauw verwant met de echte chinchilla. De pels is aan de rugzijde mooi parelgrijs, aan de buikzijde geelwit. De oorschelpen zijn groter dan bij de echte chinchilla's. De staart is langs onder kort behaard, terwijl de haren aan de bovenkant lang zijn. Ook de haasmuis is zeldzaam geworden door de achtervolging van de pelsjagers. Dit dier wordt tegenwoordig ook gefokt.

330. LAGIDIUM

Lagidium pallipes

Le Lagidium vit au Pérou, en Bolivie, au Chili, en Argentine et en Patagonie. Il y vit sur les rochers dénudés, rugueux, parfois jusqu'à une altitude de 5.000 m. Il est fort apparenté aux vrais chinchillas. Le dessus du pelage est d'un beau gris-perle, au ventre il est jaune-blanc. Les pavillons d'oreille sont plus grands que chez les vrais chinchillas. La queue est couverte de poils courts en dessous, longs au dessus. Le lagidium est également devenu rare à cause de la chasse que lui ont faite les chasseurs de fourrures. Actuellement, cet animal est également élevé pour sa fourrure.

331. VISCACHA

Viscacia viscacia

De Viscacha is wel de meest algemene wolmuis. Ze leeft in de pampa's van Argentinië tot Patagonië; in Uruguay is zij echter uitgestorven. Soms leven er wel een vijftigtal van deze dieren gezellig in een gemeenschappelijk nest, « viscacheria » genoemd in Zuid-Amerika. Om de ingang van deze woning verzamelen ze alles wat ze van hun nachtelijke tochten mee hebben genomen : gras, graan, stenen, runderhorens, enz. Met dit alles samen is wel een handkar te vullen. In de viscacheria's leven slangen, steenuiltjes, boomklevers en een soort zwaluw als gasten. De viscacha is schadelijk en wordt duchtig achtervolgd.



331. — Viscacha - Viscache

331. VISCACHE

Viscacia viscacia

La Viscache est le chinchillidé le plus répandu. Elle vit dans les pampas, depuis l'Argentine jusqu'en Patagonie; en Uruguay cependant elle est éteinte. Parfois plus d'une cinquantaine de ces animaux vivent socialement ensemble dans un nid commun, appelé « viscacheria » en Amérique du Sud. Aux alentours de l'entrée de cette « habitation », ils rassemblent tout ce qu'ils ont ramené de leurs expéditions nocturnes : de l'herbe, des graines, des pierres, des cornes de bétail, etc. Tout cela ensemble suffirait à remplir une charrette à bras. Dans la viscachère, des serpents, des chats-huants, des sitelles et une espèce d'hirondelle, vivent en hôtes. La viscache est nuisible et fortement pourchassée.

332. KAAPSE HAAS

Lepus

De Kaapse Haas leeft in Zuid-Afrika, bij voorkeur in open velden, zoals de andere hazen. Soms echter wordt hij ook in immergroene bossen aangetroffen. Vele ondersoorten van de Kaapse haas worden onderscheiden. De Europese haas werd reeds besproken in het album « Dieren van België », n° 25.

De haas wordt gekenmerkt door zijn lange achterpoten en lange oren. Hij is een lange-afstandloper, terwijl het konijn, met zijn ongeveer even hoge ledematen, een geboren sprinter is met snelle start. De haas is minder vruchtbaar dan het konijn. De draagtijd is veel langer en het wijfje werpt maar vier jongen. Het hazemannetje, de rammelaar, vecht duchtig voor het wijfje. Hij bespuut zijn tegenstander met urine, waarbij hij zeer goed kan mikken.

De haas is geen graver. De jongen worden geboren in een bovengronds leger. Na de geboorte kunnen ze direct zien en lopen.



332. — Kaapse haas - Lièvre de l'est-africain

332. LIEVRE DE L'EST-AFRICAIN

Lepus

Le Lièvre de l'Est-africain vit en Afrique du Sud, de préférence dans les champs découverts, comme les autres lièvres. On le rencontre parfois aussi dans les bois d'arbres à feuilles persistantes. On distingue plusieurs espèces de lièvres de l'Est-africain. Le lièvre européen a déjà été décrit dans l'album « Animaux de Belgique », n° 25.

Le lièvre se distingue par ses longues pattes postérieures et ses grandes oreilles. C'est un coureur de fond, tandis que le lapin, avec ses membres presque d'égale longueur, est un coureur de vitesse au départ rapide.

Le lièvre est moins prolifique que le lapin. La gestation est beaucoup plus longue et la hase ne met au monde que quatre petits. Le mâle, le « bouquin », se bat furieusement pour la possession d'une femelle. Il asperge son adversaire d'urine, avec laquelle il sait fort bien viser.

Le lièvre n'est pas un fouisseur. Les petits viennent au monde dans un gîte à la surface. Dès la naissance, ils voient et ils sont capables de courir.

333. REUZENKANGOEROE (mannetje)

Macropus giganteus

Deze reus onder de springende buideldieren is een attractie voor elke dierentuin. Hij zit gewoonlijk op een driepikkel, gevormd door de achterpoten en de stevige staart.

De Kangoeroe is een steppedier, dat zeer gemakkelijk schrikt en snel tot vluchten bereid is. De reuzenkangoeroe kan daarbij ontzettende sprongen maken waarbij hij letterlijk door de lucht zweeft. Wanneer hij in het nauw gedreven wordt, is hij een levensgevaarlijke tegenstander.

De rol die de reuzenkangoeroe in Australië speelt, komt ongeveer overeen met die van de antilopen en herten in de andere werelddelen. Het zijn plantenetters, die op uitgestrekte vlakke terreinen in roedels leven, onder leiding van een mannetje dat zijn gezag weet te handhaven.


333. KANGOUROU GEANT (mâle)

Macropus giganteus

Le géant parmi les marsupiaux sauteurs est une attraction de tout jardin zoologique. Le plus souvent, il s'assied en trépied, constitué par les fortes pattes postérieures et la forte queue.

Le Kangourou est un animal des espaces découverts, qui s'effraye très vite et est prompt à prendre la fuite. C'est alors que le kangourou géant est capable d'exécuter des bonds énormes, pendant lesquels il semble littéralement planer dans l'air. Lorsqu'il est acculé, il peut devenir un adversaire dangereux.

Le rôle joué en Australie par les kangourous correspond à peu près à celui des antilopes et des cerfs dans les autres parties du monde. Ce sont des herbivores qui vivent par hardes, sur les plaines étendues, sous la conduite d'un mâle, qui sait faire valoir son autorité.



333. — Reuzenkangoeroe (mannetje) - Kangourou géant (mâle)



334. — Rotskangoeroe - *Petrogale pénicillé*

334. ROTSKANGOEROE

Petrogale penicillata

De Rotskangoeroe kan wel als de gems van Australië beschouwd worden. Hij leeft in de bergen en is meester in klimmen en klauteren. Hij heeft zijn slaappleaats in rotsspleten. Bij gevaar alarmeert hij zijn soortgenoten door te trommelen met de achterpoten, zoals het konijn. De rotskangoeroes gebruiken vaste wegen op de rotsen, die er dan ook als gepolijst uitzien.

De staart van dit dier is dichtbehaard en aan zijn uiteinde borstelig. Er zijn verschillende soorten rotskangoeroes gekend, naargelang kleur en kleurpatroon.

334. PETROGALE PENICILLE

Petrogale penicillata

Le *Petrogale pénicillé* pourrait être considéré comme le chamois de l'Australie. Il vit dans les montagnes et est passé maître dans l'art de grimper et d'escalader des rochers. En cas de danger il donne l'alarme à ses congénères en tambourinant des pattes postérieures, comme les lapins. Les pétrogales empruntent toujours les mêmes pistes sur les rochers, qui en sont comme polis.

La queue de cet animal est touffue et se termine sur un touffe. On distingue plusieurs espèces de pétrogales d'après la couleur et les dessins du pelage.

335. BOOMKANGOEROE

Dendrolagus ursinus

Boomkangoeroes leven in de ondoordringbare bergwouden van Nieuw-Guinea, op enkele nabijgelegen eilanden en in sommige delen van Noord-Queensland. Ze zijn speciaal aangepast aan hun leefwijze in de bomen, en verschillen daardoor wel wat van andere kangoeroes. De ledematen zijn kort, de klauwen scherp en de zolen aan de handen zijn zeer ruw. De staart is lang. De boomkangoeroe leeft niet alleen in de bomen; hij brengt ook een groot deel van zijn tijd op de grond door. Slapen doet hij altijd in de bomen. Hij eet vruchten en bladeren, ook wel insectenlarven.

Van dit geslacht bestaan wel een dozijn soorten, die in kleur variëren van bijna zwart tot reebruin en grijs en die, vooral op de snuit, mooie tekeningen vertonen.

De hier afgebeelde soort is de donkerbruine van Nieuw-Guinea.



335. — Boomkangoeroe - Kangourou arboricole

335. KANGOUROU ARBORICOLE

Dendrolagus ursinus

Les Kangourous arboricoles vivent dans les forêts impénétrables des montagnes de la Nouvelle Guinée, de quelques îles environnantes et de certaines parties du Queensland du Nord. Ils sont spécialement adaptés à leur mode de vie dans les arbres, et de ce fait ils diffèrent bien un peu des autres kangourous. Les membres sont courts, les griffes acérées et les soles des mains sont très rugueuses. La queue est longue. Le kangourou arboricole ne vit pas uniquement dans les arbres, il passe aussi une bonne partie de son temps à terre. Mais il dort toujours dans les arbres. Il mange des fruits et du feuillage, également des larves d'insectes. Il existe bien une douzaine d'espèces de cette race, de coloration différente, allant du noir au brun chevreuil et au gris et qui présentent, surtout au museau, de jolis dessins.

L'espèce représentée est la brune foncée de la Nouvelle Guinée.

336. WOMBAT

Phascolomys ursinus

De Wombat vertoont enige gelijkenis met bepaalde knaagdieren. In onder- en bovenkaak zijn slechts twee snijtanden, die naarmate ze afslijten ook weer aangroeien, zoals dit het geval is bij de knaagdieren.

De wombat is een graver. De poten zijn kort en stevig en voorzien van sikkelvormige graafklauwen. Het voedsel bestaat uit gras, wortels en zelfs paddestoelen.

De wombat is zeldzaam geworden. De hier afgebeelde soort leeft op Tasmanië. De wombat brengt telkens maar één jong ter wereld, dat ongeveer negen maanden in de buidel wordt meegedragen.



336. — Wombat - Wombat

336. WOMBAT

Phascolomys ursinus

Le Wombat montre quelque ressemblance avec certains rongeurs. Aux mâchoires inférieures et supérieures il n'y a que deux incisives, qui croissent à fur et à mesure qu'elles s'usent, comme c'est le cas chez les rongeurs.

Le wombat est un fouisseur. Les pattes sont courtes et fortes et pourvues de griffes fouisseuses falciformes. La nourriture se compose d'herbe, de racines et même de champignons.

Le wombat est devenu rare. L'espèce représentée vit en Tasmanie.

La femelle ne met au monde qu'un seul petit, qui est transporté dans la poche ventrale (marsupium) pendant neuf mois environ.

337. BUIDELBEER of KOALA

Phascolarctus cinereus

De Buidelbeer of Koala vormt op zich zelf een eigen onderfamilie. Hij is ons allen bekend als de « teddybeer ». Hij leeft in Queensland, Victoria en Nieuw-Zuid-Wales.

De buidelbeer heeft enige verwantschap, enerzijds met de klimmende buideldieren, anderzijds met de roofbuideldieren. Hij werd vroeger sterk achtervolgd om zijn fijne zachtwillige grijze pels. Zijn voedsel bestaat hoofdzakelijk uit bladeren van Eucalyptus-bomen. De buidelbeer wordt nu beschermd, o.a. in natuurreservaten.

De pasgeboren jongen zijn zeer hulpeloos en nog geen 2 cm groot. Een half jaar blijven ze in de buidel tot ze ongeveer 15 cm groot zijn. Daarna sleept de moeder ze nog wel een jaar lang mee op de rug. Nadat de jongen gespeend zijn eten ze nog een tijd lang de inhoud van de endeldarm van de moeder, die uit halfverteerde eucalyptusbladeren bestaat.

337. KOALA

Phascolarctus cinereus

Le Koala constitue à lui seul une sous-famille distincte. Il est connu de tout le monde sous la forme de « l'ours teddy ». Il vit au Queensland, au Victoria et dans la Nouvelle Galles du Sud.

Le koala est quelque peu apparenté aux marsupiaux grimpeurs d'une part, aux marsupiaux carnassiers d'autre part. Autrefois il a été fortement pourchassé pour sa fine fourrure grise, douce et laineuse. Sa nourriture se compose de feuilles d'eucalyptus. Le koala est actuellement protégé e.a. dans des réserves naturelles.

Les petits nouveaux-nés sont très faibles et ils ont à peine 2 cm. Pendant six mois ils restent dans la poche ventrale et à ce moment ils ont atteint une taille de 15 cm. Après cela la mère les transporte encore pendant près d'un an sur son dos. Quand les petits sont sevrés, ils sont encore nourris pendant quelque temps du contenu du rectum de la mère, qui se compose de feuilles d'eucalyptus semi digérées.



337. — Buidelbeer of Koala - Koala



338. — Koeskoes - *Phalanger tachté*

338. KOESKOES

Phalanger maculatus

De Koeskoes is een traag dier. Gedurende de nacht is hij actief, tijdens de dag maakt hij een stompzinige indruk. De afgebeelde, gevlekte koeskoes, leeft op Nieuw-Guinea. Dit dier is aan de bovenzijde roodbruin, aan de buikzijde wit. De wijfjes, die wat groter zijn dan de mannetjes, vertonen vlekken in hun haarkleed. De pels is zacht en wollig. De staart is een grijpstaart en voor een deel kaal. De ogen zijn groot en de schedel is gewelfd. Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit bladeren en vruchten.

338. PHALANGER TACHETE

Phalanger maculatus

Le *Phalanger tachté* est un animal lent. Il est actif pendant la nuit, pendant la journée il est d'apparence stupide.

Le *phalanger tachté* figuré ici vit en Nouvelle Guinée. La partie supérieure de cet animal est rouge-brune, la partie inférieure est blanche. Chez les femelles, qui sont légèrement plus grandes que les mâles, le pelage est tacheté. La fourrure est douce et laineuse. La queue est préhensile et partiellement glabre. Les yeux sont grands et le crâne est bombé. La nourriture se compose principalement de feuillage et de fruits.

339. VOSKOESKOES

Trichosurus vulpecula

De Voskoeskoes is de eigenlijke « possum » van Australië en Tasmanië. De kop doet aan die van een kangoeroe denken. De poten zijn kort en de grijphanden hebben stevige nagels. De lange staart is een grijpstaart met aan de onderzijde aan het uiteinde een kale plek.

De voskoeskoes is een planteneter. Het dier is gemakkelijk te temmen. De hier afgebeelde voskoeskoes is de meest voorkomende soort en bewoont geheel het vasteland van Australië. Het dier is zilvergrijs met een zwarte staart. De voskoeskoes wordt door de blanken sterk vervolgd. Hun zachte pels werd als Australische opossum in de handel gebracht.



339. — Voskoeskoes - *Phalanger commun*

339. PHALANGER COMMUN

Trichosurus vulpecula

Le *Phalanger commun* est le véritable « possum » de l'Australie et de la Tasmanie. La tête rappelle celle du kangourou. Les pattes sont courtes et les mains préhensiles sont pourvues d'ongles forts. La longue queue est préhensile et a une tache glabre à son extrémité inférieure. Le *phalanger commun* est un végétarien. L'animal s'apprivoise facilement. Celui qui est figuré ici est l'espèce la plus commune et habite tout le continent Australien. L'animal est gris-argenté, à la queue noire. Les *phalangers* sont fortement pourchassés par les blancs. La fourrure douce est vendue dans le commerce sous le nom d'opossum australien.

340. VLIEGENDE KOESKOES

Petaurus breviceps

De Vliegende Koeskoes of Suikereekhoortje kent in Australië een grote verspreiding. Het dier is zachtbehaard. De rugzijde is blauwgrijs, de buikzijde is wit, de staart heeft een zwarte punt. Midden over de rug loopt een donkere streep. De valmschermhuid is langs onder en aan de rand wit; langs de rand loopt een zwarte streep.

De vliegende koeskoes eet insecten, bladeren en honig, die hij uit de bloemen likt.

Het moederdier draagt roerend zorg voor haar jongen.



340. — Vliegende Koeskoes - Phalanger volant à courte tête

340. PHALANGER VOLANT A COURTE TETE

Petaurus breviceps

Le Phalanger volant est très répandu en Australie. Le pelage de l'animal est doux. Le dos est gris bleu, le ventre blanc, la queue se termine sur un bout noir. Une ligne foncée suit le milieu du dos. La membrane-parachute est blanche en dessous et aux bords; une ligne noire court le long des bords.

Le Phalanger volant mange des insectes, des feuilles et du miel, qu'il lèche dans les fleurs.

La mère s'occupe de ses petits d'une façon touchante.

341. GESTREEPTE BUIDELEEKHOORN

Dactylopsila trivirgata

De Gestreepte Buidleekhoorn is een klimbuideldier, en is zeer levendig getekend. In gestalte en grootte lijkt het op een eekhoortje. De staart is lang en borstelig en de onderkant ervan is kaal. Een typisch kenmerk is ook de aromatische geur die dit dier verspreidt. Van de naakte handen is de vierde vinger dubbel zolang als de andere. Met deze gevoelige handen beklopt het dier de schors, op zoek naar insectenlarven. Met de knaagtanden rukt het deze schors of het vermoldde hout open en met de lange vinger haalt het de larven uit dieper gelegen gangen. Er zijn verschillende soorten van gestreepte buidleekhoorns gekend in het oerwoud van Queensland, Nieuw-Guinea, de Aroë-eilanden en nog enkele andere eilanden.

341. DACTYLOPSILA A TROIS BANDES

Dactylopsila trivirgata

Le Dactylopsila est un marsupial grimpeur à coloration très vive. Par la taille il ressemble à l'écureuil. La queue est longue et touffue et nue du côté inférieur. Un caractère typique de cet animal est l'odeur aromatique qu'il répand. Le quatrième doigt, des mains glabres, est deux fois plus long que les autres. De ces mains sensibles l'animal frappe l'écorce des arbres, à la recherche de larves d'insectes. Avec ses incisives il arrache l'écorce ou ouvre le bois vermoulu et avec le doigt allongé il retire les larves des galeries profondes. On connaît plusieurs espèces de Dactylopsilas des forêts vierges du Queensland, de la Nouvelle Guinée, des îles Aroë et de quelques autres îles.



341. — Gestreepte Buidleekhoorn - Dactylopsila à trois bandes



342. — Slurfbuidelbeer - *Tarsipes rostré*

342. SLURFBUIDELBEER

Tarsipes rostratus

De Slurfbuidelbeer heeft een lange, bijna slurfvormige snuit met talrijke gevoelige snorharen. De lange grijpstaart is kort behaard. De handen zijn bijna mensachtig, de voeten zijn klimvoeten. Het zeer lichte gewicht laat het dier toe, zelfs aan zeer dunne takjes, allerlei akrobatische toeren uit te voeren. De kop, de flanken en de ledematen zijn bruin, de rug is grijs en in 't midden bijna zwart, met langs weerszijden een lichtgekleurd streepje.

De tong is lang en kan ver uitgestoken worden; ze draagt korte haartjes. De lippen hebben huidplooiën en maken van de geopende mond een soort zuigpompje. De slurfbuidelbeer voedt zich met honig, stuifmeel en kleine insecten, die hij in de bloemen vindt. Het gebit is sterk gereduceerd.

De slurfbuidelbeer leeft in het zuidwesten van het Australische vasteland.

342. TARSIPES ROSTRE

Tarsipes rostratus

Le Tarsipes rostré a un museau allongé, presque en forme de trompe, avec de nombreux poils tactiles, très sensibles. La longue queue préhensile est couverte de poils courts. Les mains ressemblent à des mains humaines, les pieds sont grimpeurs. La tête, les flancs et les membres sont bruns, le dos est gris, presque noir au milieu, avec, de chaque côté une mince ligne plus claire.

La langue est longue et protractile et porte de petits poils. Les lèvres, pourvues de replis cutanés, permettent de transformer la bouche ouverte en une sorte de suçoir. Le tarsipes rostré se nourrit de miel, de pollen et de petits insectes qu'il trouve à l'intérieur des fleurs. La denture est fortement réduite. Le poids très peu élevé de l'animal permet à celui-ci d'effectuer toutes sortes d'acrobaties, même à des branches très minces.

Le tarsipes rostré vit dans le sud-ouest du continent australien.

343. TASMAANSE BUIDELDAS

Perameles gunni

De Buideldas is een alleseter. Hij verschilt van de buidelmuis (n° 347), door het feit dat de tweede en de derde teen van de voet tot aan de nagels met elkaar vergroeid zijn. Deze vergroeide tenen gebruikt hij om zich te poetsen.

De buideldas leeft in Australië en Tasmanië. Hij heeft een spitse snuit en doet daardoor aan een rat denken. Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit insecten, daarnaast wormen, hagedissen en plantenvoedsel.

De jongen kunnen op elk tijdstip van het jaar geboren worden. Het aantal varieert van één tot vijf.



343. — Tasmaanse Buideldas - Bandicoot de Tasmanie

343. BANDICOOT DE TASMANIE

Perameles gunni

Le Bandicoot est un omnivore. Il diffère du dasyure tacheté (n° 347) par le fait que le deuxième et le troisième doigt des pattes postérieures sont soudés jusqu'aux griffes. Il se sert de ces doigts soudés pour se nettoyer.

Le bandicoot vit en Australie et en Tasmanie. Il a un museau pointu ressemblant à celui d'un rat. La nourriture se compose essentiellement d'insectes à côté de vers, de lézards et de nourriture d'origine végétale.

Les petits viennent au monde à toute époque de l'année. Leur nombre varie de un à cinq.

344. MIERENBUIDELDIER

Myrmecobius fasciatus

Het Mierenbuideldier dat vroeger zeer algemeen verspreid was, staat nu op het punt uit te sterven. Dit komt door de weinige afweer die het bezit tegenover zijn vijanden. De tot nu toe genomen beschermingsmaatregelen zijn niet afdoende gebleken.

Het mierenbuideldier is een levendig dier met mooi kleurpatroon. Dwars over de rug lopen een tiental geelwitte banden. De staart is gespikkeld. De spitse snuit heeft rond de ogen een zwart masker. Het voedsel bestaat voornamelijk uit termieten, met daarnaast ook mieren en andere insecten.



344. — Mierenbuideldier - Fourmilier marsupial

344. FOURMILIER MARSUPIAL

Myrmecobius fasciatus

Le Fourmilier marsupial qui était autrefois très commun, est en voie d'extinction. Il ne dispose que de peu de moyens de défense contre ses ennemis. Les mesures de protection prises jusqu'ici semblent avoir été peu efficaces.

Le fourmilier marsupial est un animal vif et alerte au pelage à jolis dessins. Sur le dos se voient une dizaine de bandes transversales jaune-blanc. La queue est tachetée. Sur le museau pointu il y a un masque autour des yeux. La nourriture se compose essentiellement de termites et d'autres insectes.

345. BUIDELWOLF


Thylacynus cynocephalus

De Buidelwolf is een roofdier. Om een voorstelling van dit dier te hebben denken we het best aan een hond met een buidel en een wolvenkop. De gladharige vacht is grijsbruin en vertoont dwars over de rug 12 tot 14 zwarte zebra-strepen. Het gebit is zeer vervaarlijk en telt 46 tanden. De buidelwolf leeft, in een nog klein aantal, in de bergen van Tasmanië. 's Nachts gaat hij op jacht, overdag rust hij in zijn leger. Dit dier wordt nu door de wet beschermd. Deze maatregel is echter wat laat gekomen.

345. THYLACINE ou « LOUP MARSUPIAL DE TASMANIE »

Thylacynus cynocephalus

Le Thylacine ou Loup marsupial est un carnivore. Pour avoir une idée de l'aspect de cet animal, on se représente un chien à poche ventrale et ayant une tête de loup. Le pelage aux poils lisses est gris-brun avec, sur le dos, de 12 à 14 zébrures transversales noires. La denture est formidable et se compose de 46 dents. Le loup marsupial vit encore, en nombre restreint, dans les montagnes de la Tasmanie. La nuit il se rend à la chasse, durant la journée il dort dans son gîte. Cet animal est protégé par la loi. Cette mesure de protection a été prise un peu tardivement.



345. — Buidelwolf - Thylacine ou « Loup marsupial de Tasmanie »

346. TASMAANSE DUIVEL

Sarcophilus ursinus

De Tasmaanse Duivel of Buidelduivel wordt alleen op Tasmanië aangetroffen. Nog niet zolang geleden moet dit dier ook op het vasteland van Australië geleefd hebben. Er wordt zelfs beweerd dat dit nu ook nog het geval is. De buidelduivel is zwart van kleur; aan keel en borst zien we enkele onregelmatige vlekken. Jonge buidelduivels zijn gemakkelijk te temmen. Het volwassen dier is zeer krachtig en taai, het kan dieren overwinnen die groter zijn dan hijzelf. De Tasmaanse duivel is een plaag voor lammeren en pluimvee.



346. — Tasmaanse Duivel - Sarcophile ou « Diable de Tasmanie »

346. SARCOPHILE ou « DIABLE DE TASMANIE »

Sarcophilus ursinus

Le Sarcophile ou Diable de Tasmanie ne se rencontre que dans ce pays. Il n'y a guère cet animal doit également avoir vécu sur le continent australien. On prétend même qu'il doit encore y exister actuellement. Le diable de Tasmanie est de coloration noire; à la gorge et à la poitrine on voit quelques taches irrégulières. Les jeunes sarcophiles s'approprient facilement. L'animal adulte est vigoureux et robuste, il peut venir à bout d'animaux plus grands que lui. Le diable de Tasmanie est une véritable plaie pour la volaille et les agneaux.

347. GEVLEKTE BUIDELMUIS

Dasyurus maculatus

De buidelduizen zijn jagers en vleeseters. Deze dieren hebben de grootte van een kat, behalve de Reuzenbuidelduis of Gevlekte buidelduis (hier afgebeeld), die wel 60 cm groot kan worden. Bij deze laatste zijn de romp, de poten en de staart met lichte vlekken bedekt. De buidelduis kent geen vrees. Vroeger kwam zij voor in geheel Australië en Tasmanië, daar waar er bomen waren. Nu is zij in vele gebieden uitgeroeid. De buidel is goed ontwikkeld en heeft zes tepels. Meestal worden er echter meer dan zes jongen geboren, soms zelfs 24, zodat een groot deel van de worp moet ten onder gaan.



347. — Gevlekte buidelduis - Dasyure tacheté

347. DASYURE TACHETE

Dasyurus maculatus

Les dasyures sont des chasseurs et des carnivores. Ces animaux sont de la taille d'un chat, à l'exception du Dasyure géant ou tacheté (figuré ici), qui peut atteindre une longueur de 60 cm environ. Chez ce dernier le corps, les pattes et la queue sont recouverts de taches claires. Le dasyure tacheté est très hardi. Autrefois il se rencontrait partout en Australie et en Tasmanie où il y avait des arbres. Actuellement il est exterminé en plusieurs régions. La poche ventrale est bien développée et a six mamelles. Le plus souvent pourtant plus de six petits viennent au monde, parfois jusqu'à 24, de sorte qu'une bonne partie de la portée doit périr.

348. PLUIMSTAARTBUIDELMUIS

Phascalogale penicillata

De Pluimstaartbuidelmuis is een nachtdiertje ter grootte van een eekhoorn, maar met de bloeddorst van een wezel. Zij eet kleine zoogdieren, vogels, hagedissen en insecten. Zij komt voor over geheel Australië, maar ontbreekt op Tasmanië. Zij is zeer schadelijk voor het pluimvee. Daarom hebben de blanke bewoners van Australië reeds zoveel buideldieren uitgeroeid, maar hebben hen tot nu toe nog niet definitief kunnen uitgeschakelen.



348. — Pluimstaartbuidelmuis - Phascalogale à queue touffue

348. PHASCALOGALE A QUEUE TOUFFUE

Phascalogale penicillata

Le Phascalogale à queue touffue est un petit animal nocturne de la taille d'un écureuil, mais à l'instinct sanguinaire comme une belette. Il dévore de petits mammifères, des oiseaux, des lézards et des insectes. Il se rencontre partout en Australie mais est absent en Tasmanie. Il est très nuisible à la volaille. Les habitants blancs de l'Australie qui ont déjà exterminé tant de marsupiaux, n'ont pas connu jusqu'ici le même succès avec le phascalogale.

349. MIERENEGEL

Echidna aculeata

De kop van de Mierenegel loopt uit op een naakte, buisvormige snuit. Aan het uiteinde hiervan staan de neusgaten en de kleine mondopening. De lange tong is bedekt met speeksel, zodat het voedsel, bestaande uit mieren, termieten en andere insecten, er gemakkelijk aankleeft. De mierenegel leeft in bossen, en in open, heuvelachtige streken. De eieren, meestal twee, worden niet uitgebroed in een nest, maar in een buidel, die het wijfje elk jaar in de voortplantingstijd vormt. Als de buidel niet meer nodig is verdwijnt hij weer. De mierenegel leeft op Tasmanië, het Australische vasteland en het zuid-oosten van Nieuw-Guinea.

349. ECHIDNE

Echidna aculeata

La tête de l'Echidné se termine sur un museau glabre, tubulaire. A l'extrémité de celui-ci se trouvent les narines et le petit orifice buccal. La longue langue est recouverte de salive gluante de sorte que la nourriture, se composant de fourmis, de termites et d'autres insectes y reste collée.

L'échidné vit dans les bois et dans du terrain vallonné découvert. Les œufs, le plus souvent deux, ne sont pas couvés dans un nid, mais dans une poche ventrale qui apparaît chaque année chez la femelle, à l'époque de la reproduction. Lorsqu'elle n'est plus nécessaire, elle disparaît de nouveau.

L'échidné vit en Tasmanie, sur le continent australien et dans le sud-est de la Nouvelle Guinée.



349. — Mierenegel - Echidné



350. — Vogelbekdier - Ornithorhynque

350. VOGELBEKDIER

Ornithorhynchus anatinus

Het Vogelbekdier is een merkwaardig dier, met een bruine pels, een platte staart en een lichaamsvorm die enigszins aan die van een mol doet denken. De korte poten hebben zwemvliezen. Bij het lopen worden deze vliezen opgerold. Zeer opvallend is de hoornsnavel, die veel weg heeft van een eendesnavel. Tandën ontbreken.

Het vogelbekdier leeft in het oostelijk deel van het Australische kontinent, en op Tasmanië. Het eet insecten, slakken en mosselen. Dit dier wordt vooral langs de oevers van rivieren en meren gevonden.

Het wijfje legt eieren in een zelf gegraven hol. De eieren worden uitgebroed. Een eigenaardigheid is nog de gifklier. Het afgescheiden gif is dodelijk voor kleine dieren. Voor de mens is het zeer pijnlijk en kan dikwijls vergiftigingsverschijnselen tot gevolg hebben.

350. ORNITHORHYNQUE

Ornithorhynchus anatinus

L'Ornithorhynque est un animal remarquable, au pelage brunâtre, à queue aplatie et aux formes rappelant celles de la taupe. Les pattes courtes sont pourvues de palmures. Lors de la course, celles-ci sont enroulées. Le bec corné, ressemblant à celui du canard, est fort curieux. Il n'y a pas de dents. L'ornithorhynque vit dans la partie orientale du continent australien et en Tasmanie. Il mange des insectes, des limaces et des moules. Cet animal se rencontre généralement le long des rivières et des lacs.

La femelle pond ses œufs dans un terrier qu'elle a creusé elle-même. Les œufs sont couvés.

Une autre particularité est leur glande à venin. Le venin sécrété est mortel pour de petits animaux. Pour l'homme il est extrêmement douloureux et souvent il provoque tous les signes de l'empoisonnement.

B.13 - 1963

