

# COLEOPTERA CARABIDÆ

PAR

PIERRE BASILEWSKY (Tervuren)



## COLEOPTERA CARABIDÆ

---

Malgré le nombre assez restreint de Coléoptères Carabiques recueillis par la Mission d'exploration hydrobiologique belge au lac Tanganika, sous la direction de M. E. LELOUP, j'ai trouvé trois espèces nouvelles pour la faune du Congo belge, ainsi que certaines données biogéographiques dignes d'intérêt.

Les localités de Rumonge, Ulombolo, Malagarasi, Kasoje et Edith Bay se trouvent sur la rive Est du lac, les quatre dernières en territoire britannique. Les espèces nouvelles pour la faune du Congo belge sont marquées d'un astérisque.

### SOUS-FAMILLE CARABINÆ.

#### *Ctenosta senegalense* DEJEAN.

Albertville (XI.1946, 1 ex.).

Espèce assez commune, répandue dans toute l'Afrique tropicale et subtropicale, jusqu'à Madagascar.

### SOUS-FAMILLE OMOPHRONINÆ.

#### *Phrator multiguttatus* CHAUDOIR.

Albertville (XI.1946, 1 ex.).

Espèce orientale, caractéristique de la vallée du Nil, connue déjà au Congo d'Albertville et de Baudouinville.

### SOUS-FAMILLE CICINDELINÆ.

#### *Cicindela regalis* DEJEAN.

Albertville (30.X.1946, 1 ex.), Lukuga (9.XI.1946, 1 ex.), Baie de M'toto (24-27.XII.1946, 8 ex.).

Espèce très largement répandue, du Sénégal à l'Érythrée et au Natal, ne vivant que près des lacs ou des grandes rivières.

**Cicindela dongalensis** (KLUG) ssp. **imperatrix** SRNKA.

Albertville (30.X.1946, 6 ex.).

La forme typique est répandue du Sénégal à l'Angola et à la Nubie; la race *imperatrix* la remplace en Afrique Orientale, de l'Est du Congo et de l'Uganda jusqu'au Mozambique.

**Cicindela nilotica** DEJEAN.

Albertville (X-XI.1946, 12 ex.), Tembwe (20.XII.1946, 1 ex.), Rumonge (23.I.1947, 6 ex.).

Espèce commune dans presque toute l'Afrique Occidentale, Centrale et Orientale.

**Cicindela nysa** (GUÉRIN) ssp. **Quedenfeldti** W. HORN.

BASILEWSKY, 1948, Bull. Mus. roy. Hist. nat. Belg., XXIV, n° 5, p. 7.  
Tugulu (15.XI.1946, 1 ex.).

Race orientale, que je connais du Nord-Est et de l'Est du Congo, de l'Uganda et de l'Afrique Orientale Anglaise.

**Cicindela flavipes** PUTZEYS.

Tugulu (16.XI.1946, 1 ex.).

Espèce assez rare, spéciale à l'Angola et au Sud du Congo. Je l'ai signalée récemment du Kibali-Ituri, mais sa présence dans l'Est de la Colonie m'était inconnue.

**Cicindela chrysopyga** W. HORN.

Tugulu (10.XI.1946, 1 ex.).

Cet unique exemplaire a les pattes jaunes, comme les individus provenant du Katanga et du Lulua.

**Lophyra neglecta** (DEJEAN) ssp. **intermedia** KLUG  
(= *intermediola* W. HORN).

RIVALIER, 1948, Revue Franç. d'Entom., XV, p. 55.  
Albertville (XI.1946, 2 ex.), Lukuga (9.XI.1946, 1 ex.).

Race commune dans tout l'Est Africain, de l'Abyssinie au Cap.

SOUS-FAMILLE **SCARITINÆ.****Distichus picicornis** DEJEAN.

Albertville (7.XI.1946, 1 ex.), Ulombolo (8.I.1947, 1 ex.).

Espèce largement répandue dans toute l'Afrique Noire, bien que toujours assez rare au Congo.

**Parallelomorphus nitidulus** KLUG.

Albertville (30.X.1946, 1 ex.), Baie de Katibili (10.XII.1946, 7 ex.), Edith Bay (23.XII.1946, 15 ex.).

Espèce orientale, connue au Congo seulement dans l'Est et le Sud-Est.

**Scarites senegalensis** DEJEAN.

Baie de Kasoje (15.XII.1946, 1 ex.).

**Scarites senegalensis** (DEJEAN) ssp. **simogonus** CHAUDOIR.

Albertville (XI-XII.1946, 1 ex.).

Race peu nettement délimitée de la forme précédente.

**Clivina natalensis** PUTZEYS.

Albertville (7.XI.1946, 1 ex.).

Une des espèces les plus largement répandues en Afrique, de l'Abyssinie au Natal, très commune dans tout le Congo.

SOUS-FAMILLE **ANCHOMENINÆ**.**Metagonum patroboides** MURRAY ssp.

Ulombolo (8.I.1947, 2 ex.).

La forme typique habite l'Afrique Occidentale, du Sénégal au Congo belge; plusieurs races sont connues de l'Est du Congo, mais ces deux individus me paraissent différents.

SOUS-FAMILLE **HARPALINÆ**.**Dichætochilus incrassatus** BOHEMAN.

Albertville (XI.1946, 2 ex.), Riv. Lugumba (28.XI.1946, 1 ex.), Ulombolo (8.I.1947, 1 ex.).

Espèce méridionale et orientale, n'existant au Congo que dans l'Est et le Sud.

**Dichætochilus mœstus** CHAUDOIR (= *australis* PÉRINGUEY).

Ulombolo (8.I.1947, 3 ex.).

**\*Dichætochilus prolixus** BASILEWSKY.

1948, Mém. Soc. Entom. Belg., XXV, p. 65.

Riv. Lugumba (28.XI.1946, 3 ex.).

Espèce que j'ai décrite récemment sur quelques individus de Lulanguru, près de Tabora, dans le Tanganyika Territory. J'en ai vu dernièrement un exemplaire provenant de la Rhodésie du Nord; Mweru-Wantipa, Buleya (H. J. BREDO, 21.IV.1944). C'est une espèce nouvelle pour la faune du Congo.

**Eudichirus pseudochropus** KUNTZEN.

Riv. Lugumba (28.XI.1946, 1 ex.).

Espèce méridionale, rare au Congo, où je ne la connais que du Sud-Est.

**Tukyellus ornatus** PÉRINGUEY.

Albertville (15-30.XI.1946, 1 ex.).

Espèce très rare en Afrique Centrale.

**Hyparpalus holosericeus** DEJEAN.

Albertville (XI-XII.1946, 2 ex.).

Espèce largement répandue dans toute l'Afrique, du Sénégal à Madagascar.

**Parasiopelus lucens** PUTZEYS.

Ulombolo (8.I.1947, 1 ex.).

Espèce d'Afrique Orientale et Centrale.

**Africobatus harpaloides** GUÉRIN.

Albertville (15-30.XI.1946, 1 ex.).

Espèce commune dans tout le Congo, répandue dans la majeure partie de l'Afrique tropicale et subtropicale.

**Neosiopelus melancholicus** BOHEMAN.

Albertville (XI-XII, 1946, 1 ex.).

**Xenodochus melanarius** (BOHEMAN) ssp. **kivuensis** BASILEWSKY.

1947, Revue Franç. d'Entom., XIII, p. 177.

Albertville (XI-XII.1946, 1 ex.).

J'ai signalé la présence de cette race au Kivu, alors que la race *sudanicus* ALLUAUD n'existe, au Congo, que dans l'Ituri.

**Ooidius dorsiger** KLUG.

Albertville (XI-XII.1946, 1 ex.).

Espèce répandue dans toute l'Afrique Centrale, surtout au Sud de l'Équateur.

**Bradybænus opulentus** BOHEMAN.

Kabimba (XI-XII.1946, 1 ex.), Albertville (XI-XII.1946, 4 ex.), entre Rumonge et Kigoma (23.I.1947, 1 ex.).

Alors que *Bradybænus scalaris* OLIVIER se rencontre dans presque tout le Congo, *Br. opulentus* BOHEMAN, espèce orientale et méridionale, n'existe que dans la région des Grands Lacs.

SOUS-FAMILLE **TETRAGONODERINÆ.****Tetragonoderus luridus** QUEDENFELDT.

Edith Bay (23.XII.1946, 1 ex.).

Rare espèce, rencontrée çà et là en Afrique Centrale.

**Cyclosomus Buqueti** DEJEAN.

Albertville (XI-XII.1946, 1 ex.).

Espèce guinéenne, jamais commune, répandue du Sénégal à l'Est du Congo.

SOUS-FAMILLE **CALLISTINÆ.****Pachydinodes bipustulatus** (BOHEMAN) ssp. **granulipennis** CHAUDOIR.

Albertville (XI-XII.1946, 1 ex.).

Espèce très largement répandue dans toute l'Afrique, du Sénégal à l'Érythrée et au Cap; la race *granulipennis* CHAUDOIR est spéciale à l'Afrique Orientale, du Somaliland au Kenya, et ne se rencontre que dans l'Est du Congo.

**Chlænites (Chlæniostenus) angustatus** DEJEAN.

Ulombolo (8.I.1947, 1 ex.).

Espèce commune dans toute l'Afrique.

**Chlænites (Chlæniostenus) sulcipennis** (DEJEAN)  
ssp. **sulcatulus** BOHEMAN.

Baie de Kasoje (15.XII.1946, 1 ex.).

Race orientale et méridionale, répandue de l'Abyssinie au Cap, dans l'Angola et, au Congo, surtout dans l'Est.

**Trachychlænites gonioderus** (LAFERTÉ) ssp. **nigrofemoralis** BASILEWSKY.

1949, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris, XXVIII, p. 151.

Albertville (XI-XII. 1946, 1 ex.).

Tandis que la forme typique est purement guinéenne, habitant du Sénégal au Togo, la ssp. *nigrofemoralis* peuple le Congo belge, la Rhodésie et le Nyassaland.

SOUS-FAMILLE **PANAGÆINÆ.****Craspedophorus merus** (PÉRINGUEY) ssp. **pseudofestivus** BURGEON.

Entre Rumonge et Kigoma (23.I.1947, 1 ex.).

Race spéciale au Katanga et à l'Est du Congo.

**\*Craspedophorus sexmaculatus** PÉRINGUEY.

Albertville (XI.1946, 1 ex.).

Espèce connue seulement de la Rhodésie, nouvelle pour la faune du Congo.

SOUS-FAMILLE **ORTHOGONINÆ.****Orthogonius Clarkei** MURRAY.

Albertville (15-30.XI.1946, 1 ex.), Tugulu (16-25.XI.1946, 6 ex.).

Espèce commune, largement répandue en Afrique Occidentale et Centrale.

**Orthogonius perpuncticollis** BURGEON.

Tugulu (15.XI.1946, 5 ex.).

Espèce décrite de divers endroits du Congo, recueillie par M. COLLART dans le Kibali-Ituri.

SOUS-FAMILLE **THYREOPTERINÆ.****Thyreopterus plesius** (ALLUAUD) var. **coriaceus** BURGEON.

Baie de Kolobo (3.I.1947, 1 ex.).

BURGEON a décrit cette variété sur quelques individus de la Lulua.

SOUS-FAMILLE **ANTHINÆ.****Eccooptera cupricollis** CHAUDOIR.

Estuaire du Malagarasi (III.1947, 1 ex.).

Cet exemplaire appartient indubitablement à une race géographique spéciale, qui semble voisine de *taborana* STROHM., et qu'il est impossible de caractériser en se basant sur un seul individu.

SOUS-FAMILLE **BRACHININÆ.****\*Pheropsophus parallelus** DEJEAN.

Mwerazi (28.V.1947, 4 ex.).

Espèce d'Afrique Occidentale, jamais signalée du Congo.

**Brachinus armiger** DEJEAN.

Mulange (1.X.1947, 2 ex.).

Ces deux individus se rapprochent fortement de la var. *Marleyi* BARKER, décrite du Natal, et qui n'est qu'une variante individuelle.

**Brachinus sexnotatus** (LIEBKE) ssp. **Gérardi** BURGEON.

Albertville (12.XI.1946, 1 ex.).

Je ne connaissais qu'un seul exemplaire de cette race, le type, provenant de Kiambi.

**Styphlomerus Neavei** (LIEBKE) ssp. **katanganus** LIEBKE.

Riv. Lugumba (28.XI.1946, 2 ex.).

Ces deux individus sont absolument identiques aux types du Katanga.

Musée du Congo belge, Tervuren.

---

