




165. *Melanostoma mellinum*




166. *Melanostoma scalare*




167. *Merodon aeneus*




168. *Merodon avidus*




169. *Merodon equestris*




170. *Merodon ruficornis*




171. *Merodon rufus*




172. *Metasyrphus corollae*




173. *Metasyrphus lapponicus*




174. *Metasyrphus latifasciatus*




175. *Metasyrphus latilunulatus*




176. *Metasyrphus luniger*




177. *Metasyrphus nielsenii*




178. *Metasyrphus nitens*




179. *Microdon devius*




180. *Microdon eggeri*




181. *Microdon mutabilis*




182. *Myathropa florea*




183. *Myolepta luteola*




184. *Myolepta vara*




185. *Neoscia aenea*




186. *Neoscia dispar*




187. *Neoscia floralis*




188. *Neoscia geniculata*




189. *Neoascia interrupta*




190. *Neoascia obliqua*




191. *Neoascia podagrica*




192. *Neoascia unifasciata*




193. *Neocnemodon brevidens*



194. *Neocnemodon latitarsis*




195. *Neocnemodon pubescens*




196. *Neocnemodon vitripennis*







197. *Olbiosyrphus laetus*




198. *Orthonevra brevicornis*




199. *Orthonevra elegans*




200. *Orthonevra geniculata*




201. *Orthonevra intermedia*




202. *Orthonevra nobilis*




203. *Orthonevra splendens*




204. *Paragus albifrons*




205. *Paragus bicolor*




206. *Paragus finitimus*




207. *Paragus flammeus*




208. *Paragus haemorrhous*




209. *Paragus majoranae*




210. *Paragus tibialis*




211. *Parasyrphus annulatus*




212. *Parasyrphus lineola*




213. *Parasyrphus macularis*




214. *Parasyrphus malinellus*




215. *Parasyrphus nigratarsis*




216. *Parasyrphus punctulatus*




217. *Parasyrphus vittiger*




218. *Parhelophilus consimilis*




219. *Parhelophilus frutetorum*




220. *Parhelophilus versicolor*




221. *Pelecocera tricincta*




222. *Pipiza austriaca*




223. *Pipiza bimaculata*




224. *Pipiza fenestrata*




225. *Pipiza festiva*



226. *Pipiza lugubris*




227. *Pipiza luteitarsis*




228. *Pipiza noctiluca*







229. *Pipiza notata*




230. *Pipiza quadrimaculata*




231. *Pipiza signata*




232. *Pipizella annulata*




233. *Pipizella divicoi*




234. *Pipizella maculipennis*




235. *Pipizella varipes*




236. *Pipizella virens*




237. *Pipizella zeneggenensis*




238. *Pipizella nov.sp.*




239. *Platycheirus albimanus*




240. *Platycheirus ambiguus*




241. *Platycheirus angustatus*




242. *Platycheirus clypeatus*




243. *Platycheirus discimanus*




244. *Platycheirus fulviventris*




249. *Platycheirus perpallidus*




250. *Platycheirus scambus*




251. *Platycheirus scutatus*




252. *Platycheirus sticticus*




245. *Platycheirus immarginatus*




246. *Platycheirus manicatus*




247. *Platycheirus ovalis*




248. *Platycheirus peltatus*




253. *Platycheirus tarsalis*




254. *Pocota personata*




255. *Psarus abdominalis*




256. *Pyrophaena granditarsa*




257. *Pyrophaena rosarum*



259. *Rhingia rostrata*




258. *Rhingia campestris*




260. *Scaeva pyrastris*







261. *Scaeva selenitica*




262. *Sericomyia lappona*




263. *Sericomyia silentis*




264. *Sphaerophoria abbreviata*




265. *Sphaerophoria batava*




266. *Sphaerophoria loewi*




267. *Sphaerophoria menthastri*




268. *Sphaerophoria philantus*




269. *Sphaerophoria rueppelli*




270. *Sphaerophoria scripta*




271. *Sphaerophoria taeniata*




272. *Sphaerophoria virgata*




273. *Sphegina clunipes*




274. *Sphegina kimakowiczi*




275. *Sphegina nigra*




276. *Sphegina sibirica*




277. *Sphiximorpha subsessilis*




278. *Spilomyia saltuum*




279. *Syrretta pipiens*




280. *Syrphus nitidifrons*




281. *Syrphus ribesii*




282. *Syrphus torvus*




283. *Syrphus vitripennis*




284. *Temnostoma apiforme*




285. *Temnostoma bombylans*




286. *Temnostoma vespiforme*




287. *Trichopsomyia carbonaria*




288. *Trichopsomyia flavitarse*




289. *Trichopsomyia lucida*



290. *Triglyphus primus*




291. *Tropidia fasciata*




292. *Tropidia scita*







293. *Volucella bombylans*




294. *Volucella inanis*




295. *Volucella inflata*




296. *Volucella pellucens*




297. *Volucella zonaria*




298. *Xanthandrus comtus*




299. *Xanthogramma citrofasciatum*




300. *Xanthogramma pedissequum*




301. *Xylota abiens*




302. *Xylota coeruleiventris*




303. *Xylota curvipes*




304. *Xylota femorata*




305. *Xylota florum*




306. *Xylota ignava*




307. *Xylota lenta*




308. *Xylota meigeniana*




309. *Xylota nemorum*




310. *Xylota pigra*




311. *Xylota segnis*




312. *Xylota sylvarum*




313. *Xylota tarda*



314. *Xylota xanthocnema*



315. Distribution of woodland in the area (schematic)



316. Location of nature reserves (schematic)

## BIBLIOGRAPHY :

- AUBERT, J, J.-J. AUBERT and P. GOEGLIN (1976) : Douze ans de captures systématiques de Syrphides (Diptera) au Col de Bretolet (Alpes Valaisannes).- Mitt. Schweiz. Entom. Ges. 49 : 115-142.
- BARENDREGT, A. (1975) : Waardering zweefvliegen-inventarisaties. In : "Hoe waarden wij de natuur ?" : 56-63.- Uitgave Jeugdbondsuitgeverij.
- BARENDREGT, A. (1981) : Het voorkomen van het genus Brachyopa (Diptera : Syrphidae) in Nederland.- Nieuwsbrief E.I.S. Nederland, 16 : 11-16.
- BARENDREGT, A. (1983) : Syrphus nitidifrons BECKER 1921 from the Netherlands, with description of the male, and a key to the European Syrphus species (Diptera, Syrphidae).- Ent. Ber. (Amst.) 43 : 59-64.
- BARENDREGT, A. (1982) : Zweefvliegental 7e druk : 1-82.- Uitgave : Jeugdbondsuitgeverij.
- BANKOWSKA, R. (1964) : Syrphidae, in : Klucze do Oznaczenia Owadów Polski, XXVII Diptera, 34 : 1-236.- Warszawa.
- BARKMEYER, W (1986) : Zur Vorkommen seltener und bemerkenswerter Schwebfliegen in Niedersachsen (Diptera, Syrphidae).- Drosera 86 (2) : 79-88.
- CLAUSSEN, C. (1980) : Die Schwebfliegenfauna des Landsteils Schleswig in Schleswig-Holstein (Diptera, Syrphidae).- Faun.Ökol. Mitt., Suppl. 1 : 3-79.
- CLAUSSEN, C. (1986) : Zur Kenntnis der Schwebfliegenfauna des Landsteils Schleswig (Diptera, Syrphidae) - Nachtrag (1979-1983).- Faun.-Ökol. Mitt. 5 (1985) : 389-403.
- CLAUSSEN, C. und W. BARKMEYER (1986) : Zur Identität van Neoascia unifasciata STROBL (1898) mit einem Schlüssel für die in der Bundesrepublik Deutschland nachgewiesene arten der Gattung Neoascia WILLISTON 1886 (Diptera : Syrphidae)- Bonn. zool. Beitr. 37, H. 3 : 229-239.
- CLAUSSEN, C und E. TORP (1980) : Untersuchungen über vier Europäische Arten der Gattung Anasimyia SCHINER 1864 (Diptera : Syrphidae).- Mitt. zool. Mus. Univ. Kiel I, H. 4 : 3-16.
- COE, R.L. (1953) : Diptera, Syrphidae in : Handbooks for the identification of British Insects.- Vol. X, Pt. 1 : 1-98. London.
- COLLART, A. (1947) : Contribution à l'étude des Diptères de Belgique (5me note).- Bull. Ann. Soc. ent. Belg. 83 : 234-238.
- DE LANGHE, J.E., L. DELVOSALLE, J. DUVIGNEAUD, J. LAMBINON et C. VANDEN BERGHEN : Nouvelle Flore de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des Régions voisines, 2me éd. : 1-899. Meise.
- DELUCCHI, V. et H. PSCHORN-WALCHER (1955) : Les espèces du genre Cnemodon EGGER.- Z. angew. Ent., XXXVII, 492-506.
- DUSEK, J and P. LASKA (1976) : European species of Metasyrphus : key, descriptions and notes (Diptera : Syrphidae).- Acta ent. bohemoslov. 73 : 263-282.
- ENIWSITILE, P.F. (1982) : Dasysyrphus friuliensis VAN DER GOOT (Diptera : Syrphidae) in Welsh coniferous forest.- Entomologist's mon. Mag. 118 : 245.
- FASSOTTE (1979) : Eristalis abusivus COLLIN, Diptère Syrphide méconnue en Belgique.- Bull. Ann. Soc. entom. Belg. 116 : 13-15.
- GOEGLIN, P. (1974) : Contribution à l'étude systématique et écologique des Syrphidae (Dipt.) de la Suisse Occidentale.- Mitt. Schweiz. ent. Ges. 47 : 151-252.
- GOEGLIN, P. (1976) : Révision du genre Paragus (Diptera : Syrphidae) de la région paléarctique occidentale.- Mitt. Schweiz. ent. Ges. 49 : 476-485.
- GROOTAERT, P. et C. FASSOTTE (1981) : Contribution à l'étude de la faune des Diptères capturés en automne au piège Malaise à Ottignies (Belgique, Brabant).- Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg. 53.14 : 1-15.
- JACOBS, J.C. (1901) : Diptères de Belgique : Syrphidae.- Ann. Soc. ent. Belg. 45 : 324-333.
- LECLERCQ, J., C. GASPARD, J.-L. MARCHAL, C. VERSTRAETEN et C. WONVILLE (1980) : Analyse des 1600 premières cartes de l'Atlas Provisoire des Insectes de Belgique, et première liste rouge d'insectes menacés dans la Faune belge.- Notes fauniques de Gembloux N° 4 : 1 - 104. Gembloux.
- LECLERCQ, M. (1955) : Catalogue des Syrphidae (Diptera) de Belgique. Bull. Ann. Soc. ent. Belg. 91 : 171-186.
- LECLERCQ, M. (1962) : Syrphidae (Diptera) de Belgique III. Révision des Merodon MEIGEN. Bull. Ann. Soc. ent. Belg. 98 : 413-418.
- LECLERCQ, M. (1976) : Diptères Syrphides nouveaux pour la Faune belge : Merodon ruficornis MEIGEN et Eumerus tuberculatus RONDANI.- Bull. Ann. Soc. ent. Belg. 112 : 114.
- MALEC, F. (1986) : Eoeristalis pratorum (MEIGEN) in der Umgebung Kassels.- Philippa 5 : 78-81.
- NIELSEN, T. (1971) Syrphidae (Diptera) from Jaeren, Norway I.- Norsk ent. Tidssk. 18 : 53-73.
- OWEN, J. (1981) : Trophic variety and abundance of hoverflies (Diptera : Syrphidae) in an English suburban garden.- Holarct. Ecol. 4 : 221-228.
- SACK, P. (1930) : Syrphidae, Conopidae ; in Tierwelt Deutschlands 20. Diptera IV : 1-142. Jena.
- SACK, P. (1932) : Syrphidae ; in LINDNER, die Fliegen der Palaearktischen Region, 31 : 1-451. Stuttgart.
- SEGUY, E. (1961) : Diptères Syrphides de l'Europe occidentale.- Mémoires du Muséum National d'Histoire Naturelle. Série A, Tome XXIII : 1-248. Paris.
- SPEIGHT, M. (1978) : A check list of Irish Syrphidae (Diptera).- Bull. Irish Biogeographic Soc. 2 : 26-31.
- STUBBS, A.E. and S.J. FALK (1983) : British Hoverflies.- Brit. Entomol. and Nat. Hist. Soc. 1-253. London.

- THOMPSON, F.C. (1980) : The problem of old names as illustrated by Brachyopa "conica" PANZER, with a synopsis of Palaearctic Brachyopa MEIGEN (Diptera : Syrphidae).- Ent. scand. 11 : 209-216.
- THOMPSON, F.C. and E. TORP (1986) : Synopsis of the European species of Sphegina MEIGEN (Diptera : Syrphidae).- Ent. scand. 17 : 235-269.
- TORP, E. (1984) : De danske Svirrefluer (Diptera : Syrphidae). Kendetegn, levevis og udebreelse.- Fauna Føgger, København, 1-300.
- VAN DER GOOT, V.S. (1981) : De zweefvliegen van Noordwest-Europa en Europees Rusland, in het bijzonder van de Benelux.- Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, Hoogvliet, 1-275.
- VAN DER GOOT, V.S. (1982) : Het determinatiekenmerk voor de wijfjes van de twee Nederlandse Baccha-soorten onbetrouwbaar ? (Diptera : Syrphidae).- Ent. Ber. Amst. 42 : 17-19.
- VAN DER GOOT, V.S. (1986) : Zweefvliegen in kleur.- Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, Hoogvliet : 1- 40.
- WONVILLE, C. (1977) : Communes, hameaux et sites de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord-Ouest de la France et des territoires allemands et néerlandais limitrophes dans le quadrillage UTM de 10 x 10 km.- Faculté des Sciences Agronomiques de l'Etat. Zoologie et Faunistique, Gembloux, 1-228.

Note : The complete bibliography of Belgian Syrphidae is listed by :

- a) M. LECLERCQ (1955) for the period up to 1955.
- b) V.S. VAN DER GOOT (1981) for the period 1955 - 1980.
- c) V.S. VAN DER GOOT (1986)

#### ACKNOWLEDGEMENTS :

Sincere thanks are offered to all those who have given help, encouragement and support during the long period this paper was being composed. V.S. van der Goot (Amsterdam) has taught me most of what I know about hoverflies and supplied valuable information during his many visits and in his innumerable letters.

Particular thanks also to Dr. P. Grootaert, who did not only give me access to the I.R.S.N.B. collections and Malaise trap material, but also made the publication of this study possible; to Dr. N. Magis of the Liège University, who enabled me to study the collection in his keeping; to Ir. Ch. Verstraeten for his friendly encouragement and for the supply of so much material and such amount of information.

A considerable number of naturalists, Dutch and Belgian, have contributed in a greater or lesser degree by supplying recent records; I warmly thank them for the trouble they have taken. Dutch contributors are: A. Barendregt, B. Brugge, M. Delfos, P. Hartog, W. Hurkmans, R. Leys, P. Schoorl, J. Timmer, V.S. van der Goot, M. van Veen, T. Zeegers and above all Drs. J.A.W. Lucas, who kept supplying me with additional and invariably interesting information. The many Belgian contributors are: M. Alderweireldt, P. Anrys, A. Anselin, S. Brinckman, L. Crèvecoeur, H. Deblauwe, L. De Bruyn, N. De Buck, L. Declercq, F. Defoort, F. De Scheemaeker, K. Desender, M. De Meyer, J. Dewispelaere, H. Dirickx, M. Espeel, C. Fassotte, C. Gaspar, P. Grootaert, D. Gryffroy, G. Haghebaert, H. Hillewaert, A. Huysseune, M. Leclercq, K. Hofmans, N. Magis, J. Menten, P. Lust, P. Pals, M. Pollet, M. Pottier, P. Rasmont, K. Reynaert, A. Ryckaert, J. Seys, B. Vandepitte, F. Vanhoutte, M. Van Kerckvoorde, R. Van-nieuwenhuyse, J. Van Stalle, K. Verbeke, C. Verlinden.

Without the efforts of my co-author, K. Decler, much information, especially about the north-west of the country, would not have been incorporated here. My thanks to him and to Dr. P. Grootaert for the critical reading of the text.

Last but not least I thank my wife, not only for typing part of the text, but for her patience and understanding in the many years it took to assemble the material for this study.

L. Verlinden