
Catalogue des Araignées de Belgique

Partie VIII

Gnaphosidae

par Maurice RANSY* & Léon BAERT*

* Institut royal des Sciences naturelles de Belgique
Département d'Entomologie
Rue Vautier 29
B - 1040 BRUXELLES

TABLE DES MATIERES

Abstract	8
Résumé	8
Introduction	8
Liste des Gnaphosidae de Belgique	8
Liste systématique des espèces	9
Littérature consultée	18
Cartes de répartition	20

ABSTRACT

Catalogue of the spiders from Belgium. Eighth part. The Gnaphosidae. A catalogue is given of this family (spiders) for Belgium, together with a distribution map for each species.

Key words: Spiders - Belgium - Distribution

RÉSUMÉ

Catalogue des araignées de Belgique. Partie huit. Un catalogue des araignées de la famille des Gnaphosidae est établi pour la Belgique. La distribution de chaque espèce est indiquée sur des cartes à quadrillage U.T.M.

MOTS CLÉS: Araignées - Belgique - distribution

INTRODUCTION

La plupart des Gnaphosidae sont des chasseurs nocturnes qui vivent sous les pierres. Ils se distinguent des Clubionidae par la position des filières antérieures. Chez les Gnaphosidae elles sont séparées l'une de l'autre, ce qui n'est pas le cas chez les Clubionidae où elles se touchent.

La nomenclature est basée sur le catalogue de PLATNICK (1989).

Pour l'identification des espèces nous avons utilisés les ouvrages de TULLGREN (1945), LOCKET & MILLIDGE (1951), GRIMM (1985) et ROBERTS (1985).

Ce travail est basé sur les collections et les fichiers de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, ainsi que les renseignements concernant les captures qui nous ont été communiqués par les personnes suivantes : Marc ALDERWEIRELDT, Robert BOSMANS, Prof. Dr. Jan HUBLE, Jos JACOBS, Marc JANSEN, Rudy JOCQUE, Robert KEKENBOSCH, Jean KEKENBOSCH, Jean-Pierre MAELFAIT, Hendrik SEGERS, Johan VAN KEER en Herman VANUYTVEN.

Nous remercions chaleureusement ces personnes.

Date de clôture : 31 décembre 1989.

LISTE DES GNAPHOSIDAE DE BELGIQUE

Callilepis nocturna (LINNAEUS,1758)

Drassodes cupreus (BLACKWALL,1834)

Drassodes hypocrita (SIMON,1878)

Drassodes lapidosus (WALCKENAER,1802)

Drassodes pubescens (THORELL,1856)

Drassyllus lutetianus (L.KOCH,1866)

Drassyllus praeficus (L.KOCH,1866)

Drassyllus pumilus (C.L.KOCH,1839)

Drassyllus pusillus (C.L.KOCH,1833)

Gnaphosa leporina (L.KOCH,1866)

Gnaphosa lucifuga (WALCKENAER,1802)

Gnaphosa lugubris (C.L.KOCH,1839)

Gnaphosa nigerrima L. KOCH,1877

Haplodrassus dalmatensis (L. KOCH,1866)

Haplodrassus kulczynskii LOHMANDER, 1942
Haplodrassus signifer (C.L.KOCH, 1839)
Haplodrassus silvestris (BLACKWALL, 1833)
Haplodrassus umbratilis (L.KOCH, 1866)

Micaria dives (LUCAS, 1846)
Micaria formicaria (SUNDEVALL, 1832)
Micaria fulgens WALCKENAER, 1802
Micaria guttulata (C.L.KOCH, 1839)
Micaria pulicaria (SUNDEVALL, 1831)
Micaria romana L.KOCH, 1866
Micaria silesiaca L.KOCH, 1875
Micaria subocapa WESTRING, 1861

Phaeocedus braccatus (L.KOCH, 1866)
Poecilochroa conspicua (L.KOCH, 1866)
Poecilochroa variana (C.L.KOCH, 1839)

Scotophaeus blackwalli (Thorell, 1871)
Scotophaeus scutulatus (L.KOCH, 1866)

Trachyzelotes pedestris (C.L.KOCH, 1837)

Zelotes aeneus (SIMON, 1878)
Zelotes electus (C.L.KOCH, 1839)
Zelotes erebeus (THORELL, 1871)
Zelotes latreillei (SIMON, 1878)
Zelotes longipes (C.L.KOCH, 1866)
Zelotes petrensis (C.L.KOCH, 1839)
Zelotes pseudoclivicolis GRIMM, 1982
Zelotes subterraneus (C.L.KOCH, 1833)
Zelotes villicus (THORELL, 1875)

LISTE SYSTÉMATIQUE DES ESPÈCES

Callilepis nocturna (LINNAEUS, 1758)

SYNONYME. - Pythonissa nocturna LINNAEUS, 1758.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 9, 15, 42, 83, 86.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N°1

LOCALITES DE CAPTURES. - LIEGE : Aywaille (83, 86), Comblain-au-Pont (86). -NAMUR : Han-sur-Lesse (9, 42, 86), Namèche (15, 42, 86), Romedenne. - LUXEMBOURG : Laroche-en-Ardenne (42).

HABITAT. - Dans les bois, surtout de conifères; sous les pierres ou dans les litières.

PHENOLOGIE. - Adultes capturés durant les mois : V, VII. L. BECKER écrit : toute l'année.

Drassodes cupreus (BLACKWALL, 1834)

SYNONYME. - Drassodes lapidosus var. cupreus BLACKWALL, 1834.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. 86, 126, 152, 168, 175, 181, 183, 185, 202, 219, 244, 273, 288.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - France, Grande-Bretagne et Pays-Bas.

CARTE DE REPARTITION N°2

LOCALITES DE CAPTURES. - ANTWERPEN: Kalmthout (202), Wijnegem/Deurne (288). - LIEGE: Bévercé, Eben-Emael, Elsenborn (Vallée de la Schwalm), Hautes-Fagnes (Les Stockais) (86), Montagne-St.Pierre (185), Theux (Le Rocheux) (244). - LIMBURG: Achel, Bree 't Hasselt (Urlobroeck), Genk (De Maten), Houthalen (ten Haagdoornheide), Kinrooi-Molenbeersel (Stamprooierbroeck) (152), Meeuwen, Neerpelt (Het Hageven) (219), Zonhoven. - LUXEMBOURG: Torgny. - NAMUR: Belvaux-Resteigne (175). - OOST-VLAANDEREN: Kemzeke. - WEST-VLAANDEREN: Beernev (273), De Haan (Kijkuit) (181), De Panne (Westhoek) (126), Koksijde, Lombardsijde, Nieuwpoort (183), Oostduinkerke.

HABITAT. - Dans les champs, les pinèdes, les bruyères, les dunes, les pelouses calcaires et les prairies. A également été signalée dans des sphaignes, des molinies, d'une fourmillière et de sous les pierres.

PHENOLOGIE. - Adultes capturés durant les mois : IV-XII.

Drassodes hypocrita (SIMON,1878)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. - 83, 86.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE. - Allemagne et France.

CARTE DE REPARTITION N° 3

LOCALITES DE CAPTURES. - LIEGE: Aywaille (83,86), Ben-Ahin (Trou Manto) (86).

HABITAT. - Un spécimen a été capturé à l'entrée d'une grotte.

PHENOLOGIE. - Adultes capturés durant les mois : II, III, V.

Drassodes lapidosus (WALCKENAER,1802)

SYNONYMES.- Drassus lapidosus WALCKENAER,1802; Drassodes myogaster (BERTKAU,1880).

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.- 7, 9, 15, 29, 30, 42, 49, 65, 86, 104, 121, 125, 138, 150, 168, 176, 177, 183, 185, 196, 219, 244, 276, 277.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE.- Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 4

LOCALITES DE CAPTURES.- ANTWERPEN: Brecht. - BRABANT: Boitsfort (9, 86), Houwaart (Walensbos) (150), Jette-St. Pierre, Villers-la-Ville. - HAINAUT: Obourg (St. Denis) (86). - LIEGE: Aywaille (86), Baraque Michel, Comblain-au-Pont (La Heid des Gattes) (15, 86), Comté-lez-Vielsalm (86), Elsenborn (138), Embourg (7, 9, 86), Esneux (15, 86), Hautes Fagnes (Les Stockais) (65), Mont Rigi (176, 177), Rocher Frédéric (86), Henri-Chapelle (86), La Calamine (Bois de Preuss) (86, 104), Lixhe (Montagne St.-Pierre), Logne (86), Modave (9,86), Montfort (La Gombe), Lanaye, Sougné-Remouchamps (La Heid des Gattes) (86), Sy (Vieuxville) (86), Theux (Le Rocheux) (244), Tilff (15, 86), Xhoris. - LIMBURG: As (86), Genk (Waterschei), Houthalen (Haagdoornheide) (168), Koersel/Beringen (277), Molenbeersel (Stamprooierbroek), Neerpelt (Hageven) (219), Zonhoven (De Teut). -LUXEMBOURG: Amonines (86), Barrière de Champlon, Chiny (86), Comté-lez-Vielsalm (86), Laroche-en-Ardenne (30, 86), Meix-devant-Virton, Mussy-la-Ville, Ny (Soy), Ozo (Izier) (86), Redu (86), St.-Hubert, Sy (86), Torgny, Vielsalm (86), Virton (86). - NAMUR: Dion, Frasnes-lez-Couvin, Gimnée, Han-sur-Lesse (86), Heure-en-Famenne (276), Jemelle, Nismes (86), Resteigne, Rochefort (86), Treignes, Wavreille (86), Yvoir (86). - OOST-VLAANDEREN: Machelen (Deinze), Waasmunster. - WEST-VLAANDEREN: Blankenberge, Brugge (Bulskampveld), De Panne (Westhoek) (86, 121), Knokke, Koksijde (121), Lombardsijde, Nieuwpoort (183), Oostduinkerke (121), Veldgem (196), Westende (49,86), Zedelgem, Zeebrugge (Orchisfontein).

HABITAT.- Vit sous les pierres, dans les mousses et les bruyères. Se rencontre également dans les dunes.

PHENOLOGIE.- Espèce capturée durant toute l'année.

Drassodes pubescens (THORELL,1856)

SYNONYME.- Drassus pubescens THORELL,1856.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.- 31, 42, 86, 127, 219, 244, 276, 277, 279.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE.- Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 5

LOCALITES DE CAPTURES.- ANTWERPEN: Herselt, Mol (127). - LIEGE: Barvaux-lez-Durbuy (31, 42, 86), Ferage, Logne (86), Theux (le Rocheux) (244). - LIMBURG: Genk (De Maten), Koersel/Beringen (277), Neerpelt (het Hageven) (219), Zonhoven. -LUXEMBOURG: Laroche-en-Ardenne, Ozo (Izier) (86), Salm-Château (86), Torgny. - NAMUR: Frasnes-lez-Couvin, Heure-en-Famenne (276, 279), Jemelle, Nismes (86), Resteigne, Treignes. - WEST-VLAANDEREN: De Panne, Zedelgem (Vloetenveld).

HABITAT.- Vit sous les pierres ou dans les bruyères ou les roselières.

PHENOLOGIE.- Adultes capturés durant les mois : V-IX.

Drassyllus lutetianus (L. KOCH,1866)

SYNONYMES.- Prosthesima lutetiana L. KOCH,1866; Drassyllus lutetianus (L. KOCH,1866).

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.- 42, 86, 103, 125, 187, 217, 276, 279.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE.- Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 6

LOCALITES DE CAPTURES.- ANTWERPEN: Beerse-Rijkevorsel (217).- HAINAUT: Forges (125).- LIMBURG: Dilsen (Grote Homo), Genk (De Maten) (42, 103), Lanklaar (Grote Homo), Neerpelt (Hageven).- LUXEMBOURG: Barvaux (42, 103), Bohan (103), Buzenol (187), Laroche-en-Ardenne (42, 86, 103), Stockem, Thibessart (La Mandebras), Wellin (42, 86, 103).- NAMUR: Han-sur-Lesse (42, 86, 103),

Heure-en-Famenne (276, 279).

HABITAT.- Vit dans les prairies, les marais, la bruyère. A également été signalée dans des litières.

PHENOLOGIE.- Adultes capturés durant les mois : III, V, VII.

Drassyllus praeficus (L. KOCH,1866)

SYNONYMES.- Prosthesima latitans L. KOCH,1878; Drassus praeficus (L. KOCH,1866).

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.- 14, 86, 176, 177, 217.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE.- Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N°7

LOCALITES DE CAPTURES.- ANTWERPEN: Beerse-Rijkevorsel (217).- LIEGE: Aywaille (86), Calsbourg (14), Hautes Fagnes (Mont Rigi) (176, 177).- LUXEMBOURG: Ethe-Buzenol, Torgny.- NAMUR: Jemelle, Resteigne.- OOST-VLAANDEREN: Waasmunster.

HABITAT.- Vit dans les pinèdes et les landes à bruyères.

PHENOLOGIE.- Adultes capturés durant les mois : IV-VI.

Drassyllus pumilus (C.L. KOCH,1839)

SYNONYME.- Drassylus pumilus (C.L. KOCH,1839).

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUE.- 147.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE.- Allemagne et France.

CARTE DE REPARTITION N°8

LOCALITES DE CAPTURES.- LIEGE: Aywaille (147).

HABITAT.- Le seul connu, en Belgique, est sous les pierres.

PHENOLOGIE.- Adultes capturés durant le mois : V.

Drassyllus pusillus (C.L. KOCH,1833)

SYNONYMES.- Prosthesima pusilla C.L. KOCH,1833; Drassylus pusillus (C.L. KOCH,1833).

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.- 42, 86, 143, 175, 187, 196, 202, 219, 269, 272, 273, 276.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE.- Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N°9

LOCALITES DE CAPTURES.- ANTWERPEN: Kalmthout (42, 86, 143, 202), Mol (143), Postel (42, 86, 143).- LIEGE: Xhoris.- LIMBURG: Genk (De Maten), Neerpelt (Hageven) (219).- LUXEMBOURG: Ethe-Buzenol (187), redu (42, 86), Wellin (42, 86).- NAMUR: Barvaux-Resteigne (175), Belvaux, Heure-en-Famenne (272, 276) Nismes (143), Treignes.- OOST-VLAANDEREN: Drongen (Bourgoyen), Kemzeke, St.-Denijs-Westrem (269), Melle, Waasmunster, Zelzate.- WEST-VLAANDEREN: Beernem (273), Heist (42, 86, 143), Veldegem (196).

HABITAT.- Cette espèce thermophile recherche surtout les sols arides. Elle a également été signalée de marais.

PHENOLOGIE.- Adultes capturés durant les mois : V-VIII.

Gnaphosa leporina (L.KOCH,1866)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.- 127, 202, 219, 277.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE.- Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N°10

LOCALITES DE CAPTURES.- ANTWERPEN: Kalmthout (127, 202). - LIMBURG: Koersel/ Beringen (277), Neerpelt (Hageven) (219).

HABITAT.- Dans les bruyères et les sphaignes.

PHENOLOGIE.- Adultes capturés durant les mois : VI, VII.

Gnaphosa lucifuga (WALCKENAER,1802)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.- 42, 86, 277.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE.- Allemagne et France.

CARTE DE REPARTITION N°11

LOCALITES DE CAPTURES.- LIMBURG: Koersel/Beringen (277). - LUXEMBOURG: Redu (42, 86).

HABITAT.- Sous les pierres.

PHENOLOGIE.- Se retrouve, selon BECKER, toute l'année.

Gnaphosa lugubris (C.L.KOCH,1839)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUE.- 86.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE.- Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 12

LOCALITES DE CAPTURES.- NAMUR: Leffe, Nismes (86), Yvoir (86).

HABITAT.- Sous les pierres.

PHENOLOGIE.- Adultes capturés durant les mois : IV et V.

Gnaphosa nigerrima L.KOCH,1877

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUE.- 219, 277.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE.- Allemagne.

CARTE DE REPARTITION N° 13

LOCALITES DE CAPTURES.- LIMBURG: Koersel/Beringen (277), Rekem (Vallei Ziepbeek) (219).

PHENOLOGIE.- Adultes capturés durant les mois :IV-VII.

Haplodrassus dalmatensis (L.KOCH,1866)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.- 86, 114, 121, 126, 181, 183, 202, 273, 276, 277, 288.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE.- Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 14

LOCALITES DE CAPTURES.- ANTWERPEN: Kalmthout (202), Wijnegem/Deurne (288). - LIMBURG: As, Genk (De Maten), Koersel/Beringen (277), Zonhoven. - NAMUR: Heure-en-Famenne (276). - WEST-VLAANDEREN: Beernem (273), Blankenberge (Orchisfontein), De Haan (Kijkuit) (181), De Panne (Westhoek) (86, 114, 121, 186), Knokke (Zwin) (114), Nieuwpoort (183), Westende, Zeebrugge (Fonteintje).

HABITAT.- A été capturée dans les dunes et régions sablonneuses.

PHENOLOGIE.- Adultes capturés durant les mois : IV-VII, X.

Haplodrassus kulczynskii LOHMANDER,1942

SYNONYME.- Haplodrassus microps (MENGE,1875)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.- 193.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE.- Allemagne et France.

CARTE DE REPARTITION N° 15

LOCALITES DE CAPTURES.- NAMUR: Nismes, Treignes (193).

HABITAT.- Dans les pelouses calcaires.

PHENOLOGIE.- Adultes capturés durant les mois : IV-VII, XII.

Haplodrassus signifer (C.L. KOCH,1839)

SYNONYME.- Drassus troglodytes (C.L. KOCH,1839).

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.- 9, 27, 42, 86, 121, 126, 146, 152, 168, 176, 177, 202, 219, 273, 276, 277, 288.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE.- Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 16

LOCALITES DE CAPTURES.- ANTWERPEN: Brecht, Kalmthout (9, 42, 86, 202), Postel (42, 86), Wijnegem/Deurne (288).- BRABANT: Auderghem (9, 42, 86), Bois de la Cambre (42, 86), Boitsfort (42, 86), Bruxelles (9), Diest (27, 42, 86), Groenendaal (42, 86), La Hulpe (42, 86), Leuven (42, 86), Mont-St.-Guibert (42, 86), Noirhat (42, 86).- HAINAUT: Fleurus.- LIEGE: Comblain-au-Pont (42, 86), Ferrières, Hautes Fagnes (Mont Rigi) (176, 177), Logne (86), Modave (42, 86), Xhoris.- LIMBURG: As (86), Bree 't Hasselt (Urblobroek), Bree (St. Martensheiden), Genk (De Maten) (42, 86), Houthalen (168), Kinrooi-Molenbeersel (Stampvoorsterbroek) (152), Koersel/Beringen (277), Neerpelt (Hageven) (219), Zonhoven (De Teut).- LUXEMBOURG: Bihain, Ethe-Buzenol, Lagland (146), Laroche-en-Ardenne (42, 86), Marloie (42, 86), Ozo (Izier) (86), Torgny, Vance, Vielsalm (86), Wellin (42, 86).- NAMUR: Barvaux (42, 86), Cerfontaine, Han-sur-Lesse (42, 86), Heure-en-Famenne (276), Nismes (Abannets), Romedenne, Yvoir (42, 86).- OOST-VLAANDEREN: Waasmunster.- WEST-VLAANDEREN: Beernem (273), De Panne (Westhoek) (121, 126),

Zedelgem (Vloeterveld).

HABITAT.- Vit dans les dunes, dans les bruyères, sous les pierres, dans les mousses, les sphaignes et les molinies. A été signalée dans de la litière de pins.

PHENOLOGIE.- Adultes capturés durant les mois : IV-VIII, X.

Haplodrassus silvestris (BLACKWALL, 1833)

SYNONYME.- *Drassus infuscatus* WESTRING, 1851.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.- 9, 42, 86, 114, 117, 244, 272, 273, 276.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE.- Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 17

LOCALITES DE CAPTURES.- BRABANT: Boitsfort (9, 42, 86, 114), Groenendaal (Forêt de Soignes) (42, 86).- LIEGE: Baraque Michel, Méry (42, 86, 114), Moha (Bois de Sétia), Theux (Le Rocheux) (244). -

LIMBURG: Meeuwen.- LUXEMBOURG: Poix-St.-Hubert.- NAMUR: Heure-en-Famenne (272, 276), Nismes, Treignes.- OOST-VLAANDEREN: Melden (Oudenaarde), Neigem (Neigembos), Zwijnaarde (Hutsepotbos) (114, 117). - WEST-VLAANDEREN: Beernem (273).

HABITAT.- Vit dans les mousses et les litières de bois.

PHENOLOGIE.- Adultes capturés durant les mois : IV-VII, X.

Haplodrassus umbratilis (L. KOCH, 1866)

SYNONYME.- *Drassus umbratilis* L. KOCH, 1866.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUE.- 86.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE.- Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 18

LOCALITES DE CAPTURES.- LIEGE: Modave (Camp romain), Xhoris.- LUXEMBOURG: Aisne, Heydt-lez-Bomal (Grotte de Hohière) (86).- NAMUR: Nismes (Roche à l'Homme) (86), Rochefort (86), Treignes.- WEST-VLAANDEREN: Nieuwpoort.

HABITAT.- Dunes et régions calcaires.

PHENOLOGIE.- Adultes capturés durant les mois : IV-V.

Micaria dives (LUCAS, 1846)

SYNOMYME.- *Micariolepis dives* (LUCAS, 1846), *Micariolepis splendissima* L. KOCH, 1876.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.- 42, 77, 126, 183, 219.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE.- Allemagne, France et Pays-Bas.

CARTE DE REPARTITION N° 19

LOCALITES DE CAPTURES.- ANTWERPEN: Kalmthout (42, 77).- LIMBURG: As, Neerpelt (Hageven) (219).- WEST-VLAANDEREN: De Panne (Westhoek) (126), Nieuwpoort (183).

HABITAT.- Vit dans les dunes, dans les bruyères et sous les pierres.

PHENOLOGIE.- Adultes capturés durant les mois : IV-V.

Micaria formicaria (SUNDEVALL, 1832)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUE.- 197b.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE.- Allemagne, France et Pays-Bas.

CARTE DE REPARTITION N° 20

LOCALITES DE CAPTURES.- NAMUR: Frasnes-lez-Couvin (Tiègne du Lion) (197b).

PHENOLOGIE.- Cette araignée a été capturée au mois de juin.

Micaria fulgens WALCKENAER, 1802

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.- 84, 185.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE.- Allemagne, France et Pays-Bas.

CARTE DE REPARTITION N° 21

LOCALITES DE CAPTURES.- LIEGE: Lixhe (Montagne St. Pierre) (186), Logne.- LIMBURG: As (84),

Neerpelt (Hageven) (219), Zonhoven (De Teut).

HABITAT.- Sous les pierres et dans les bruyères.

PHENOLOGIE.- Adultes capturés durant les mois : IV-VI.

Micaria guttulata C.L. KOCH,1839

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUE.- 189.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE.- Allemagne et France.

CARTE DE REPARTITION N° 22

LOCALITES DE CAPTURES.- NAMUR: Nismes (189).

HABITAT.- Cette araignée a été capturée dans une pelouse calcaire xérophile.

PHENOLOGIE.- Adultes capturés durant les mois : III, V-VIII.

Micaria pulicaria (SUNDEVALL,1831)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.- 9, 15, 28, 32, 42, 77, 114, 126, 131, 152, 168, 175, 176, 177, 181, 202, 217, 219, 266, 276, 269, 273, 276, 288.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE.- Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 23

LOCALITES DE CAPTURES.- ANTWERPEN: Antwerpen L.O. (267), Beerse-Rijkevorsel, Hoboken (266), Kalmthout (114, 202), St.Lenaerts, Wijnegem/Deurne (288).- BRABANT: Anderlecht, Auderghem (42, 77), Braine-l'Alleud (Sept Fontaines), Bruxelles (Bois de la Cambre) (9, 42, 77), Boitsfort (9, 42), Chaumont, Ganshoren, Groenendaal (42, 77), Nethen, St. Genesius-Rode (42, 77), Uccle (42, 77), Waterloo (42, 77).- HAINAUT: Braine-le-Comte (Bois de la Houssière (42, 77), Hennuyères (42, 77), Irchonwelz (32), Quaregnon (Les Marionvilles).- LIEGE: Büllingen, Comblain-au-Pont (15, 42, 77), Esneux (15), Hautes Fagnes (Mont Rigi) (176, 177), Jupille, Tilff (15, 42, 77), Wanze, Xhoris.- LIMBURG: As, Bree (St. Martensheide), Genk (De Maten), Houthalen (Haagdoornheide) (168), Kinrooi-Molenbeersel (Stamprooierbroek) (152), Maasmechelen, Meeuwen, Neerpelt (Hageven) (219), Zonhoven.- LUXEMBOURG: Ethe (187), Vance, Torgny.- NAMUR: Barvaux-Resteigne (175), Houyet (77), Heure-en-Famenne (276), Namèche (42, 77), Namur (42, 77), Yvoir (42, 77).- OOST-VLAANDEREN: Drongen (Bourgoyen), Gent, Kemzeke (De Stropers), Melle, St. Denijs-Westrem (269), Waasmunster, Waasten, Zelzate, Zwijnaarde (Hutsepot).- WEST-VLAANDEREN: Beernem (273), Blankenberge (Orchisfontein), De Haan (Kijkuit) (181), De Panne (Westhoek) (126), Koksijde, Nieuwpoort, Zeebrugge (Orchisfontein).

HABITAT.- Vit sous les pierres, sur les plantes basses (bruyères, pelouses, prairies,...) et dans les dunes. A également été capturée sous des écorces.

PHENOLOGIE.- Adultes capturés durant les mois : III-IX.

Micaria romana L.KOCH,1866

SYNONYME.- Micaria scintillans (O.P.-CAMBRIDGE,1871).

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.- 77, 126, 176.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE.- Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 24

LOCALITES DE CAPTURES.- LIEGE: Hautes Fagnes (Les Cothays) (77,176).- WEST-VLAANDEREN: De Panne (Westhoek) (126).

HABITAT.- Le seul publié est: dans les dunes.

PHENOLOGIE.- Adultes capturés durant le mois : V.

Micaria silesiaca L. KOCH,1875

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUE.- 146.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE.- Allemagne, Grande-Bretagne et Pays-Bas.

CARTE DE REPARTITION N° 25

LOCALITES DE CAPTURES.- LIEGE: Aywaille.- LIMBURG: As, Genk (De Maten).- LUXEMBOURG: Lagland (146).

HABITAT.- Le seul signalé est: dans la bruyère.

PHENOLOGIE.- Adultes capturés durant les mois : V-VI.

Micaria subopaca WESTRING,1861

SYNONYME.- Micaria albostriata (L. KOCH,1878)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.- 103, 124, 152.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE.- Grande-Bretagne et les Pays-Bas.

CARTE DE REPARTITION N° 26

LOCALITES DE CAPTURES.- BRABANT: Tremelo (103, 124).- LIMBURG: Bree (St. Martensheide, Urlobroek), Genk (De Maten), Hechtel, Kinrooi-Molenbeersel (Stampooyerbroek) (152), Meeuwen.- OOST-VLAANDEREN: Nazareth (124), Waasmunster.

HABITAT.- Le seul signalé est : dans les litières.

PHENOLOGIE.- Adultes capturés durant les mois : I, V, IX, XI.

Phaeocodus braccatus (L. KOCH, 1866)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.- 86, 110, 128, 168, 202, 217, 219.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE.- Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 27

LOCALITES DE CAPTURES.- ANTWERPEN: Beerse-Rijkevorsel (217), Kalmthout (114, 128, 202).- LIMBURG: As (86, 110, 114, 128), Houthalen (Ten Haagdoornheide) (168), Neerpelt (219).- LUXEMBOURG: Torgny (110, 114, 128).- NAMUR: Dion (110, 114, 128), Jemelle (128), Frasnes-lez-Couvin, Nismes (86, 110, 114, 128).

HABITAT.- Vit surtout dans les bruyères et les molinies.

PHENOLOGIE.- Adultes capturés durant les mois : V-VII, IX.

Poecilochroa conspicua (L. KOCH, 1866)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.- 9, 42, 86.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE.- Allemagne, France et les Pays-Bas.

CARTE DE REPARTITION N° 28

LOCALITES DE CAPTURES.- BRABANT: Bruxelles (Bois de la Cambre) (9, 42, 86).

HABITAT.- La seule indication fournie par Léon BECKER est: courant sur un tronc de hêtre.

Poecilochroa variana (C.L. KOCH, 1839)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUE.- 189.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE.- Allemagne et France.

CARTE DE REPARTITION N° 29

LOCALITES DE CAPTURES.- NAMUR: Treignes (189).

HABITAT.- Cette espèce a été trouvée dans une pelouse calcaire xérophile.

PHENOLOGIE.- Les spécimens capturés étaient tous des subadultes.

Scotophaeus blackwalli (THORELL, 1871)

SYNONYMES.- *Herpyllus blackwalli* (THORELL, 1871), *Drassus blackwallii* (THORELL, 1871).

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.- 14, 15, 86.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE.- Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 30

LOCALITES DE CAPTURES.- ANTWERPEN: Kalmthout (42, 86), Postel (15, 42, 86), Wommelgem.- BRABANT: Uccle.- HAINAUT: Montigny-le-Tilleul.- LIMBURG: Hasselt, Helchteren, Meeuwen.- LUXEMBOURG: Redu (42, 86), Torgny (86), Wellin (42, 86).- NAMUR: Dinant (42, 86), Louette-St. Pierre (14, 42, 86), Yvoir (42, 86).- OOST-VLAANDEREN: Moorsel (86), Wetteren, Zwijnaarde (Hutsepotbos).- WEST-VLAANDEREN: Blankenberge (86), Knokke (Zwin).

HABITAT.- dans les habitations, dans les dunes ...

PHENOLOGIE.- Adultes capturés durant les mois : IV-VIII, X.

Scotophaeus scutulatus (L. KOCH, 1866)

SYNONYME.- *Drassus scutulatus* L. KOCH, 1866.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.- 21, 23, 86, 114.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE.- Allemagne, France et les Pays-Bas.

CARTE DE REPARTITION N° 31

LOCALITES DE CAPTURES.- ANTWERPEN: Kalmthout (23).- BRABANT: Auderghem (86), Bruxelles

(86), Drogenbos, Laken (86), Londerzeel (86), Uccle (86).- HAINAUT: Acren (21).- LIEGE: Liège (86), Visé.- OOST-VLAANDEREN: Gentbrugge (114), Mariakerke (Gent), St. Amandsberg (114), Zele (86).- WEST-VLAANDEREN: Blankenberge (86), Middelkerke (86).

HABITAT.- Dans les habitations.

PHENOLOGIE.- Adultes capturés au cours des mois : II, IV-VI, VIII-X.

Trachyzelotes pedestris (C.L. KOCH, 1837)

SYNONYMES.- *Prosthesima pedestris* C.L. KOCH, 1837; *Trachyzelotes pedestris* (C.L. KOCH, 1849).

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.- 9, 15, 21, 42, 86, 121, 125, 150, 181, 185, 187, 192.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE.- Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 32

LOCALITES DE CAPTURES.- ANTWERPEN: Kalmthout (42, 86), Mechelen (21, 42, 86), Wommelgem (192).- BRABANT: Auderghem (Rouge-Cloître) (42), Boitsfort (9, 42), Bruxelles (9, 42), Diest (42, 86), Houwaart (Walenbos) (150), Noirhat (42, 86), Uccle (86), Villers-la-Ville (42, 86), Waterloo (42, 86), Zaventem (42, 86).- HAINAUT: Braine-le-Comte (Bois de la Houssière) (42, 86), Virelles (Bois Robert) (125).- LIEGE: Aywaille (86), Comblain-au-Pont (15, 42, 86), Esneux (15, 42, 86), Lixhe (Montagne-St. Pierre) (185), Modave (42, 86), Spa (42, 86), Sy (Vieuxville) (86), Tilff (42, 86), Wonck.- LUXEMBOURG: Barvaux (42, 86), Ethe-Buzenol (187), Laroche-en-Ardenne (42, 86), Redu (42, 86), Torgny, Vielsalm (42, 86), Virton (42, 86).- NAMUR: Furfooz (86), Han-sur-Lesse (42, 86), Hastière (42, 86), Nismes (86), Roly, Yvoir (86), Waulsort (42, 86).- WEST-VLAANDEREN: De Haan (Kijkuit) (181), Koksijde (121), Nieuwpoort, Zedelgem (Vloetemveld).

HABITAT.- C'est dans les bois de feuillus, les pinèdes, les prairies et les dunes que l'on trouve cette araignée. Elle est souvent signalée sous des pierres.

PHENOLOGIE.- Adultes capturés lors des mois : IV-VII, IX.

Zelotes aeneus (SIMON, 1878)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUE.- 238, 257, 267.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE.- Allemagne et France.

CARTE DE REPARTITION N° 33

LOCALITES DE CAPTURES.- ANTWERPEN: Antwerpen (238), Antwerpen L.O. (267), Ekeren.- OOST-VLAANDEREN: Melle (238).

HABITAT.- Vit dans les bruyères et les pelouses xérophiles.

PHENOLOGIE.- Adultes capturés durant les mois : VII-X.

Zelotes apricorum (L. KOCH, 1876)

Remarque: Tous les spécimens mâles que nous avons pu examiner sont des ♂♂ de *Zelotes subterraneus* (C.L. KOCH, 1833). Les femelles ne présentent pas de différences marquantes. Il est fort probable que *Zelotes apricorum* ne fasse pas partie de la faune belge.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.- 125, 152.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE.- Tous les pays limitrophes (sous réserve).

CARTE DE REPARTITION N° 34

LOCALITES DE CAPTURES.- LIMBURG: Kinrooi- Molenbeersel (Stampoopierbroek) (125, 152).

HABITAT.- Dans les bois de conifères et de feuillus.

PHENOLOGIE.- Adultes capturés durant les mois : VI-VIII.

Zelotes electus (C.L. KOCH, 1839)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.- 88, 121, 126, 131, 168, 181, 183, 219.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE.- Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 35

LOCALITES DE CAPTURES.- LIEGE: Ferrières.- LIMBURG: Genk (De Maten), Houthalen (Ten Haagdoornheide) (168), Neerpelt (Hageven) (219).- OOST-VLAANDEREN: Waaste (131).- WEST-VLAANDEREN: De Haan (Kijkuit) (181), De Panne (Westhoek) (121, 126), Knokke (Zwin) (88), Koksijde, Nieuwpoort (183), Oostduinkerke, Raversijde, Wenduine, Zedelgem.

HABITAT.- C'est dans les prairies, les bruyères et les mousses que l'on trouve cette araignée, ainsi que dans les dunes parmi les oyats.

PHENOLOGIE.- Adultes capturés lors des mois : IV-IX.

Zelotes erebeus (THORELL,1871)

SYNONYME.- Zelotes fuscomicans (SIMON,1878).

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.- 86, 193.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE.- Allemagne et France.

CARTE DE REPARTITION N° 36

LOCALITES DE CAPTURES.- LIEGE: Méry (Vallée de la Chawresse) (86).- NAMUR: Le Mesnil, Treignes (193).

HABITAT.- Signalée sur des buttes calcaires, dans des pinèdes et sous les pierres.

PHENOLOGIE.- Adultes capturés au cours des mois :VII-VIII, X.

Zelotes latreillei (SIMON,1878)

SYNONYME.- Prosthesima latreillei SIMON,1878.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.- 9, 65, 78, 86, 146, 152, 168, 176, 177, 186, 196, 202, 219, 267, 273, 276, 277, 288.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE.- Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 37

LOCALITES DE CAPTURES.- ANTWERPEN: Antwerpen L.O. (267), Berendrecht, Bornem (De Moer) (186), Kalmthout (202), Wijnegem/Deurne.- BRABANT: Keerbergen.- LIEGE: Hautes Fagnes (Mont Rigi et Les Stockais) (65, 78, 86, 176, 177), Modave (86), Xhoris.- LIMBURG: Beringen/Koersel (277), Bree, Genk (De Maten), Houthalen (Ten Haagdoornheide) (168), Kinrooi-Molenbeersel (Stampoopierbroek) (152), Maasmechelen, Neerpelt (Hageven) (219), Opglabeeck, Zonhoven.- LUXEMBOURG: Bihain (Baraque Fraiture) (78), Lagland (146), Ozo (Izier), Poix-St. Hubert, Redu (9, 42, 78, 86), Torgny.- NAMUR: Frasnes-lez-Couvin, Gimnée, Han-sur-Lesse (42), Heure-en-Famenne (276), Nismes (86), Resteigne, Treignes.-OOST-VLAANDEREN: Drongen (De Bourgoyen), Gontrode, Waasmunster.- WEST-VLAANDEREN: Beernem (273), Brugge (Bulskampveld), Veldegem (196), Zedelgem (Vloetemveld).

HABITAT.- Cette araignée vit dans les bois humides, dans les pinèdes, les prairies. Elle a également été signalée dans la bruyère, les tourbières les mousses , sous les pierres et sous les écorces.

PHENOLOGIE.- Adultes capturés durant toute l'année sauf aux mois de janvier et décembre.

Zelotes longipes (C.L. KOCH,1866)

SYNOMYMES.- Prosthesima longipes L. KOCH,1866, Zelotes serotinus (L. KOCH,1866), Prosthesima serotina L. KOCH,1866.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.- 2, 3, 42, 86, 103, 114, 126, 152, 168, 181, 183, 201, 219.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE.- Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 38

LOCALITES DE CAPTURES.- ANTWERPEN: Kalmthout (23, 42, 86, 103, 201), Mol (114), Postel (42, 86).- HAINAUT: Papignies (42, 86).- LIMBURG: As (86, 103), Bree-Beek (St. Martensheide), Genk (De Maten) (42, 86), Houthalen (Ten Haagdoornheide) (168), Kinrooi-Molenbeersel (Stampoopierbroek) (152), Maasmechelen, Neerpelt (Hageven) (219), Opglabeeck (Grote Heide), Zonhoven (De Teut).- WEST-VLAANDEREN: De Haan (Kijkuit) (181), De Panne (Westhoek) (42, 86, 126), Heist (42, 86), Knokke (Zwin) (103), Nieuwpoort (183), Oostduinkerke (103).

HABITAT.- C'est surtout dans les endroits arides (dunes et bruyères) que l'on rencontre cette araignée. Elle a, cependant, été capturée dans des mousses et des sphagnes.

PHENOLOGIE.- Adultes capturés durant les mois : IV-X.

Zelotes petrensis (C.L. KOCH,1839)

SYNONYME.- Prosthesima petrensis C.L. KOCH,1839.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.- 9, 30, 42, 86, 146, 152, 168, 202, 267, 277.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE.- Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 39

LOCALITES DE CAPTURES.- ANTWERPEN: Antwerpen L.O. (267), Kalmthout (202).- BRABANT: Halle, Hofstade (86).- HAINAUT: Hautrage (86).- LIEGE: Comblain-au-Pont, Ferrières, La Calamine (86), Lixhe (Montagne-St. Pierre) (86).- LIMBURG: As (86), Bree, Beek (St. Martensheide), Genk (De Maten), Houthalen (Ten Haagdoornheide) (186), Kinrooi-Molenbeersel (Stampoopierbroek) (152), Koersel/Beringen

(277), Maasmechelen (De Mechelse Heide), Neerpelt (Hageven) (219), Opglabeeck, Zonhoven.- LUXEMBOURG: Lagland (146), Laroche-en-Ardenne (30, 42, 86), Ozo (Izier) (86), Redu (42, 86).- NAMUR: Agimont, Frasnes-lez-Couvin, Gimnée, Han-sur-Lesse (4é, 86), Hermeton-sur-Meuse (86), Heure-en-Famenne, Jemelle (86), Merlemon, Nismes (86), Rochefort (86), Yvoir (9, 42, 86), Waulsort.- OOST-VLAANDEREN: Waasmunster.- WEST-VLAANDEREN: Knokke (Zwin).

HABITAT.- Se rencontre dans les prairies, la bruyère et les dunes, ainsi que dans les mousses et sous les pierres.

PHENOLOGIE.- Adultes capturés au cours des mois : III-IX, XII.

Zelotes pseudoclivicollis GRIMM, 1982

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUE.- 240, 253.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE.- Allemagne et France.

CARTE DE REPARTITION N° 40

LOCALITES DE CAPTURES.- LIEGE: Poulseur/Esneux (Montfort, La Gombe) (240, 253).

HABITAT.-

PHENOLOGIE.- Les captures ont été faites au mois de mai.

Zelotes subterraneus (C.L. KOCH, 1833)

SYNONYME.- Prosthesima subterranea C.L. KOCH, 1833.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.- 9, 15, 30, 42, 86, 117, 152, 187, 217, 272, 273, 276, 277, 288.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE.- Tous les pays limitrophes.

CARTE DE REPARTITION N° 41

LOCALITES DE CAPTURES.- ANTWERPEN: Herentals (86), Kalmthout (42, 86), Mol (Zilver meer), Postel (42, 86), Sint Lenaarts (217), Wijngem/Deurne (288).- BRABANT: Aarschot (42, 86), Auderghem (9, 42, 86), Bois de la Cambre (9, 42, 86), Boitsfort (9, 42, 86), Bousval (42, 86), Bruxelles (9, 42, 86), Diest (42, 86), Forêt de Soignes, La Hulpe (42, 86), Leuven (15, 42, 86), Meerdalbos, Mont St.-Guibert (42, 86), Noirhat (42, 86), Villers-la-Ville (42, 86), Wezemael (15, 86).- HAINAUT: Bouffioulx, Quaregnon (Les Marionvilles).- LIEGE: Aywaille (86), Comblain-au-Pont (42, 86), Elsenborn, Logne (86), Méry (86), Modave (9, 42, 86), Spa (42, 86), Sy (Vieuxville) (86), Tilff (42, 86), Vielsalm (86).- LIMBURG: Achel, As, Bree (Urblobroek), Genk (Waterschei), Kinrooi-Molenbeersel (Stampooierbroek) (152), Koersel/Beringen (277), Lommel (86), Meeuwen, Zonhoven (De Teut).- LUXEMBOURG: Amonines (86), Buzenol (187), Dohan, Ethe, Laroche-en-Ardenne (30, 42, 86), Mirwart, Redu (9, 42, 86), St. Hubert (9, 42, 86), Torgny, Vielsalm (86), Virton.- NAMUR: Dave (42, 86), Denée, Frasnes-lez-Couvin, Han-sur-Lesse (42, 86), Hastière (42, 86), Heure-en-Famenne (272, 276), Jemelle, Namur (42, 86), Noiseux, Onoz-Spy (86), Rièzes, Romedenne, Sy (86), Winenne (86), Yvoir (9, 42, 86).- OOST-VLAANDEREN: Gent (42, 86), Neigem (Neigembos), Zwijnaarde (Hutsepotbos) (117).- WEST-VLAANDEREN: Beernem (273), Zedelgem (Vloetenveld).

HABITAT.- Sous les pierres et les écorces de bois mort, dans les marais, les mousses. Nous la trouvons également dans les bois de conifères et dans les bois de feuillus. Elle a été signalée sur des fourmillières.

PHENOLOGIE.- Adultes capturés lors des mois : III-XI.

Zelotes villicus (THORELL, 1875)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUE.- 193.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE.- Allemagne et France.

CARTE DE REPARTITION N° 42

LOCALITES DE CAPTURES.- NAMUR: Treignes (193).

HABITAT.- Capturée sur un côteau calcaire.

PHENOLOGIE.- Adultes capturés en mai et juin.

LITTÉRATURE CONSULTÉE





GRIMM, U., 1985. Die Gnaphosidae Mitteleuropas (Arachnida, Araneae). Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg, (NF) 26 : 318pp.





LOCKET, G.H. & MILLIDGE, A.F., 1951. British Spiders. Vol. I. Ray Society London, 310 pp.





ROBERTS, M.J., 1985. The Spiders of Great Britain and Ireland. Vol. I : Atypidae to Theridiosomatidae. Harley Books, 229 pp.





TULLGREN, A., 1945. Svensk Spindelfauna, Fam. 5-7. Clubionidae, Zoridae & Gnaphosidae. Stockholm,





141pp., 21 pl.
PLATNICK, N.I., 1989. Advances in Spider taxonomy 1981-1987. Manchester University Press, 673 pp.

















21. *Micaria fulgens*
WALCKENAER, 1802




22. *Micaria guttulata*
(C.L.KOCH, 1839)




23. *Micaria pulicaria*
(SUNDEVALL, 1831)




24. *Micaria romana*
L.KOCH, 1866




25. *Micaria silesiaca*
L.KOCH, 1875



26. *Micaria subocapa*
WESTRING, 1861



27. *Phaeocedus braccatus*
(L.KOCH, 1866)



28. *Poecilochroa conspicua*
(L.KOCH, 1866)

