
Catalogus van de Spinnen van België
Deel XI
Theridiidae, Anapidae en Theridiosomatidae

door Johan VAN KEER* & Herman VANUYTVEN**

* Oxdonckstraat 14
B-1880 KAPELLE OP DEN BOS

** Vekestraat 1
B- 2000 ANTWERPEN 1

INHOUD

Samenvatting	8
Résumé	8
Abstract	8
Inleiding	8
Lijst van de Belgische soorten	10
Bespreking van de soorten	11
Geciteerde literatuur	29
Verspreidingskaarten	30

SAMENVATTING

Drie families van spinnen (Araneae) worden in dit deel van de catalogus behandeld, de Theridiidae (55 soorten), de Anapidae (1 soort) en de Theridiosomatidae (1 soort). Voor elke soort wordt de gekende geografische verspreiding gegeven via een lijst van de vindplaatsen en een verspreidingskaart met U.T.M.-rooster. Een cirkelvormige aanduiding daarop geeft de vindplaats van een gecontroleerde spin aan, een driehoek duidt op een niet-gecontroleerde vangst. In zoverre mogelijk wordt een typering van de habitatvoorkeur en de voortplantingsperiode gegeven.

Trefwoorden: Spinnen - België - Verspreiding

RESUME

Trois familles d'araignées (Araneae) sont traitées dans cette partie du catalogue, Theridiidae (55 genres), Anapidae (1 genre) et Theridiosomatidae (1 genre). Pour chaque genre la répartition géographique connue est donnée par une liste des communes et une carte de répartition avec le schéma U.T.M. Une indication circulaire là-dessus indique d'une araignée contrôlée, un triangle indique une capture non-contrôlée. Autant que possible une caractérisation de la préférence d'habitat et la période de reproduction sont données.

Mots clés: Araignées - Belgique - Distribution

ABSTRACT


Three spider families (Araneae) are treated in this part of the catalogue, Theridiidae (55 species), Anapidae (1 species) and Theridiosomatidae (1 species). For each species the known geographical distribution is given with a list of the places where they are found and on a distribution map with U.T.M.-grid. A circler is used for spiders that are checked, a triangle for non-checked specimen. As far as possible a characterisation of their habitat and reproduction period is given.

Key words: Spiders - Belgium - Distribution

INLEIDING

De familie Theridiidae is met haar 55 vertegenwoordigers de tweede grootste in België na de Linyphiidae. Sinds eind 1986 begonnen werd met het opzoeken van de gegevens voor deze catalogus, werden 6 kogelspinnen aan de lijst toegevoegd. In 1987 *Robertus grashoffi* en *Theridion hannoniae*, in '89 *Theridion bellicosum*, in '90 *Carniella brignoli* en *Theridion hemerobium*, en begin '91 nog *Dipoena inornata*.

Volgende grafiek geeft het verloop aan van de publicatiedata van nieuwe soorten voor de Belgische fauna.



Figuur : Totaal aantal soorten vermeld in de literatuur

Het laat zich dus aanzien dat de reeks nog belangrijk kan toenemen. Een reden hiervoor is dat deze spinnen minder met bodemvallen worden verzameld en dat hun webben dikwijls klein en onopvallend zijn. De spinnen zelf zitten veelal verscholen en zijn daarom moeilijk te ontdekken. De meeste soorten worden daarom ook meestal in kleine aantallen verzameld.

Comaroma simoni, de enigste gekende vertegenwoordiger van de familie Anapidae in België, werd vroeger tot de Erigoninae en later tot de Theridiidae gerekend. WUNDERLICH (1986) plaatste het genus bij de Anapidae.

De derde behandelde familie, de Theridiosomatidae, vertoont gelijkenis met de Theridiidae. *Theridiosoma gemmosum* maakt in tegenstelling met de Theridiidae een wielweb. Het centrum van dit web wordt door een draad buiten het vlak van het web getrokken zodat het web de vorm van een omgekeerde paraplu heeft. *Theridiosoma gemmosum* werd eveneens pas in 1989 in België gevonden.

Deze spinnen zijn dikwijls moeilijk te determineren. Tevens werden enkele soorten pas recent beschreven, zoals *Enoplognatha latimana* welke daarvoor niet van *E. ovata* onderscheiden werd.

Daarom was het noodzakelijk om zoveel mogelijk collecties na te zien. In de verspreidingskaarten wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen exemplaren die door minstens één van de auteurs werden nagekeken en ongecontroleerde vangsten. Gecontroleerde vangsten worden voorgesteld door een zwarte gevulde cirkel, ongecontroleerde door een zwarte driehoek.

De collecties die geheel of gedeeltelijk nagezien werden zijn deze van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, van het Laboratorium voor Oecologie der Dieren, Zoögeografie en Natuurbehoud (Dir. Prof. Dr. H. DUMONT) van de Rijksuniversiteit Gent en van volgende personen: M. ALDERWEIRELDT, Dr. R. BOSMANS, Prof. Dr. J. HUBLÉ, M. JANSSEN, Dr. R. JOCQUÉ, M. RANSY en H. SEGERS.

Wij danken deze mensen voor het ter beschikking stellen van hun collectie. Verder dank aan degenen die ons hun gegevens hebben overgemaakt: L. BARA, J.P. BOSSELAERS, K. DECLEER en J. JACOBS.

Veel dank gaat ook uit naar Dr. L. BAERT en de Heer J. KEKENBOSCH van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen voor de geboden hulp.

Voor de naamgeving van de spinnen werd "Advances in Spider Taxonomy 1981-1987" (PLATNICK, 1989) gevolgd, met uitzondering voor *Theridion varians*. Deze spin behoudt die naam in plaats van *Theridion leuconotum* HAHN, 1831 welke door PLATNICK wordt opgegeven. Wij volgen SACHER in de heruitgave van "Monographie der Spinnen" van C.W. HAHN (SACHER, 1988). SACHER stelt dat *Theridion varians* HAHN de voorkeur krijgt alhoewel deze naam pas in 1883 gepubliceerd werd.

Datum van afsluiten: lente 1991.

LIJST VAN DE BELGISCHE SOORTEN

Theridiidae

- | | |
|---|---|
| <i>Achaearanea lunata</i> (CLERCK, 1757) | <i>Episinus angulatus</i> (BLACKWALL, 1838) |
| <i>riparia</i> (BLACKWALL, 1834) | <i>truncatus</i> LATREILLE, 1809 |
| <i>tepidariorum</i> (C.L. KOCH, 1841) | <i>Euryopis flavomaculata</i> (C.L. KOCH, 1836) |
| <i>tepidariorum simulans</i> (THORELL, 1875) | <i>laeta</i> (WESTRING, 1861) |
| <i>Anelosimus pulchellus</i> (WALCKENAER, 1802) | <i>Paidiscura pallens</i> (BLACKWALL, 1834) |
| <i>vittatus</i> (C.L. KOCH, 1836) | <i>Pholcomma gibbum</i> (WESTRING, 1851) |
| <i>Carniella brignolii</i> THALER & STEINBERGER, 1988 | <i>Robertus arundineti</i> (O.P.-CAMBRIDGE, 1871) |
| <i>Crustulina guttata</i> (WIDER, 1834) | <i>grasshoffi</i> WUNDERLICH, 1973 |
| <i>sticta</i> (O.P.-CAMBRIDGE, 1861) | <i>lividus</i> (BLACKWALL, 1836) |
| <i>Dipoena coracina</i> (C.L. KOCH, 1841) | <i>neglectus</i> (O.P.-CAMBRIDGE, 1871) |
| <i>erythropus</i> (SIMON, 1881) | <i>scoticus</i> JACKSON, 1914 |
| <i>inornata</i> (O.P.-CAMBRIDGE, 1861) | <i>Rugathodes bellicosum</i> (SIMON, 1873) |
| <i>melanogaster</i> (C.L. KOCH, 1845) | <i>Steatoda albomaculata</i> (DE GEER, 1778) |
| <i>prona</i> (MENGE, 1868) | <i>bipunctata</i> (LINNAEUS, 1758) |
| <i>tristis</i> (HAHN, 1833) | <i>grossa</i> (C.L. KOCH, 1838) |
| <i>Enoplognatha latimana</i> HIPPA & OKSALA, 1982 | <i>phalerata</i> (PANZER, 1801) |
| <i>mordax</i> (THORELL, 1875) | <i>triangulosa</i> (WALCKENAER, 1802) |
| <i>oelandica</i> (THORELL, 1875) | <i>Theonoe minutissima</i> (O.P.-CAMBRIDGE, 1879) |
| <i>ovata</i> (CLERCK, 1757) | <i>Theridion bimaculatum</i> (LINNAEUS, 1761) |
| <i>tecta</i> (KEYSERLING, 1884) | <i>blackwalli</i> O.P.-CAMBRIDGE, 1870 |
| <i>thoracica</i> (HAHN, 1833) | <i>familiare</i> O.P.-CAMBRIDGE, 1871 |
| | <i>hannoniae</i> DENIS, 1944 |
| | <i>hemerobium</i> SIMON, 1914 |
| | <i>impressum</i> L. KOCH, 1881 |

instabile O.P.-CAMBRIDGE, 1870
melanurum HAHN, 1831
mystaceum L. KOCH, 1870
pictum (WALCKENAER, 1802)
pinastris L. KOCH, 1872
simile C.L. KOCH 1836
sisyphium (CLERCK, 1757)
tinctum (WALCKENAER, 1802)
uhligi MARTIN, 1975
varians HAHN, 1833

Anapidae

Comaroma simoni BERTKAU, 1889

Theridiosomatidae

Theridiosoma gemmosum (L. KOCH, 1877)

BESPREKING VAN DE SOORTEN

THERIDIIDAE

Achaearanaea

Achaearanaea lunata (CLERCK, 1757)

SYNONIEMEN. - *Theridion formosum* (CLERCK, 1757), *Theridion lunatum* (CLERCK 1757).

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 10, 30, 65, 150, 152, 176, 199, 243, 276, 288.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omliggende landen.

VERSPREIDINGSKAART n° 1.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Aartselaar, Antwerpen, Dessel, Deurne (288), Mol, Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Oud-Turnhout (243), Postel, Ranst, Schilde, Sint Lenaerts, Wuustwezel. - BRABANT: Beersel, Dion-le-Mont, Drogenbos, Groenendaal (10), Hoeilaart, Humbeek, Kapelle op den Bos, Keerbergen, La Roche (30), Ottenburg, Rhode-St-Genèse, Tielt-Winge (150), Villers-la-Ville, Zemst. - BRUSSEL: Boitsfort (10), Laken (10), Ukkel. - HAINAUT: Lompret, Rièzes, Virelles. - LIMBURG: Bokrijk, Bree, Bree-Beek, Genk, Hasselt, Kinrooi, Maasmechelen, Meeuwen, Molenbeersel (152), Neerpelt, Zonhoven. - LIEGE: Antheit, Corphalie, Hockai (65), Lanaye, Modave (10), Mount Rigi (176), Nonceveux, Spa, Vieuxville Logne. - LUXEMBOURG: Marche-en-Famenne, On, Suxy. - NAMUR: Bohan, Heure-en-Famenne (276), Jemelle, Marche-Les-Dames (10), Nismes, Oignies-en-Thiérache, Rochefort, St Servais-Lez-Namur (10), Tiennebreumont, Treignes, Yvoir (10). - OOST-VLAANDEREN: Aalter, Merelbeke, Moorsel, Sint Laureins. - WEST-VLAANDEREN: Wijnendaal (199), Wingene, Woumen.

HABITAT. - Voornamelijk in bossen met het web dicht tegen de stam van bomen. Ook aan inhammen in muren e.d.

FENOLOGIE. - Van mei tot oktober.

Achaearanaea riparia (BLACKWALL, 1834)

SYNONIEMEN. - *Theridion riparium* (BLACKWALL, 1834), *Theridion saxatile* C.L. KOCH, 1834.

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 6, 10, 30, 41, 65, 118, 146, 168.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - In alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART n° 2.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Beerse, Mol (118), Olen, Sint Antonius-Zoersel. - BRABANT: Keerbergen, La Hulpe (41), La Roche (30). - BRUSSEL: Boitsfort (41), Brussel (41), Stockel, Ukkel (41). - LIMBURG: Houthalen (168), Opglabbeek. - LIEGE: Jalhay (6, 10, 65), Remouchamps (41), Spa (10, 41, 65), Tilff (41). - LUXEMBOURG: Arlon-Fouches (146), Houffalize (41), Torgny.

HABITAT. - In heidevelden en aan randen van greppels, laag bij de grond.

FENOLOGIE. - Van mei tot september.

Achaearanea tepidariorum (C.L. KOCH, 1841)

SYNONIEMEN. - *Theridion tepidariorum* (C.L. KOCH, 1841).

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 10, 288.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Cosmopoliet.

VERSPREIDINGSKAART n° 3.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Antwerpen, Beerse, Dessel, Deurne (288), Duffel, Olen, Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Wijnegem, Wommelgem. - BRABANT: Kampenhout, Kapelle op den Bos, Zemst. - BRUSSEL: Brussel (10), Oudergem. - LIMBURG: Bree, Erpekom, Meeuwen. - NAMUR: Bohan, Treignes. - OOST-VLAANDEREN: Hofstade. - WEST-VLAANDEREN: Kuurne.

HABITAT. - In en aan gebouwen. Vrijwel steeds binnenhuis.

FENOLOGIE. - Het hele jaar.

Achaearanea tepidariorum simulans (THORELL, 1875)

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 152, 154, 265, 276, 277.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - In alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART n° 4.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Aartselaar, Antwerpen, Beerse, Ekeren, Hoboken (265), Schilde, Wommelgem. - BRABANT: Drogenbos, Dworp, Hoeilaart, Meerdaal, Ramsdonk, Zemst. - BRUSSEL: Oudergem, Ukkel. - LIMBURG: Alken, Bree (152, 154), Bree-Beek (154), Hasselt, Kinrooi, Koersel, Koersel-Beringen (277). - LIEGE: Lanaye. - NAMUR: Gembloux-Pommiers, Heure-en-Famenne (276), Soulme, Treignes. - OOST-VLAANDEREN: Gent, Hofstade.

HABITAT. - Vooral aan boomstammen in loofbossen.

FENOLOGIE. - Juni tot september.

*Anelosimus**Anelosimus pulchellus* (WALCKENAER, 1802)

SYNONIEMEN. - *Theridion pulchellum* (WALCKENAER, 1802).

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 10, 15, 30, 41.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - In alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART n° 5.

VINDPLAATSEN. - BRABANT: Bousval (41), Groenendael (41), Humbeek, La Roche (30, 41), Mt St. Guibert (41), Noirhat (41). - BRUSSEL: Bois de la Cambre (10), Boitsfort (10, 41), Brussel (41). - LIMBURG: Genk (41). - LIEGE: Huy (41), Liège (41), Modave (41), Remouchamps (41), Tilff (41). - LUXEMBOURG: Barvaux-sur-Ourthe (41), Durbuy (41), Houffalize (41), Redu (41), Roche-à-Frêne (41). - NAMUR: Hastière (41), Namêche (15), Samson (10), Yvoir (41).

HABITAT. - In struiken en loofbomen.

FENOLOGIE. - Te weinig vangstdata beschikbaar.

Anelosimus vittatus (C.L. KOCH, 1836)

SYNONIEMEN. - *Theridion vittatum* C.L. KOCH, 1836.

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 43, 150, 152, 175, 185, 217, 219, 263, 265, 276, 277, 283, 295.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - In alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART n° 6.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Antwerpen, Balen, Beerse (217), Blaasveld, Brasschaat, Geel, Ham (283), Hoboken (265), Kalmthout, Mol, Postel, Retie, Rijkevorsel, Schilde, Sint Lenaarts, Turnhout, Wijnegem, Wuustwezel, Zoersel. - BRABANT: Grootloo-Schriek, Hoeilaart, Kapelle op den Bos, Keerbergen, Limal, Meerdaal, Sint-Genesius-Rode, Tielt-Winge (150), Zemst. - BRUSSEL: Ukkel. - HAINAUT: Howardries, Renlies, Rièzes, Thuin. - LIMBURG: As-en-Campine, Bokrijk, Bree, Gruitrode, Hasselt, Kinrooi (152), Koersel-Beringen (277), Maasmechelen, Meeuwen, Neerpelt (219), Rekem, Sint Martens Voeren. - LIEGE: Antheit, Esneux, Montfort, Rocheux-Theux, Theux (43), Thier de Nivelles-Lixhe (185), Tilff, Verviers, Wanze. - LUXEMBOURG: Arlon-Fouches, Bouillon, Châtillon, Daverdisse, Ethe, Harsin, Herbeumont, Muno, Torgny, Vance. - NAMUR: Andenne, Bohan, Crupet, Cul-des-Sarts, Doische, Eprave, Frasnes-Couvin, Gembloux, Gimnée, Han-sur-Lesse, Heure-en-Famenne (276), Namen, Nismes, Resteigne (175), Rochefort-Belvaux, Treignes. - OOST-VLAANDEREN: Aalter, Elene, Gent, Knesselare, Melle, Ronse, Sint Laureins, Vinderhout. - WEST-VLAANDEREN: De Haan, De Panne, Houthulst, Knokke, Oostkamp, Sint-Andries (295), Veldegem, Woumen, Zedelgem (263).

HABITAT. - In graslanden, dennebossen, loofbomen en struiken.

FENOLOGIE. - April tot november.

Carniella

Carniella brignolii THALER & STEINBERGER, 1988

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Oostenrijk.

VERSPREIDINGSKAART n° 7.

VINDPLAATSEN. - LIEGE: Corphalie.

HABITAT. - In schaars met grassen begroeide, zandige bomen.

FENOLOGIE. - Maart-april en september.

Crustulina

Crustulina guttata (WIDER, 1834)

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 10, 30, 41, 65, 138, 152, 167, 176, 202, 219, 277, 288, 295.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - In alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART n° 8.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Deurne (288), Ekeren, Kalmthout (202), Wommelgem. - BRABANT: Bousval (41), La Roche (30, 41). - BRUSSEL: Boitsfort (41), Brussel (10, 41), Oudergem (41), Ukkel. - HAINAUT: Thuin. - LIMBURG: As-en-Campine, Bree, Genk (41, 167), Helchteren, Kinrooi (152), Koersel, Koersel-Beringen (277), Maasmechelen, Meeuwen, Neerpelt (219), Rekem. - LIEGE: Chôdières (65), Comblain-au-Pont, Elsenborn (138), Esneux, Hoëgne (65), Modave (10, 41), Montfort, Mount Rigi (176), Remouchamps (41), Tilff (41), Vierset-Barse. - LUXEMBOURG: Bihain, Hotton, Houffalize (41), Ozo-Izier, Redu (41), Salm-Château, Torgny. - NAMUR: Bohan, Feschaux-Chénaie, Han-sur-Lesse (41), Le Mesnil, Nismes, Tiennebreumont, Treignes, Yvoir (41). - WEST-VLAANDEREN: Beernem, Sint-Andries (295).

HABITAT. - Laag bij de grond onder stenen en tussen graswortels en bladeren.

FENOLOGIE. - Gans het jaar.

Crustulina sticta (O.P.-CAMBRIDGE, 1861)

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Frankrijk, Groot-Brittannië.

VERSPREIDINGSKAART n° 9.

VINDPLAATSEN. - NAMUR: Bohan. - WEST-VLAANDEREN: Wingene.

HABITAT. - Vochtige, moerassige plaatsen.
FENOLOGIE. - Zomer.

Dipoena

Dipoena coracina (C.L. KOCH, 1841)

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 188.
GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk.
VERSPREIDINGSKAART n° 10.
VINDPLAATSEN. - LIEGE: Xhoris (188). - NAMUR: Nismes (188), Treignes.
HABITAT. - Lage vegetatie.
FENOLOGIE. - Vangsten in januari, mei, juli en december.

Dipoena erythropus (SIMON, 1881)

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 188.
GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.
VERSPREIDINGSKAART n° 11.
VINDPLAATSEN. - NAMUR: Gimnée (188).
HABITAT. - Lage vegetatie.
FENOLOGIE. - Te weinig gegevens beschikbaar.

Dipoena inornata (O.P.-CAMBRIDGE, 1861)

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.
VERSPREIDINGSKAART n° 12.
VINDPLAATSEN. - LIMBURG: Neerpelt. - LIEGE: Corphalie.
HABITAT. - Lage vegetatie.
FENOLOGIE. - Zomer.

Dipoena melanogaster (C.L. KOCH, 1845)

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 41, 188, 217.
GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.
VERSPREIDINGSKAART n° 13.
VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Beerse (217), Kalmthout. - NAMUR: Bohan. - WEST-VLAANDEREN: Heist (41, 188), Knokke (41, 188).
HABITAT. - Lage vegetatie.
FENOLOGIE. - Juni tot augustus.

Dipoena prona (MENGE, 1868)

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 83, 188, 219.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART n° 14.

VINDPLAATSEN. - LIMBURG: Neerpelt (219). - LUXEMBOURG: Ozo-Izier (188). - WEST-VLAANDEREN: De Panne (83, 188), Nieuwpoort.

HABITAT. - Lage vegetatie.

FENOLOGIE. - Mei tot augustus.

Dipoena tristis (HAHN, 1833)

SYNONIEMEN. - *Lasaeola tristis* HAHN, 1831.

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 10, 41, 188.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART n° 15.

VINDPLAATSEN. - BRABANT: Grootloo-Schriek, Limelette (188). - BRUSSEL: Brussel (10, 41, 188). - LIMBURG: Maasmechelen, Meeuwen, Neerpelt, Rekem. - LUXEMBOURG: Arlon-Fouches (188), Muno (188). -

NAMUR: Treignes.

HABITAT. - Meestal heide of naaldbomen, dicht tegen de grond.

FENOLOGIE. - April tot juni.

*Enoplognatha**Enoplognatha latimana* HIPPA & OKSALA, 1982

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 200, 222.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART n° 16.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Aartselaar, Antwerpen, Baarle-Hertog, Balen, Brasschaat, Ekeren, Herentals, Hoboken, Hoogstraten, Postel, Putte, Retie, Sint-Katelijne-Waver, Turnhout, Westmeerbeek, Wijnegem. - BRABANT: Epeghem, Grootloo-Schriek, Heverlee, Kampenhout, Kapelle op den Bos, La Roche, Ottignies, Tervuren, Zemst. - BRUSSEL: Brussel, Oudergem, Sint Lamberts Woluwe, Stockel, Ukkel (222), Watermaal. - HAINAUT: Ath, Lessines. - LIMBURG: As-en-Campine, Bree (200), Genk (200), Gruitrode, Koersel-Beringen, Maasmechelen (200), Meeuwen, Molenbeersel (200), Rekem (200), Zonhoven. - LIEGE: Amay, Antheit, Comblain-au-Pont, Lanaye, Liège, Milmort, Wanze, Wonck. - LUXEMBOURG: Etalle, Meix-Devant-Virton, Orval, Torgny. - NAMUR: Bouge, Bure, Clermont-Les-Walcourt, Denée, Rivière, Treignes, Winenne. - OOST-VLAANDEREN: Aalter, Hofstade, Melle, Sint Martens Latem, Waasmunster. - WEST-VLAANDEREN: Beernem, Blankenberge, Harelbeke, Nieuwpoort, Westende.

HABITAT. - Voornamelijk ruigtevegetaties.

FENOLOGIE. - Mei tot oktober.

Enoplognatha mordax (THORELL, 1875)

SYNONIEMEN. - *E. maritima* (SIMON, 1884), *E. schaufussi* (L. KOCH, 1881), *E. crucifera* (THORELL, 1875).

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 114, 131.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART n° 17.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Antwerpen, Brecht, Mol. - LIMBURG: Bree, Rekem. - OOST-VLAANDEREN: Drongen, Kieldrecht (131). - WEST-VLAANDEREN: Knokke (114), Nieuwpoort, Oostduinkerke, Wenduine.
 HABITAT. - Zanderig gebied.
 FENOLOGIE. - Mei tot augustus.

Enoplognatha oelandica (THORELL, 1875)

SYNONIEMEN. - *E. mandibularis*

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 118, 131.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk.

VERSPREIDINGSKAART n° 18.

VINDPLAATSEN. - OOST-VLAANDEREN: Kieldrecht (131). - WEST-VLAANDEREN: Nieuwpoort (118), Wenduine.

HABITAT. - Zanderig gebied.

FENOLOGIE. - Mei en juni.

Enoplognatha ovata (CLERCK, 1757)

SYNONIEMEN. - *Theridion lineatum* CLERCK, 1757, *Theridion ovatum* (CLERCK, 1757).

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 6, 10, 15, 23, 30, 41, 65, 74, 83, 117, 150, 167, 175, 183, 185, 186, 190, 200, 212, 226, 238, 247, 263, 265, 269, 276, 288, 295.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART n° 19.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Antwerpen (41), Arendonk (41), Beerse, Bergen (41), Bornem (186), Brasschaat, Deurne (288), Ekeren, Herentals (41), Hoboken (265), Hoogstraten (41), Kalmthout (10, 41), Mariekerke, Mechelen (41), Mol, Mortsel, Oud-Turnhout, Postel (41), Retie, Schilde, Turnhout (41), Wijnegem, Wommelgem. - BRABANT: Aarschot (41), Bousval (41), Dion-le-Mont, Epeghem, Genval (41), Grand-Bigard (41), Groenendaal (41), Grootloo-Schriek, Haacht, Hoeilaart (41), Humbeek, Kapelle op den Bos, Keerbergen, La Hulpe (41), La Roche (30, 41), Leuven (41), Limelette, Mt-St-Guibert (41), Nijvel, Noirhat (41), Notre-Dame-au Bois (41), Ottignies, Sint-Genesius-Rode (41), Tervuren (41), Tielt-Winge (150), Villers-la-Ville (41), Virginal (41), Wemmel, Zemst. - BRUSSEL: Boitsfort (41), Brussel (41), Jette-St.-Pierre (41), Laken (41), Oudergem (41), Sint-Agatha-Berchem (41), Stockel, Ukkel (41). - HAINAUT: Barbençon, Beloëil (41), Bois d'Haine (41), Braine-le-Compte (41), Doornik (41), Houdeng, Lessines, Mons, Papignies (23, 41), Rièzes, Silly, Thuin, Virelles (212). - LIMBURG: Alken, As (190, 200), As-en-Campine, Bokrijk, Bree (200), Diepenbeek (41), Genk (41, 167, 200), Hasselt, Lanklaar, Maaseik (41), Maasmechelen, Meeuwen (200), Rekem (200), Tongeren (41), Zepperen, Zonhoven. - LIEGE: Angleur (41), Antheit, Bas-Oha, Bleret, Chaudfontaine (41), Chênee (41), Comblain-au-Pont (41), Eben, Esneux (41), Francorchamps (41, 65), Huccorgne, Huy (10, 41), Jalhay (6), La Calamine, La Gleize (41), Lanaye, Liège (41), Modave (10, 41), Mount Rigi, Montfort, Mount Rigi, Méry (83), Nessonvaux (41), Pailhe (41), Raeren, Régissa, Spa (41), Tilff (41), Wanze, Werboomont, Wonck (185). - LUXEMBOURG: Barvaux-sur-Ourthe (41), Bertrix (41), Bihain (74), Bomal (41), Buzenol, Carlsbourg (10), Chanly (41), Chiny, Daverdisse (41), Etalle, Ethe, Ethe-Buzenol, Florenville, Grupont, Hachy, Houffalize (41), Lamorteau, Marbehan (6), Melreux (41), Muno, Ny, Orval, Poix-St. Hubert-Falize, Poix-St. Hubert-Libin, Redu (10, 41), Roche-à-Frêne (41), Saint Hubert (10, 41), Salm-Château, St Mard, Torgny, Vielsalm (41), Villers-devant-Orval. - NAMUR: Beauraing (41), Bohan, Braibant, Bure, Ciney (41), Clermont-Les-Walcourt, Cul-des-Sarts, Dave (10, 41), Denée, Dinant (10, 41), Doische, Dorinne (41), Eprave, Erpent, Ferage, Gembloux-Pommiers, Gimnée, Godinne (41), Grand-Leez, Han-sur-Lesse (41), Hastière (41), Hermeton-sur-Meuse, Herpimont, Heure-en-Famenne (276), Jemelle, Marche-Les-Dames (41), Mariembourg (41), Membre, Namen (41), Namèche (15, 41), Nismes, Resteigne (175), Rhismes (41), Rivière, Rochefort (41), Roly, Saint-Servais lez-Namur (10), Sosoye, Soulme, Spontin (41), Surice, Treignes, Winenne, Yvoir (10, 41). - OOST-VLAANDEREN: Aalter, Afsnee, Bazel, Gent, Gontrode, Grammont (41), Hofstade, Landegem, Maldegem, Massemen, Melden (238), Melle, Nazareth, Nevele, Sint Amandsberg,

Sint Martens Latem, Sint-Denijs-Westrem (269), Waasmunster, Zwijnaarde (117). - WEST-VLAANDEREN: Beernem, Blankenberge, Damme, De Haan, De Panne, Lombardsijde, Nieuwkapelle, Nieuwpoort (183), Oostduinkerke, Raversijde, Sint-Andries (295), Veldegem, Wenduine, Wijnendaal (226), Woumen (247), Zedelgem (263), Zeebrugge, Zuienkerke.

HABITAT. - Allerlei vegetaties, veelal ruigtes.

FENOLOGIE. - April tot oktober.

Enoplognatha tecta (KEYSERLING, 1884)

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 164, 237.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk.

VERSPREIDINGSKAART n° 20.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Bornem, Ekeren, Geel (164), Wommelgem. - LIMBURG: Meeuwen. - OOST-VLAANDEREN: Drongen (237).

HABITAT. - Vochtig gebied.

FENOLOGIE. - April tot juni.

Enoplognatha thoracica (HAHN, 1833)

SYNONIEMEN. - *Steatoda thoracica* HAHN, 1831.

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 6, 10, 41, 83, 126, 167, 168, 175, 183, 185, 202, 219, 238, 250, 263, 276, 295.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART n° 21.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Beerse, Ekeren, Kalmthout (202), Meerhout, Rijkevorsel, Sint Lenaerts, Sint Lenaerts, Turnhout, Wommelgem. - BRABANT: Hoeilaart, Keerbergen, Zemst. - BRUSSEL: Ukkel. - LIMBURG: As-en-Campine, Genk (167, 168), Houthalen (168), Maasmechelen, Molenbeersel (168), Neerpelt (219), Zolder. - LIEGE: Antheit, Esneux, Esneux-Nomont (83), Modave (10), Montfort, Rocheux-Theux, Theux, Thier de Nivelles-Lixhe (185). - LUXEMBOURG: Ethe, Grand-Halleux, Marbehan (6), Orval, Ozo-Izier, Torgny. - NAMUR: Blaimont, Dinant, Frasnes-Couvin, Gimnée, Heure-en-Famenne (276), Jemelle, Nismes, Resteigne (175), Roly, Treignes, Winenne, Yvoir (10). - OOST-VLAANDEREN: Melden (238), Melle (250), Moorsel, Neigem, Waasmunster. - WEST-VLAANDEREN: Beernem, Blankenberge, De Haan, De Panne (126), Heist (41), Knokke (41), Koksijde, Nieuwpoort (183), Oostende (41), Sint-Andries (295), Westende, Westhoek, Zedelgem (263), Zeebrugge.

HABITAT. - Op de bodem onder allerlei vegetatietypes.

FENOLOGIE. - April tot juli.

Episinus

Episinus angulatus (BLACKWALL, 1836)

SYNONIEMEN. - *E. truncatus* WALCKENAER, 1809

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 10, 41, 124, 127, 167, 202, 265, 288, 295.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART n° 22.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Beerse, Brasschaat, Deurne (288), Ekeren, Hoboken (265), Kalmthout (202), Kapellen, Mol (127), Postel, Schilde, Westmeerbeek. - BRABANT: Grootloo-Schriek, Hoeilaart, Keerbergen, Rixensart, Villers-la-Ville. - BRUSSEL: Ukkel. - LIMBURG: Genk (167), Koersel-Beringen, Maasmechelen, Meeuwen, Zolder. - LIEGE: Modave (10, 41), Remouchamps, Spa. - LUXEMBOURG: Ethe-

Buzenol, Fouches. - NAMUR: Treignes. - OOST-VLAANDEREN: Nazareth (124), Waasmunster. - WEST-VLAANDEREN: Beernem, De Haan, De Panne, Knokke, Koksijde, Sint-Andries (295), Westhoek.
 HABITAT. - Dikwijls in hoge grassen en kruiden, laag bij de grond.
 FENOLOGIE. - Heel het jaar, maar voornamelijk in de zomer.

Episinus truncatus LATREILLE, 1809

SYNONIEMEN. - *E. lugubris* SIMON, 1873.
 BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 43.
 GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.
 VERSPREIDINGSKAART n° 23.
 VINDPLAATSSEN. - BRUSSEL: Ukkel. - LIEGE: Comblain-au-Pont, Corphalie, Esneux, Montfort, Theux (43). - LUXEMBOURG: Torgny. - NAMUR: Bohan, Dinant, Treignes, Vaucelles.
 HABITAT. - Warmere plaatsen.
 FENOLOGIE. - Juni tot augustus.

Euryopsis

Euryopsis flavomaculata (C.L. KOCH, 1836)

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 17, 41, 114, 126, 150, 152, 167, 168, 185, 202, 217, 219, 246, 288, 295.
 GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.
 VERSPREIDINGSKAART n° 24.
 VINDPLAATSSEN. - ANTWERPEN: Antwerpen, Beerse (217), Deurne (288), Kalmthout (114, 202), Weelde, Wommelgem. - BRABANT: Grootloo-Schriek, Hoeilaart, Tielt-Winge (150). - LIMBURG: Achel, Bree (152), Genk (167), Houthalen (168), Koersel-Beringen, Maasmechelen, Neerpelt (219), Zonhoven. - LIEGE: Modave (41), Remouchamps (41), Spa, Thier de Nivelles-Lixhe (185), Tilff (17, 41). - NAMUR: Bohan, Nismes, Treignes, Vierves-sur-Viroin. - OOST-VLAANDEREN: Kalken (246). - WEST-VLAANDEREN: Beernem, De Panne (126), Houthulst, Koksijde, Oostduinkerke, Sint-Andries (295), Westhoek.
 HABITAT. - Voornamelijk op grondniveau, op vochtigere plaatsen.
 FENOLOGIE. - Heel het jaar, maar voornamelijk in de zomer.

Euryopsis laeta (WESTRING, 1861)

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 64.
 GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Duitsland en Frankrijk.
 VERSPREIDINGSKAART n° 25.
 VINDPLAATSSEN. - LIEGE: Antheit, Corphalie, Esneux, Montfort. - LUXEMBOURG: Aisme-Heydt-lez-Bomal.
 HABITAT. - Op de bodem.
 FENOLOGIE. - Juni.

*Paidiscura**Paidiscura pallens* (BLACKWALL, 1834)

SYNONIEMEN. - *Theridion pallens* (BLACKWALL, 1834)

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 43, 65, 114, 138, 146, 150, 167, 175, 176, 265, 283, 288.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - In alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART n° 26.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Antwerpen, Arendonk, Beerse, Brasschaat, Deurne (288), Ham (283), Hoboken (265), Kalmthout, Kapellen, Mol, Oelegem, Postel, Rijkevorsel, Schilde, Tisselt, Wijnegem, Wommelgem. - BRABANT: Hoeilaart, Humbeek, Keerbergen, Ottignies, Ramsdonk, Sint-Agatha-Rode, Tervuren, Tielt-Winge (150), Zemst. - BRUSSEL: Oudergem. - HAINAUT: Barbençon, Gozée, Vergnies. - LIMBURG: Bree, Genk (167), Meeuwen. - LIEGE: Bevercé, Elsenborn (138), Hockai (65), Malmedy, Mount Rigi (176), Sougné-Remouchamps, Spa, Theux (43), Wanze. - LUXEMBOURG: Arlon-Fouches (146), Châtillon, Ethe, Ethe-Buzenol, Gomery, Redu, Rendeux, Torgny, Vance. - NAMUR: Belvaux, Bohan, Bouge, Clermont-Les-Walcourt, Erpent, Faulx-les-Tombes, Gembloux, Jemelle, Nismes, Resteigne (175), Rochefort-Belvaux, Treignes, Vecquée-Malonne. - OOST-VLAANDEREN: Eeklo, Moorsel, Zwijnaarde (114). - WEST-VLAANDEREN: De Panne, Lombardsijde, Oostduinkerke, Veldegem, Woumen, Zedelgem.

HABITAT. - Voornamelijk in loofbossen aan de onderzijde van bladeren op beschaduwde plaatsen.

FENOLOGIE. - Gans het jaar, maar voornamelijk zomer.

*Pholcomma**Pholcomma gibbum* (WESTRING, 1851)

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 20, 41, 121, 127, 128, 167, 168, 176, 196, 219, 263, 265, 277, 288, 295.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - In alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART n° 27.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Antwerpen, Deurne (288), Hoboken (265), Kalmthout (127), Rijkevorsel, Wommelgem. - BRABANT: Chaumont, Tielt-Winge. - BRUSSEL: Oudergem, Ukkel. - HAINAUT: Thuin (128). - LIMBURG: Genk (167), Houthalen (168), Koersel-Beringen (277), Maasmechelen, Neerpelt (219). - LIEGE: Modave (41), Mount Rigi (176), Pont-de-Bonne (20). - LUXEMBOURG: Barvaux-sur-Ourthe. - NAMUR: Frasnes-Couvin, Nismes, Treignes. - OOST-VLAANDEREN: Eke, Gontrode, Waasmunster. - WEST-VLAANDEREN: Beernem, De Haan, De Panne (121), Koksijde, Sint-Andries (295), Veldegem (196), Westhoek, Zedelgem (263).

HABITAT. - In zandheuvelds en in bodemstrooisel en graspollen, zowel in open als dichte begroeiing.

FENOLOGIE. - Gans het jaar, maar voornamelijk in de lente.

*Robertus**Robertus arundineti* (O.P.-CAMBRIDGE, 1871)

SYNONIEMEN. - *Pedanostethus arundineti* CAMBRIDGE, 1871

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 41, 176, 247, 299.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART n° 28.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Retie. - BRABANT: Zemst. - BRUSSEL: Ukkel. - HAINAUT: Quaregnon, Virelles. - LIMBURG: Bree, Bree-Opitter (299), Genk (41), Koersel-Beringen, Maasmechelen. - LIEGE: Mount Rigi (176). - LUXEMBOURG: Bihain, Carlsbourg (41), Redu (41). - OOST-VLAANDEREN: Sint Amandsberg, Vinderhoute, Wachtebeke. - WEST-VLAANDEREN: Knokke, Nieuwpoort, Woumen (247).

HABITAT. - Op lagere begroeiing.
FENOLOGIE. - April tot september.

Robertus grasshoffi WUNDERLICH, 1973

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 215.
GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Duitsland.
VERSPREIDINGSKAART n° 29.
VINDPLAATSSEN. - OOST-VLAANDEREN: Melle (215).
HABITAT. - In België gevonden op een akker.
FENOLOGIE. - Te weinig gegevens beschikbaar. Enigste vondst in België in december.

Robertus lividus (BLACKWALL, 1836)

SYNONIEMEN. - *Pedanostethus lividus* BLACKWALL, 1836
BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 41, 65, 74, 117, 126, 131, 138, 152, 161, 165, 167, 168, 176, 183, 186, 190, 196, 202, 217, 219, 226, 238, 246, 247, 250, 263, 269, 275, 276, 288, 295, 299.
GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk.
VERSPREIDINGSKAART n° 30.
VINDPLAATSSEN. - ANTWERPEN: Antwerpen, Beerse (217), Bornem (186), Deurne (288), Ham, Hoboken, Kalmthout (41, 202), Mol, Oud-Turnhout, Rijkevorsel, Sint Lenaarts, Westmeerbeek, Wijnegem, Wilrijk, Wommelgem. - BRABANT: Diest (41), Galmaarden, Groenendael (41), Grootloo-Schriek, Hoeilaart, Kapelle op den Bos, Keerbergen, Leuven (41), Noirhat (41), Tervuren (41), Zemst. - BRUSSEL: Boitsfort (41), Brussel, Oudergem, Ukkel. - LIMBURG: Achel, Alken, As (190), Bree (152), Bree-Beek (152), Bree-Opitter (299), Diepenbeek, Genk (41, 167), Hasselt, Houthalen (168), Kermt (41), Kinrooi (152), Koersel, Koersel-Beringen, Lanklaar-Dilsen, Maasmechelen, Meeuwen, Molenbeersel (152), Neerpelt (219), Rekem, Zolder, Zonhoven. - LIEGE: Elsenborn (138), Eupen, Hockai (65), Jalhay, La Gleize, Moha (161), Mount Rigi (176), Nonceveux, Rocherath (165), Spa. - LUXEMBOURG: Bihain (74), Ethe, Heinsch, Libramont, Ny, Poix-St. Hubert-Libin, Redu (41). - NAMUR: Frasnes-Couvin, Heure-en-Famenne (276), Treignes, Vecquée-Malonne. - OOST-VLAANDEREN: Aalter, Afsnee, Elene, Hofstade, Kalken (246), Kieldrecht (131), Leupegem, Melden (238), Melle (250), Neigem, Onkerzele, Oordegem, Sint Jan Ineremo, Sint Niklaas, Sint-Denijs-Westrem (269), Sint-Gillis-Waas, Sint-Jan-in-Eremo, Smeerebbe, Waasmunster, Zwijnaarde (117). - WEST-VLAANDEREN: Beernem, Blankenberge, Brugge, De Haan, De Panne (126), Koksijde, Lombardsijde, Nieuwpoort (183), Oostduinkerke, Oostkamp (275), Sint-Andries (295), Veldegem (196), Wenduine-De Haan, Wijnendaal (226), Woumen (247), Zedelgem (263), Zeebrugge.
HABITAT. - Allerlei vegetatietypes.
FENOLOGIE. - Heel het jaar, hoogtepunt in de zomer.

Robertus neglectus (O.P.-CAMBRIDGE, 1871)

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 54, 60, 100, 114, 117, 176, 186, 196, 247, 263.
GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.
VERSPREIDINGSKAART n° 31.
VINDPLAATSSEN. - ANTWERPEN: Bornem (186), Schilde. - LIEGE: Mount Rigi (176). - NAMUR: Bossière-Mazy (100), Rochefort (54, 60, 100). - OOST-VLAANDEREN: Aalter, Eeklo, Hofstade, Nazareth, Zwijnaarde (114, 117). - WEST-VLAANDEREN: Beernem, Veldegem (196), Woumen (247), Zedelgem (263).
HABITAT. - Detritus en lage vegetatie.
FENOLOGIE. - Heel het jaar, voornamelijk zomer.

Robertus scoticus JACKSON, 1914

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 65, 74, 176.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART n° 32.

VINDPLAATSSEN. - LIEGE: Duzo-Moûpas (65), Hockai (65), Hoëgne (65), Mount Rigi (176). - LUXEMBOURG: Bihain (74), Villers-la-Bonne-Eau.

HABITAT. - Hogere, koudere gebieden.

FENOLOGIE. - Heel het jaar, voornamelijk lente.

*Rugathodes**Rugathodes bellicosum* (SIMON, 1873)

SYNONIEMEN. - *Theridion bellicosum* (SIMON, 1874)

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 253.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Frankrijk, Duitsland, Groot Brittannië en Zwitserland.

VERSPREIDINGSKAART n° 33.

VINDPLAATSSEN. - LIEGE: Esneux, Montfort (253). - LUXEMBOURG: Fontenoille.

HABITAT. - Onder en tussen stenen op rotsachtige bodem.

FENOLOGIE. - Zomer.

*Steatoda**Steatoda albomaculata* (DE GEER, 1778)

SYNONIEMEN. - *S. corollata* LINNAEUS, 1758, *Lithyphantes corrolatus* LINNAEUS, 1758

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 10, 23, 27, 41, 167.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART n° 34.

VINDPLAATSSEN. - ANTWERPEN: Kalmthout (23, 41), Mol. - BRABANT: Diest (27, 41), La Roche (41). - BRUSSEL: Boitsfort (10, 41). - LIMBURG: Genk (41, 167), Gruitrode, Heusden-Zolder, Leopoldsburg, Lommel, Maasmechelen. - LUXEMBOURG: Fouches, Houffalize (41), Redu (41). - NAMUR: Namen (41).

HABITAT. - Op warme plaatsen, meestal heide.

FENOLOGIE. - Februari tot oktober, voornamelijk in de zomer.

Steatoda bipunctata (LINNAEUS, 1758)

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 10, 15, 65, 83, 167, 176, 196, 263, 288.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART n° 35.

VINDPLAATSSEN. - ANTWERPEN: Antwerpen, Beerse, Brasschaat, Deurne (288), Kalmthout, Lichtaart, Mariekerke, Mol, Wommelgem. - BRABANT: Drogenbos, Forêt de Soignes (83), Humbeek, Kampenhout, Kapelle op den Bos, Keerbergen, Leuven, Meise, Molenbeek-Wersbeek, Muizen, Ohain, Opwijk, Petite Espinette (83), Sint-Agatha-Rode, Sterrebeek, Tervuren, Zemst. - BRUSSEL: Brussel (10), Ukkel. - HAINAUT: Thuin. - LIMBURG: Alken, Bree, Diepenbeek, Genk (167), Hasselt, Helchteren, Houthalen, Meeuwen, Overpelt, Peer, Zonhoven. - LIEGE: Aywaille (83), Baraque Michel (15, 65), Hockai, Liège (83), Milmort (83), Mount Rigi (176), Oleye, Waremme (83). - LUXEMBOURG: Chiny, Mussy-la-Ville, Redu (10), Rossignol. - NAMUR: Bossière-Mazy, Gembloux, Samson (10), Treignes. - OOST-VLAANDEREN: Aalter, Afsnee, Gent, Hofstade,

Melle, Moorsel, Sint Amandsberg, Sint Laureins, Vinderhoute, Wetteren. - WEST-VLAANDEREN: Beernem, Heist (10), Ingelmunster, Nieuwpoort, Oostkamp, Veldegem (196), Zedelgem (263).

HABITAT. - Voornamelijk in en rond huizen, ook in spleten in de schors van bomen e.d.

FENOLOGIE. - Gans het jaar, hoogtepunt zomer en herfst.

Steatoda grossa (C.L. KOCH, 1838)

SYNONIEMEN. - *Teutana grossa* (C.L. KOCH, 1838).

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 147.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART n° 36.

VINDPLAATSSEN. - ANTWERPEN: Antwerpen, Mechelen. - LIEGE: Jalhay (Baraque Michel (147)). - OOST-VLAANDEREN: Gent.

HABITAT. - Enkel in gebouwen, zowel op droge als vochtige plaatsen.

FENOLOGIE. - Vrouwtjes gans het jaar, mannetjes in de zomer.

Steatoda phalerata (PANZER, 1801)

SYNONIEMEN. - *Asagena phalerata* PANZER, 1801.

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 17, 27, 41, 152, 167, 168, 175, 276, 288.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART n° 37.

VINDPLAATSSEN. - ANTWERPEN: Beerse, Deurne (288), Kalmthout, Olen, Wijnegem, Wuustwezel. -

BRABANT: Waver (41). - BRUSSEL: Boitsfort (17, 41), Brussel (41). - LIMBURG: Bree (152), Genk (41, 167),

Houthalen (168), Meeuwen, Zolder, Zonhoven. - LIEGE: Rocheux, Rocheux-Theux. - LUXEMBOURG: Barvaux-

sur-Ourthe (41), Houffalize (41), Mesnil, Torgny. - NAMUR: Heure-en-Famenne (276), Mazée, Namen (27,

41), Nismes, Resteigne (175), Treignes, Yvoir (41). - WEST-VLAANDEREN: Lombardsijde, Nieuwpoort.

HABITAT. - Lage vegetatie op warmere plaatsen.

FENOLOGIE. - Zomer.

Steatoda triangulosa (WALCKENAER, 1802)

SYNONIEMEN. - *Teutana triangulosa* WALCKENAER, 1802.

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 41, 83.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Nederland, Duitsland en Frankrijk.

VERSPREIDINGSKAART n° 38.

VINDPLAATSSEN. - ANTWERPEN: Antwerpen, Beerse, Berchem, Borgerhout, Duffel, Mariekerke, Mechelen,

Wijnegem, Wilrijk. - BRABANT: Beersel, Drogenbos, Kapelle op den Bos, La Roche, Muizen, Nijvel,

Ramsdonk, Tervuren. - BRUSSEL: Anderlecht, Brussel, Etterbeek, St Pieters-Woluwe, Stockel, Ukkel. -

LIMBURG: Alken, Bree, Diepenbeek, Genk, Waterschei. - LIEGE: Heure-le-Romain (83), Oleye (83). -

LUXEMBOURG: Houffalize (41), Redu (41). - OOST-VLAANDEREN: Afsnee, Gent, Melle. - WEST-VLAANDEREN:

Kuurne, Westende.

HABITAT. - Voornamelijk op droge plaatsen in gebouwen.

FENOLOGIE. - Gans het jaar, voornamelijk herfst.

*Theonoe**Theonoe minutissima* (O.P.-CAMBRIDGE)

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 65, 98, 150, 167, 176, 277.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - In alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART n° 39.

VINDPLAATSSEN. - BRABANT: Tielt-Winge (150). - HAINAUT: Stambrugge. - LIMBURG: Genk (167), Koersel, Koersel-Beringen (277), Zonhoven. - LIEGE: Hockai (65), Mount Rigi (176). - NAMUR: Rivière (98).

HABITAT. - In de strooisellaag en in vochtige moskussens.

FENOLOGIE. - Gans het jaar.

*Theridion**Theridion bimaculatum* (LINNAEUS, 1767)

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 10, 30, 41, 74, 121, 150, 152, 165, 167, 168, 175, 183, 185, 217, 219, 243, 265, 275, 277, 288.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - In alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART n° 40.

VINDPLAATSSEN. - ANTWERPEN: Antwerpen, Arendonk (41, 243), Beerse (217), Brasschaat, Deurne (288), Ekeren, Hoboken (265), Kalmthout (10, 41), Meerhout, Mol, Olen, Oud-Turnhout, Postel (41), Retie, Rijkevorsel, Rijmenam (41), Schilde, Sint Lenaerts, Sint Lenaerts, Wechelderzande, Weelde, Wijnegem, Wommelgem. - BRABANT: Bousval (41), Diest, Dion-le-Mont, Groenendael (10, 41), Grootloo-Schriek, Hamme-Mille, Kapelle op den Bos, Keerbergen, La Roche (30, 41), Limelette, Meerdaal, Mt St. Guibert (41), Noirhat (41), Rixensart, Tervuren (41), Tielt-Winge (150), Villers-la-Ville (41), Zemst. - BRUSSEL: Boitsfort (10, 41), Oudergem (41), Stockel, Ukkel. - HAINAUT: Barbençon, Lessines, Rièzes, Silly, Thuin. - LIMBURG: Alken, Bree, Bree-Beek (152), Diepenbeek (41), Genk (41, 167), Hasselt, Houthalen (168), Koersel-Beringen (277), Maasmechelen, Neerpelt (219), Rekem, Sint Martens Voeren, Voeren, Waterschei, Zonhoven, Zutendaal. - LIEGE: Antheit, Bra, Chaudfontaine (41), Corphalie, Eben-Emael, Embourg (10, 41), Esneux, Lanaye, Modave (41), Montfort, Paifve (41), Remouchamps (41), Rocherath (165), Rocheux, Rocheux-Theux, Spa (41), Thier de Nivelles-Lixhe (185), Tilff (41). - LUXEMBOURG: Auby, Bihain (74), Buzenol, Ethe, Houffalize (41), Muno, Redu (41), Saint Hubert (41), Salm-Château, Torgny, Villers-devant-Orval, Virton. - NAMUR: Belvaux, Clermont-Les-Walcourt, Dion, Frasnes-Couvin, Gimnée, Hermeton-sur-Meuse, Jemelle, Namen, Nismes, Onoz-Spy, Resteigne (175), Rochefort-Belvaux, Soulme, Surice, Treignes. - OOST-VLAANDEREN: Gent (41), Hofstade, Knesselare, Melle, Sint Martens Latem, Waasmunster. - WEST-VLAANDEREN: Beernem, De Haan, De Panne (121), Heist (41), Knokke (41), Kuurne, Lombardsijde, Nieuwpoort (183), Oostduinkerke, Oostkamp (275), Wenduine.

HABITAT. - Voornamelijk in graslanden.

FENOLOGIE. - Gans het jaar, hoogtepunt in de zomer.

Theridion blackwalli O.P.-CAMBRIDGE, 1870

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 114.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - In alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART n° 41.

VINDPLAATSSEN. - ANTWERPEN: Blaasveld, Mechelen. - BRABANT: Kapelle op den Bos, Zemst. - BRUSSEL: Ukkel. - LIEGE: Wonck. - NAMUR: Rivière. - OOST-VLAANDEREN: Gent, Melle (114), Moorsel, Sint Amandsberg, Wetteren.

HABITAT. - Voornamelijk in tuinen in de onmiddellijke omgeving van huizen, soms ook binnenhuis. Verder in grassen en lage kruiden.

FENOLOGIE. - April tot oktober.

Theridion familiare O.P.-CAMBRIDGE, 1871

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 17, 128, 150, 214.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - In alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART n° 42.

VINDPLAATSEN. - BRABANT: Kortenberg (214), Opwijk (128), Tielt-Winge (150), Zemst. - BRUSSEL: Boitsfort (17), Ukkel. - NAMUR: Nismes.

HABITAT. - Voornamelijk in voegen van oude muren en fruitbomen.

FENOLOGIE. - Zomer.

Theridion hannoniae DENIS, 1944

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 236, 265.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Frankrijk.

VERSPREIDINGSKAART n° 43.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Antwerpen (236), Hoboken (265). - LIEGE: Aywaille-Remouchamps, Corphalie. - OOST-VLAANDEREN: Doel.

HABITAT. - Onder rotsblokken in steengroeven. Worden soms meegevoerd met de steenblokken, wat de vindplaatsen in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen verklaard. De spinnen zijn hier gevonden onder steenblokken die gebruikt worden ter versteviging van de Scheldeoever.

FENOLOGIE. - Vangsten in maart tot oktober, mannetjes in de zomer, vrouwtjes vermoedelijk gans het jaar.

Theridion hemerobium SIMON, 1914

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 304.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Frankrijk, Duitsland en Noord-Europa.

VERSPREIDINGSKAART n° 44.

VINDPLAATSEN. - OOST-VLAANDEREN: Meerdonk (304). - WEST-VLAANDEREN: Woumen.

HABITAT. - Verruigde rietlanden.

FENOLOGIE. - Juni tot september.

Theridion impressum L. KOCH, 1881

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 147, 152, 167, 219, 277.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - In alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART n° 45.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Kalmthout. - BRABANT: Grootloo-Schriek, Haacht, Kapelle op den Bos, Keerbergen, Zemst. - BRUSSEL: Brussel (147), Ukkel. - HAINAUT: Stambrugge. - LIMBURG: Bree-Beek (152), Genk (167), Koersel-Beringen (277), Maasmechelen, Neerpelt (219), Opglabbeek. - LIEGE: Francorchamps (147), Mospert. - LUXEMBOURG: Bihain, Elhe-Virton, Torgny. - NAMUR: Frasnes-Couvin.

HABITAT. - Veelal in heide en kruidachtige planten.

FENOLOGIE. - Juni tot september.

Theridion instabile O.P.-CAMBRIDGE, 1870

SYNONIEMEN. - *Theridion lepidum* WALCKENAER, 1802

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 41, 143, 146, 222, 234, 298.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - In alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART n° 46.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Beerse. - BRABANT: Hamme-Mille, Limelette, Rixensart (222), Zemst (234).

- BRUSSEL: Ukkel (222). - HAINAUT: St Ghislain, Thuin. - LIMBURG: Meeuwen, Molenbeersel. - LIEGE: Moha.

- LUXEMBOURG: Arlon-Fouches (146), Redu (41). - OOST-VLAANDEREN: Meerdonk, Welle (143). - WEST-VLAANDEREN: Damme (298).

HABITAT. - In vochtige gebieden in kruiden, soms ook onder stenen.

FENOLOGIE. - Mei tot oktober.

Theridion melanurum HAHN, 1831

SYNONIEMEN. - *Theridion denticulatum* (WALCKENAER, 1802)

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 10, 30, 41, 83, 114, 167, 175, 199.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. -

VERSPREIDINGSKAART n° 47.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Antwerpen, Beerse, Duffel, Ekeren, Halle-Zoersel, Leest, Mechelen, Mol (114), Olen, Wommelgem. - BRABANT: Beersel, Hamme-Mille, Hoeilaart, Houwaart, Humbeek, Kapelle op den Bos, La Roche (30, 41), Ohain, Rixensart, Sterrebeek. - BRUSSEL: Boitsfort (41), Brussel (41), Laken (41), Oudergem, Ukkel (41), Watermaal. - HAINAUT: Marcinelle-Bruyère, Thuin. - LIMBURG: Alken, Bree, Bree-Beek, Genk (41, 167), Hasselt, Meeuwen, Reppel, Waterschei. - LIEGE: Aywaille (41), Comblain-au-Pont (41), Hamoir (41), Liège (41), Modave (41), Remouchamps (41), Spa (41), Stavelot (41), Theux (41), Tilff (41), Waremme (83). - LUXEMBOURG: Houffalize (41), Melreux (41), Ny, Torgny. - NAMUR: Beauraing (41), Bouge, Clermont-Les-Walcourt, Han-sur-Lesse (41), Hastière (41), Heure-en-Famenne (83), Nismes, Resteigne (175), Tailfer, Treignes, Vezin (10, 41), Yvoir (10, 41). - OOST-VLAANDEREN: Aalter, Gent, Hofstade, Leupegem, Moorsel, Sint Amandsberg, Vinderhoute, Wetteren. - WEST-VLAANDEREN: Kuurne, Nieuwpoort, Wijnendaal (199), Zuienkerke.

HABITAT. - Wordt meestal in de buurt van gebouwen gevonden.

FENOLOGIE. - Gans het jaar, hoogtepunt in de lente.

Theridion mystaceum L. KOCH, 1870

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 180.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - In alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART n° 48.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Antwerpen, Blaasveld, Postel, Rijkvorsel, Sint Lenaarts, Wuustwezel. - BRABANT: Kapelle op den Bos, Keerbergen, Limelette, Ottignies, Ramsdonk, Tremelo, Zemst. - BRUSSEL: Oudergem, Ukkel. - HAINAUT: Barbençon, Grandrieu. - LIMBURG: Alken, Bocholt, Bokrijk, Genk, Maasmechelen (180), Meeuwen. - LIEGE: Antheit, Comblain-au-Pont, Corphalie, Lanaye, Montfort, Rocheux, Rocheux-Theux, Vieuxville Logne, Wonck. - LUXEMBOURG: Torgny. - NAMUR: Castillon, Faulx-les-Tombes, Jemelle, Rochefort, Soulme. - OOST-VLAANDEREN: Hofstade, Moorsel.

HABITAT. - Op boomstammen, soms ook in gebouwen.

FENOLOGIE. - Voornamelijk april tot juli.

Theridion pictum (WALCKENAER, 1802)

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 10, 15, 41, 65, 74, 83, 146, 150, 152, 167, 168, 176, 212, 217, 243, 247, 265, 276, 277, 288.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - In alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART n° 49.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Antwerpen, Arendonk (243), Beerse (217), Blaasveld, Deurne (288), Ekeren, Hoboken (265), Hombeek, Kalmthout (41), Mol, Oelegem, Postel, Retie, Schilde, Sint Lenaarts, Tisselt, Turnhout, Wijnegem, Wommelgem, Wuustwezel, Zoersel. - BRABANT: Beersel (41), Bousval, Dion-le-Mont, Groenendael (10, 41), Grootloo-Schriek, Hamme-Mille, Humbeek, Keerbergen, Limelette, Tielt-Winge (150), Villers-la-Ville, Wommel, Zemst. - BRUSSEL: Bois de la Cambre (10), Boitsfort (10, 41), Brussel (41), Laken (41), Ukkel (10, 41). - HAINAUT: Harchies-Marais, Herchies, Virelles (212). - LIMBURG: Bree-Beek (152), Genk (41, 167), Heusden-Zolder, Houthalen (168), Kinrooi (152), Koersel-Beringen (277), Neerpelt, Rekem, Zolder, Zonhoven. - LIEGE: Baraque Michel (15, 65), Mount Rigi (176), Waremme (83). - LUXEMBOURG: Arlon-Fouches (146), Bihain (74), Herbeumont (41), Houffalize (41), Suxy, Torgny, Villers-devant-Orval. - NAMUR: Gembloux, Godinne (41), Heure-en-Famenne (276), Roly, Yvoir (41). - OOST-VLAANDEREN: Aalter, Bazel, Dendermonde (41), Gent (41), Massemen, Melle, Nevele. - WEST-VLAANDEREN: Beernem, Lapscheure, Oostduinkerke, Woumen (247).

HABITAT. - Op struiken en lage planten op vochtige plaatsen.

FENOLOGIE. - Voornamelijk mei tot september.

Theridion pinastri L. KOCH, 1872

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 10, 41, 134, 167, 219.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - In alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART n° 50.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Antwerpen, Kalmthout (41), Rijkevorsel. - BRABANT: Groenendael (41), Kapelle op den Bos, La Hulpe (41). - BRUSSEL: Boitsfort (41), Ukkel (10, 41). - HAINAUT: Virelles (134). - LIMBURG: Bree-Opitter, Genk (167), Gruitrode, Meeuwen, Neerpelt (219), Zolder. - LIEGE: Corphalie, Remouchamps (41), Val-Benoît (41). - NAMUR: Bouge, Erpent, Gembloux. - WEST-VLAANDEREN: Houthulst.

HABITAT. - In naaldbossen en in tuinen op coniferen.

FENOLOGIE. - Maart tot september.

Theridion simile C.L. KOCH, 1836

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 10, 15, 30, 41, 65, 146, 150, 167, 168, 176, 217, 219, 243, 277, 288, 295.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - In alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART n° 51.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Arendonk (243), Beerse (217), Brasschaat, Deurne (288), Herentals, Kalmthout (41), Mol, Oud-Turnhout (243), Retie, Rijkevorsel, Vosselaar, Wechelderzande, Wuustwezel. - BRABANT: Bousval (41), Groenendael (10, 41), Grootloo-Schriek, Keerbergen, La Hulpe (41), La Roche (30, 41), Limelette, Mt St. Guibert (41), Noirhat (41), Ohain, Rixensart (41), Tielt-Winge (150). - BRUSSEL: Boitsfort (10, 41), Brussel (41), Ukkel (41). - LIMBURG: As-en-Campine, Genk (41, 167), Gruitrode, Houthalen (168), Koersel, Koersel-Beringen (277), Maasmechelen, Meeuwen, Neerpelt (219). - LIEGE: Antheit, Baraque Michel (15, 41, 65), Corphalie, Mount Rigi (176), Remouchamps (41), Tilff (41). - LUXEMBOURG: Arlon-Fouches (146), Houffalize (41), Redu (41), Saint Hubert (41), Torgny. - NAMUR: Hastière (41), Sclayn, Treignes, Yvoir (41). - OOST-VLAANDEREN: Hofstade. - WEST-VLAANDEREN: De Panne, Oostduinkerke, Sint-Andries (295).

HABITAT. - In heidevelden.

FENOLOGIE. - Voornamelijk lente en zomer.

Theridion sisyphium (CLERCK, 1757)

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 10, 15, 30, 65, 83, 146, 150, 152, 168, 175, 176, 217, 243, 276, 277.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - In alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART n° 52.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Arendonk (243), Beerse (217), Brasschaat, Kalmthout, Mol, Retie, Rijkevorsel, Rijmenam, Schilde, Sint Lenaarts, Weelde, Wuustwezel, Zoersel. - BRABANT: Grand-Bigard (10), Groenendael (10), Grootloo-Schriek, Hoeilaart, Keerbergen, La Roche (30), Limelette, Tervuren, Tielt-Winge (150). - BRUSSEL: Boitsfort (10), Brussel, Oudergem (10), Ukkel. - HAINAUT: Thuin. - LIMBURG: Bocholt-Reppel, Bree-Beek (152), Houthalen (168), Koersel-Beringen (277), Maasmechelen, Meeuwen, Neerpelt, Opoeteren, Rekem, Reppel, Zonhoven. - LIEGE: Aywaille, Baraque Michel (15, 65), Corphalie, Francorchamps, Hockai, Lanaye, Modave (10), Mount Rigi, Mount Rigi (176), Spa (83). - LUXEMBOURG: Amonines, Arlon-Fouches (146), Buzenol, Béverie, Ethe, Florenville, Herbeumont, Lamorteau, Orval, Redu (10), Rossignol, Ruelle, Saint Hubert (10), Torgny, Vielsalm. - NAMUR: Belvaux, Bohan, Cul-des-Sarts, Doische, Eprave, Gimnée, Heure-en-Famenne (276), Houyet, Jemelle, Marche-Les-Dames (10), Nismes, Resteigne (175), Sclayn, St Servais-Lez-Namur (10), Treignes, Yvoir (10). - OOST-VLAANDEREN: Bazel. - WEST-VLAANDEREN: Knokke.

HABITAT. - In struiken en kruiden, voornamelijk in heidevelden.

FENOLOGIE. - Mei tot september.

Theridion tinctum (WALCKENAER, 1802)

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 10, 41, 150, 152, 175, 199, 217, 243, 277.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - In alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART n° 53.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Arendonk (243), Beerse (217), Blaasveld, Deurne, Kalmthout, Mol, Oud-Turnhout (243), Rijkevorsel, Sint Lenaarts, Turnhout, Vosselaar, Wijnegem, Wommelgem, Wuustwezel. - BRABANT: Beersel, Bousval (41), Dworp, Forêt de Soignes, Groenendael (10, 41), Grootloo-Schriek, Hoeilaart, Humbeek, Kapelle op den Bos, Keerbergen, La Hulpe (41), La Roche (41), Londerzeel, Mt St. Guibert (41), Opwijk, Ottenburg, Ottignies, Tervuren (41), Tielt-Winge (150), Villers-la-Ville (41), Zemst. - BRUSSEL: Boitsfort (10, 41), Brussel, Oudergem (41), Ukkel. - HAINAUT: Silly. - LIMBURG: Bree (152), Genk (41), Gruitrode, Hechtel, Kinrooi, Koersel-Beringen (277), Maasmechelen, Meeuwen, Opglabbeek, Rekem. - LIEGE: Antheit, Bleret, Comblain-au-Pont, Corphalie, Remouchamps (41), Spa (41), Tilff (41), Vieuxville Logne. - LUXEMBOURG: Houffalize (41), On, Redu (41). - NAMUR: Frasnes-Couvin, Gembloux, Hastière (41), Heure-en-Famenne, Jemelle, Nismes, Resteigne (175), Soulme, Treignes, Yvoir (41). - OOST-VLAANDEREN: Berlare, Gent, Hofstade, Knesselare, Zwijnaarde. - WEST-VLAANDEREN: De Panne, Oostkamp, Wijnendaal (199).

HABITAT. - Zowel tegen gebouwen als in struiken, voornamelijk in naaldbossen.

FENOLOGIE. - Mei tot oktober.

Theridion uhligi MARTIN, 1975

SYNONIEMEN. - *Theridion hublei* JOUQUÉ, 1977

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 133, 180, 277.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Duitsland.

VERSPREIDINGSKAART n° 54.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Kalmthout (133). - LIMBURG: Koersel-Beringen (277), Maasmechelen (180).

HABITAT. - In heidevelden.

FENOLOGIE. - Lente en zomer.

Theridion varians HAHN, 1833

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 10, 30, 41, 65, 74, 83, 150, 152, 167, 175, 176, 185, 190, 217, 219, 238, 265, 276, 277, 288.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - In alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART n° 55.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Antwerpen, Baarle-Hertog, Beerse (217), Blaasveld, Brasschaat, Deurne (288), Ekeren, Grobbendonk (41), Hoboken (265), Kalmthout (10, 41), Mol, Mortsel, Olen, Postel, Ranst, Rijkevorsel, Schilde, Sint Lenaarts, Westmeerbeek, Wijnegem, Wommelgem, Wuustwezel. - BRABANT: Bousval (41), Braine-l'Alleud (41), Diest (41), Dilbeek (10), Duisburg (41), Genval (41), Grand-Bigard (10, 41), Groenendael (10, 41), Grootloo-Schriek, Hoeilaart, Humbeek, Kapelle op den Bos, Keerbergen, La Hulpe (41), La Roche (30, 41), Leuven (41), Limal (41), Limelette, Meerdaal, Meise (41), Mt St. Guibert (41), Ohain, Ottignies, Ternat (41), Tielt-Winge (150), Zemst. - BRUSSEL: Boitsfort (10, 41), Brussel (41), Laken (41), Oudergem (41), Ukkel (10, 41). - HAINAUT: Braine-le-Compte, Hautrage, Thuin. - LIMBURG: As (190), Bocholt, Bokrijk, Bree (152), Bree-Beek (152), Genk (41, 167), Helchteren, Kinrooi (152), Koersel-Beringen (277), Lanaken (41), Lommel, Maasmechelen, Meeuwen, Munsterbilzen (41), Neerpelt (219), Niel-bij-As (190), Opglabbeek. - LIEGE: Antheit, Aywaille (41), Bas-Oha (41), Bleret, Chôdières (65), Comblain-au-Pont (41), Corphalie, Duzo-Moùpas (65), Eupen, Fraineux (65), Francorchamps (41, 65), Hamoir (41), Heure-le-Romain (83), Hockai (65), Hoëgne (65), Lanaye, Liège (41), Mount Rigi (176), Pont-de-Bonne (10), Rocheux, Rocheux-Theux, Spa (41), Stoumont (41), Thier de Nivelles-Lixhe (185), Tilff (41), Waremme (41). - LUXEMBOURG: Bihain (74), Chanly (41), Daverdisse (41), Grupont (41), Houffalize (41), Libin (41), Marche-en-Famenne, Melreux (41), Redu (41), Roche-à-Frêne (41), Salm-Château, Torgny, Vielsalm (41). - NAMUR: Andenne, Bohan, Bouge, Clermont-Les-Walcourt, Cul-des-Sarts, Dave (41), Dinant (41), Doische, Eprave (41), Evrehailles (41), Gembloux, Gembloux-Pommiers, Gimnée-Pry, Han-sur-Lesse (41), Hastière (41), Heure-en-Famenne (276), Jemelle, Marche-Les-Dames (41), Nismes, Resteigne (175), Rochefort (41), Samson (10, 41), Scy (41), Silenrioux (41), Soulme, Treignes, Wépion (41), Yvoir (10, 41). - OOST-VLAANDEREN: Aalter, Gent, Hofstade, Massemen, Melden (238), Melle. - WEST-VLAANDEREN: Blankenberge, Lombardsijde, Oostduinkerke, Wingene, Woumen.

HABITAT. - In bomen, struiken en lagere planten.

FENOLOGIE. - Gans het jaar, voornamelijk mei to augustus.

ANAPIDAE

*Comaroma**Comaroma simoni* BERTKAU, 1889

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 162.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Nederland, Duitsland en Frankrijk.

VERSPREIDINGSKAART n° 56.

VINDPLAATSEN. - LIEGE: Antheit, Moha (162),

HABITAT. - Onder stenen en in de strooisellaag in bossen.

FENOLOGIE. - Zomer.

THERIDIOSOMATIDAE

*Theridiosoma**Theridiosoma gemmosum* (L. KOCH, 1877)

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 264.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - In alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART n° 57.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Deurne. - BRABANT: Humbeek (264).

HABITAT. - Steeds op vochtige plaatsen op planten, zeer laag bij de grond.

FENOLOGIE. - Eind april tot juli.

GECITEERDE LITERATUUR

- ALDERWEIRELDT, M. & MAELFAIT, J.-P., 1990. Catalogus van de Spinnen van België. Deel VII. Lycosidae. *Studiedocumenten van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen*, 61 : 92 pp.
- HAHN, C.W., 1888. Monographie der Spinnen : (1820-1836). Heruitgave met kommentaar van P. Sacher. Zentralantiquariat der DDR, Leipzig, 143 pp.
- DE BLAUWE, R. & BAERT, L., 1981. Catalogue des araignées de Belgique. *Bulletin l'Institut royale des Sciences naturelles de Belgique*, 53 : 1-37.
- JANSSEN, M. & BAERT, L., 1987. Catalogus van de spinnen van België. Deel IV. Salticidae. *Studiedocumenten van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen*, 43 : 32 pp.
- PLATNICK, N.I., 1989. *Advances in Spider Taxonomy, 1981-1987: a supplement to Brignoli's A catalogue of the Araneae described between 1940 and 1981*. Manchester University Press, Manchester, England, 673pp.
- RANSY, M., KEKENBOSCH, J. & BAERT, L., 1990. Catalogue des araignées de Belgique. Partie VI. Clubionidae et Liocranidae. *Documents de travail de l'Institut royal des Sciences naturelle de Belgique*, 57 : 30 pp.
- RANSY, M. & BAERT, L., 1985. Catalogue des araignées de Belgique, Deuxième partie: les cribellates - *Documents de travail de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique*, 22 : 24 pp.
- RANSY, M. & BAERT, L., 1987. Catalogue des araignées de Belgique. Troisième partie. Les Araneidae. *Documents de travail de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique*, 26 : 41 pp.
- RANSY, M. & BAERT, L., 1987. Catalogue des araignées de Belgique. Cinquième partie. Anyphaenidae, Argyronetidae, Atypidae, Dysderidae, Mimetidae, Nesticidae, Oonopidae, Oxyopidae, Pholcidae, Pisauridae, Scytodidae, Segestriidae, Eusparassidae, Zodariidae et Zoridae. *Documents de travail de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique*, 46 : 25 pp.
- WUNDERLICH, J., 1986. *Spinnenfauna gestern und heute : Fossile Spinnen in Bernstein und ihre heute lebenden Verwandten*. Quelle & Meyer, Wiesbaden. 282 pp.

