

---

# Catalogus van de Spinnen van België

## Deel XIII

### Thomisidae

---

door Marc JANSSEN\*

\* Weg naar Ellikom 128  
B- 3670 MEEUWEN

## INHOUDSTAFEL

Inleiding . . . . .	54
Lijst van de Belgische Thomisidae . . . . .	54
Systematische lijst van de soorten . . . . .	55
Geciteerde literatuur . . . . .	65
Verspreidingskaarten . . . . .	67

## INLEIDING

Tot de familie van de *Thomisidae*, ook wel Krabspinnen genoemd, behoren kleine tot middelgrote spinnen, die in staat zijn zich niet alleen voorwaarts en achterwaarts te verplaatsen, maar tevens zijdelings gelijk een echte krab. Onopvallend zitten ze op bladeren, bloemen of onder stenen te wachten op prooidieren, goed gecamoufleerd door hun schutkleuren. Sommige soorten bezitten zelfs het vermogen van kleur te veranderen naargelang de ondergrond waarop ze zitten.

Voor de nomenclatuur hebben de auteurs zich op volgende werken gebaseerd: "Spiders of Great Britain and Ireland" van M.J. ROBERTS (1985) en de "Herziene soortenlijst van de Belgische spinnen" van R. BOSMANS & J.P. MAELFAIT (1986).

De hier verwerkte gegevens zijn afkomstig van de verzamelingen van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, van het Laboratorium voor Oecologie der Dieren, Zoögeografie en Natuurbehoud (Dir. Prof. Dr. H. DUMONT) van de R.U.G. en van volgende personen: Dr. M. ALDERWEIRELDT, Dr. L. BAERT, Dr. L. BARA, Dr. R. BOSMANS, J. BOSSelaers, L. CREVECOEUR, Prof. Dr. J. HUBLÉ, J. JACOBS, M. JANSSEN, Dr. R. JOCQUE, J. KEKENBOSCH, R. KEKENBOSCH, J. VAN KEER, P. POOT, M. RANSY en H. VANUYTVEN. Wij danken dan ook hier deze instellingen en personen.

Datum van afsluiten: 31 december 1990.

## LIJST VAN DE BELGISCHE THOMISIDAE

<i>Coriarachne depressa</i> (C.L. KOCH, 1837)	<i>Tmarus piger</i> (WALCKENAER, 1802)
<i>Diaeа dorsata</i> (FABRICIUS, 1777)	<i>Xysticus acerbus</i> THORELL, 1872
<i>Heriaeus graminicola</i> (DOLESCHALL, 1852)	<i>audax</i> (SCHRANK, 1803)
<i>Misumena vatia</i> (CLERCK, 1757)	<i>bifasciatus</i> C.L. KOCH, 1837
<i>Misumenops tricuspidatus</i> (FABRICIUS, 1775)	<i>cristatus</i> (CLERCK, 1757)
<i>Oxyptila atomaria</i> (PANZER, 1801)	<i>erraticus</i> (BLACKWALL, 1834)
<i>blackwalli</i> SIMON, 1875	<i>ferrugineus</i> MENGE, 1875
<i>brevipes</i> (HAHN, 1831)	<i>kempelini</i> THORELL, 1872
<i>nigrita</i> (THORELL, 1875)	<i>kochi</i> THORELL, 1872
<i>praticola</i> (C.L. KOCH, 1837)	<i>lanio</i> C.L. KOCH, 1824
<i>pullata</i> (THORELL, 1875)	<i>lineatus</i> (WESTRING, 1851)
<i>sanctuaria</i> (O.P. -CAMBRIDGE, 1871)	<i>luctator</i> L.KOCH, 1870
<i>scabricula</i> (WESTRING, 1851)	<i>luctuosus</i> (BLACKWALL, 1836)
<i>simplex</i> (O.P.- CAMBRIDGE, 1862)	<i>robustus</i> (HAHN, 1832)
<i>trux</i> (BLACKWALL, 1846)	<i>sabulosus</i> (HAHN, 1832)
<i>Pistius truncatus</i> (PALLAS, 1772)	<i>striatipes</i> (L. KOCH, 1870)
<i>Synema globosum</i> (FABRICIUS, 1775)	<i>ulmi</i> (HAHN, 1832)
<i>Thomisus onustus</i> WALCKENAER, 1806	

## SYSTEMATISCHE LIJST VAN DE SOORTEN

### *Coriarachne depressa* (C.L. KOCH, 1837)

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIE. - 33, 152, 154, 167, 168.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen met uitzondering van Groot-Brittanië.

VERSPREIDINGSKAART N° 1

VINDPLAATSEN. - LIMBURG: Bree (152, 154), Genk (167), Gruitrode, Houthalen (168), Rekem, Zolder. - LUIK: Modave (33). - LUXEMBURG: Redu (33).

HABITAT. - Voornamelijk op naaldbomen.

FENOLOGIE. - Volwassen exemplaren voornamelijk van april tot augustus, maar ook enkele in januari.

### *Diaeas dorsata* (FABRICIUS, 1777)

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 33, 83, 113, 126, 146, 149, 152, 175, 190, 213, 217, 276.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART N° 2.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Balen, Beerse (217), Herentals (33), Kalmthout (33), Mol, Retie, Rijkevorsel, Schilder. - BRABANT: Boitsfort (33), Brussel (33), Jette (113), Keerbergen, Ottignies (113), Tervuren. - HENEGOUWEN: Barbençon, Chimay (213), Virelles. - LIMBURG: Alken, As (190), Bokrijk, Genk (33), Hasselt, Lummen, Maasmechelen, Meeuwen, Molenbeersel (152), Rekem. - LUIK: Ben-Ahin, Eupen, Hautes Fagnes, Méry (83). - LUXEMBURG: Daverdisse (125), Fouches (148), La Roche (113), Lesse Our, Munro (113), Orval (113), Poupehan, Recogne, Redu (33), Tintigny, Torgny. - NAMEN: Blaimont, Bohan (125), Culdes-Sarts, Crupet (113), Ferage, Heure-en-Famenne (276), Leffe, Merlemon, Nismes, Rivière (113), Resteigne (175), Rochefort, Treignes (149), Vallée de la Houille, Winnenne (113), Yvoir (33).

HABITAT. - Op de takken van eikebomen, heide en lagere struiken.

FENOLOGIE. - Van eind april tot juli.

### *Heriaeus graminicola* (DOLESCHALL, 1837)

SYNONIEMEN - *Heriaeus savignyi* E. SIMON, 1875. *Heriaeus hirtus* (LATREILLE, 1819).

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 33, 113, 116.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Frankrijk en Middellandse Zeegebied.

VERSPREIDINGSKAART N° 3.

VINDPLAATSEN. - BRABANT: Brussel (33, 113), Limelette (116).

HABITAT. - Op struiken en Planten; in de oksels van de bladeren.

FENOLOGIE. - Volwassen in de maand juli.

### *Misumena vatia* (CLERCK, 1757)

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 33, 85, 78, 83, 97, 113, 125, 46, 149, 150, 152, 167, 173, 175, 185, 217, 276, 282, 288, 295.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART N° 4.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Beerse, Brasschaat, Deurne (288), Ekeren, Grobbendonk (33), Kalmthout (33, 113), Mol, Postel (33), Retie, Rijkevorsel, St. Lenaerts (217), Turnhout, Vosselaar, Weelde. - BRABANT: Auderghem (33), Bloemendaal (33), Boitsfort (33), Bousval (33), Brussel (33), Court-Saint-Etienne (33), Diest (33), Groenendaal (33), Houwaart, La Hulpe (33), Leuven (33), Limelette, Nivelles (33), Noirhat (33), Ottignies (33), Rixensart (33), Tielt, Walenbos (150), Wavre (33). - HENEGOUWEN: Barbençon (113),

Braine-le-Comte (33), Forêt de Rance, Forges (125), Presles (113), Virelles. - LIMBURG: Bree (152), Genk (33, 187), Gruitrode, Maaseik (33), Maasmechelen, Meeuwen, Molenbeersel (152), Opitter, Rekem, Waterschei, Zonhoven. - LUIK: Aywaille (33), Barrage de la Gileppe (33, 65), Ben-Ahin, Bra, Chaudfontaine (33), Coo (33), Eben-Emael, Embourg (33), Esneux, Ferrières, Grivegnée (113), Hamoir (33), Lanaye, Lixhe (113), Luik (33), Martinrige (33), Modave (33), Montfort (282), Raeren (113), Régissa, Sougné-Remouchamps, Spa (33), Stavelot (113), Steinebrück, St. Vith, Sy (113), Thier de Nivelle (185), Tilff (83, 113), Wanze. - LUXEMBURG: Amonines (113), Auby (113), Awenne (33), Baraque-Fraiture (78), Barvaux-sur-Ourthe (113), Bois de Fouches, Buzenol (173), Châtillon, Chiny (113), Etalle (113), Ethe (113), Fouches (146), Habay-la-Neuve, Hachy, Haute-Ardenne (97), Hotton (113), Lamorteau (113), La Roche-en-Ardenne (33, 113), Lesse-Our, Marbehan (33), Melreux (33, 113) Muno (113), Nassogne (113), Neufchâteau (33), Orval (113), Redu (33), Ruette, Saint-Hubert (33), Stockem, Torgny (113), Villers-devant-Orval. - NAMEN: Alvaux, Andenne, Belvaux, Blaimont, Bohan, Bourseigne, Bure, Bure-Tellin, Caverne de Goyet, Cerfontaine (113), Couvin, Cul-des-Sarts, Dave (33), Dinant (33), Dourbes, Frasnes lez Couvin, Furfooz (33), Gimnée, Hastières (33), Han-sur-Lesse (113, 125), Hermeton-sur-Meuse (33), Heure-en-Famenne (276), Houyet (113), Jemelle, Louette-Saint-Pierre (33, 113), Marche-les-Dames (33), Mozet (113), Namèche (113), Namen (33, 149), Nismes (125), Resteigne (175), Rivière (113), Rochefort, Roly, Romedenne, Treignes, Vaucelles, Waulsort (33), Wavreille, Willerzie, Winenne (113), Yvoir (33, 113). - OOST-VLAANDEREN: Gent (33), St. Jan in Eremo. - WEST-VLAANDEREN: Brugge (33), Sint-Andries (295).

HABITAT. - Op struiken en bloeiende planten.

FENOLOGIE. - Van begin mei tot zelfs einde oktober volwassen.

### *Misumenops tricuspidatus* (FABRICIUS, 1775)

SYNONIEM. - *Misumena tricuspidata* FABRICIUS, 1775.

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 33, 113, 143, 150, 167, 188, 217.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen behalve Groot-Brittanië.

VERSPREIDINGSKAART N° 5.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Beerse-Rijkevorsel (217). - BRABANT: Houwaart (143), Walenbos (150). - LIMBURG: Bree, Genk (167), Molenbeersel, Rekem, Zolder, Zonhoven (188). - LUXEMBURG: La Roche-en-Ardenne (33, 113), Melreux (33, 113).

HABITAT. - Op lage begroeïng in vochtige biotopen.

FENOLOGIE. - Van mei tot oktober.

### *Oxyptila atomaria* (PANZER, 1801)

SYNONIEM. - *Oxyptila horticola* C.L. KOCH, 1837.

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 33, 71, 78, 97, 113, 121, 126, 149, 175, 181, 183, 185, 187, 195, 247, 294.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART N° 6.

VINDPLAATSEN. - BRABANT: Boitsfort (33), Diest (33), Groenendaal (33), La Hulpe (33), Leuven (33). - LIMBURG: Genk (33), Maaseik (33), Munsterbilzen (33). - LUIK: Aywaille, Comblain-au-Pont (33, 71), Embourg (33), Lixhe, Modave (33), Thier de Nivelle (185), Tilff (33), Wanze. - LUXEMBURG: Baraque-Fraiture (78), Ethe (187), Haute-Ardenne (97), Hotton, La Roche-en-Ardenne (33), Orval (113), Ozo (113), Salmchâteau (113), Xhoris. - NAMEN: Dinant (33), Dourbes, Han-sur-Lesse, Le Mesnil, Mariembourg (33), Nismes (195), Resteigne (175), Treignes (149, 195), Villers-sur-Lesse (113), Yvoir (33). - WEST-VLAANDEREN: De Haan (181), De Panne (121, 126), Koksijde (121), Nieuwpoort (183), Oostduinkerke, Wenduine, Woumen (247), Zedelgem (294).

HABITAT. - Op lage begroeïng, onder stenen en in duinbiotopen.

FENOLOGIE. - Volwassen exemplaren over heel het jaar.

*Oxyptila blackwalli* SIMON, 1875.

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 33, 113.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART N° 7.

VINDPLAATSEN. - LUIK: Comblain-au-Pont (113). - LUXEMBURG: Barvaux lez Durbuy (33), Bomal (33).

- NAMEN: Han-sur-Lesse (33), Treignes.

HABITAT. - Onder stenen, struikgewas en in kalkgrasland.

FENOLOGIE. - Volwassen in voorjaar en zomer.

*Oxyptila brevipes* (Hahn, 1831)

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 33, 96, 113, 128, 152.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART N 8.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Mol. - LIMBURG: Bree, Genk (96, 113), Molenbeersel (152). - LUXEMBURG: Buzenol. - NAMEN: Agimont(128), Hastières (33), Nismes, Treignes. - WEST-VLAANDEREN: Blankenberge.

HABITAT.- Onder stenen, in strooisel van loof- en naaldhout.

FENOLOGIE. - Van half februari tot einde september.

*Oxyptila nigrita* (THORELL, 1875)

SYNONIEM. - *Oxyptila atomaria* (PANZER, 1801).

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 33, 71, 113, 173, 181, 185.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART N° 9.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Kalmthout (33). - LUIK: Comblain-au-Pont (71), Lixhe, Thier de Nivelle (185). - LUXEMBURG: Buzenol (173). - NAMEN: Nismes (113). - WEST-VLAANDEREN: De Haan (181).

HABITAT. - In duinbiotopen, kalkgrasland en zelfs in mierennesten.

FENOLOGIE. - Van half april tot half oktober.

*Oxyptila praticola* (C.L. KOCH, 1837)

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 33, 113, 114, 121, 126, 128, 149, 167, 181, 183, 190, 192, 196, 226, 238, 246, 247, 263, 269, 272, 273, 276, 288, 294, 295, 297.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART N° 10.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Beerse, Deurne (288), Olen, Wommelgem (192). - BRABANT: Beersel, Berchem (33), Boitsfort (33), Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Laeken (33), St.Geniusrode (33), Ukkel (113), Waterloo (33), Watermael, Zemst. - HENEGOUWEN: Cambron St.Vincent, Henripont, Villers-la-Ville. - LIMBURG: Achel, Alken, As (190), Bree, Genk (167), Hasselt, Meeuwen, St.Martensvoeren, Waterschei, Zolder. - LUIK: Comblain-au-Pont (33), Coo (33), Esneux (33), Lanaye, Marnette, Moha, Spa (33), Tilff (33). - LUXEMBURG: La Roche-en-Ardenne (33). - NAMEN: Agimont (128), Castillon (113), Dave (33), Dourbes, Florennes, Han sur Lesse (33), Heure-en-Famenne (272, 276), Mariembourg (33), Namur (33, 113), Treignes (149), Yvoir (33). - OOST-VLAANDEREN: Kalken (246), Lovendegem, Massemene, Meerdonk, Melden (238), Overmere-Donk, Sint Denijs Westrem (269). - WEST-VLAANDEREN: Beernem (273), Blankenberge, De Haan (181 ), De Panne (121, 126, 128), Ichtegem (226), Koksijde (113, 121), Nieuwpoort (183), Oost-Duinkerke (114, 121), Raverzijde, St.Andries (295), Veldegem (196), Wenduine, Woumen (247, 297), Zedelgem (263).

HABITAT. - In strooisel van duin- en heidegebieden, tuinen, grasland, moerasgebieden loof- en naaldhout.  
 FENOLOGIE. - Volwassen exemplaren kunnen het hele jaar door aangetroffen worden.

*Oxyptila pullata* (THORELL, 1875)

SYNONIEM. - *Oxyptila rauda* SIMON, 1875.

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 64, 113, 149, 195.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART N° 11.

VINDPLAATSEN. - LUXEMBURG: Aisne (64). - NAMEN: Frasnes-lez-Couvin (13), Nismes (196), Treignes (149, 195).

HABITAT. - Onder stenen in kalkrijke biotopen, kalkgraslanden; warmteminnend.

FENOLOGIE. - Van april tot augustus.

De onderzochte exemplaren van *O. rauda* blijken allen *O. pullata* te zijn. (HIPPA, H. & all. 1986).

*Oxyptila sanctuaria* (O.P.-CAMBRIDGE, 1871)

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 33, 134, 181, 183, 294.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART N° 12.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Lilloo (33). - HENEGOUWEN: St.Ghislain. - NAMEN: Frasnes-lez-Couvin.

- WEST-VLAANDEREN: Blankenberge, De Haan (181), De Panne, Knokke (134), Koksijde, Lombardzijde, Nieuwpoort (183), Raversijde, Zedelgem (294).

HABITAT. - Tussen gras en duinbiotopen.

FENOLOGIE. - Volwassen exemplaren van maart tot eind oktober.

*Oxyptila scabricula* (WESTRING, 1851)

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 33, 113, 149, 167, 168, 195, 202.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART N° 13.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Kalmthout (202). - LIMBURG: Genk (167), Houthalen (168), Maasmechelen.

- LUIK: Comblain-au-Pont (33), Modave (113), Remouchamps, Tilff (33), Xhoris. - LUXEMBURG: La Roche-en-Ardenne (33). - NAMEN: Nismes (196), Treignes (149, 195).

HABITAT. - Voornamelijk in heidebiotopen en kalkgraslanden.

FENOLOGIE. - Adulten van eind april tot eind juli.

*Oxyptila simplex* (O.P.-CAMBRIDGE, 1862)

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 33, 113, 114, 121, 126, 128, 131, 183, 187, 246, 247, 276, 297.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART N° 14.

VINDPLAATSEN. - BRABANT: Brussel (33), Jette (33), Ukkel (113), Zemst. - HENEGOUWEN: St.Ghislain.

- LIMBURG: Genk. - LUIK: Comblain-au-Pont (113), Tilff (33). - LUXEMBURG: Baraque Fraiture (113), Ethe-Buzenol (187). - NAMEN: Doische, Frasnes-lez-Couvin, Heure-en-Famenne (276), Yvoir (113). - OOST-VLAANDEREN: Kalken (246), Kieldrecht (131), St.Jan in Eremo. - WEST-VLAANDEREN: Blankenberge,

De Haan, De Panne (121, 126, 128), Knokke (114), Koksijde (121), Nieuwpoort (183), Oostduinkerke (113, 121), Raversijde, Woumen (247, 297).

HABITAT. - Aangetroffen in rietvegetaties, vochtige heide, duinen, schorre en zandpannen.

FENOLOGIE. - Van april tot september.

### *Oxyptila trux* (BLACKWALL, 1846)

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 33, 78, 97, 113, 117, 121, 149, 150, 162, 161, 166, 173, 181, 186, 187, 190, 196, 202, 226, 247, 250, 263, 266, 269, 272, 273, 294, 295, 299.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART N° 15.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Antwerpen (266), Bornem (186), Kalmthout (202), Wijnegem. - BRABANT: Boitsfort (33), Keerbergen, Liederkerke, Walenbos (150), Zemst. - HENEGOUWEN: Blicquy, Casteau, Marcinelle (113), Obourg. - LIMBURG: Alken, As (190), Bree, Hasselt, Molenbeersel (152), Opitter (299), St. Martensvoeren. - LUIK: Hautes-Fagnes (113), Moha (161), Rocherath (165). - LUXEMBURG: Baraque Fraiture (78), Bihain, Buzenol (173), Ethe (187), Haute Ardenne (97), Hotton, Poix-St. Hubert, Saules, Torgny (113), Villers-devant-Orval (113). - NAMEN: Anseremme (33), Dourbes, Férange, Frasnes-lez-Couvin, Hazy Saint Jean, Heure en Famenne (272), Louette-St.-Pierre, Rivière (113), Serinchamps, Treignes (149). - OOST-VLAANDEREN: Aalter, Elene, Melle (260), Neigembos, St. Denijs Westrem (269), Zwijnaarde (117). - WEST-VLAANDEREN: Beernem (273), Blankenberge, De Haan (181), De Panne (121), Houthulst, Ichtegem (226), Nieuwpoort, Oostende, St. Andries (295), Torhout, Veldegem (196), Woumen (247), Zedelgem (263, 294).

HABITAT. - Meest voorkomende *Oxyptila* in de meest verscheiden biotopen.

FENOLOGIE. - Volwassen exemplaren kunnen het ganse jaar door aangetroffen worden.

### *Pistius truncatus* (PALLAS, 1772)

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 33, 110, 113, 126.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART N° 16.

VINDPLAATSEN. - BRABANT: Wavre (110, 113). - HENEGOUWEN: Chimay-Virelles (126). - LIMBURG: Zonhoven. - LUIK: Tilff (33). - NAMEN: Dion, Treignes.

HABITAT. - Omgeving van steengroeven, heidebiotopen en bosranden.

FENOLOGIE. - Volwassen spinnen gevangen in de maand juli.

### *Synema globosum* (FABRICIUS, 1775)

SYNONIEM. - *Synema globosa* FABRICIUS, 1775.

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 33, 113, 126.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen, uitgezonderd Groot-Brittannië  
VERSPREIDINGSKAART N° 17.

VINDPLAATSEN. - LIMBURG: Rekem. - LUIK: Tilff (33). - LUXEMBURG: La Roche-en-Ardenne (113), Nassogne (113), Orval (113), Redu (33), Torgny (113). - NAMEN: Annevoie (33), Arbre-lez-Fosses (113), Aublain (33), Blaimont, Bohan (125), Dave (33), Godinne (33), Hastière (33), Heure-en-Famenne, Houyet (113), Rivière (113), Treignes, Winenne (113), Yvoir (113).

HABITAT. - Voornamelijk op bloeiende planten; warmteminnend.

FENOLOGIE. - Adulten van eind mei tot half juli.

*Thomisus onustus* WALCKENAER, 1806

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 33, 113, 126, 134.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART N° 18.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Kalmthout (134), Postel (33, 113). - HENEGOUWEN: Chimay-Virelles (125).

HABITAT. - Slechts enkele exemplaren werden aangetroffen op Calluna heide; warmteminnend.

FENOLOGIE. - Van juni tot september.

*Tmarus piger* (WALCKENAER, 1802)

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 33, 113.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen met uitzondering van Groot-Brittanië.

VERSPREIDINGSKAART N° 19.

VINDPLAATSEN. - LUIK: Logne (113), Méry (113), Modave (33), Tilff (33), Trooz (113). - LUXEMBURG: Torgny. - NAMEN: Rochefort (113), Treignes, Yvoir (33).

HABITAT. - In kruidenvegetaties, kalkgraslanden en langs bosranden; warmteminnend.

FENOLOGIE. - Adult in de maanden mei en juni.

*Xysticus acerbus* THORELL, 1872.

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 33, 83.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART N° 20.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Ekeren (33), Grobbendonk (33), Hingene (33), Kalmthout (33), Turnhout (33). - BRABANT: Auderghem (33), Boitsfort (33), Mont-Saint-Guibert (33). - LUIK: Embourg (33), Chawresse (83), Luik (33), Rocherath, Tilff (33). - LUXEMBURG: La Roche-en-Ardenne (33). - NAMEN: Aublin (33), Philippeville (33).

HABITAT. - In lage begroeïingen en heidebiotopen.

FENOLOGIE. - Volwassen in mei en juni.

*Xysticus audax* (SCHRANK, 1803)

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 217, 219, 263, 273, 295.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART N° 21.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Balen, Beerse, Brasschaat, Grootlo, Kalmthout, Mol-Postel, Rijkevorsel (217), Turnhout, Wechelder-zande. - BRABANT: Hofstade, Keerbergen, Zemst. - HENEGOUWEN: Barbençon. - LIMBURG: As, Genk-Bokrijk, Gruitrode, Maasmechelen, Meeuwen, Neerpelt (219), Rekem, Zolder. - LUIK: Forêt d'Elsenborn, La Calamine, Lixhe. - LUXEMBURG: Buzenol, Châtillon, Ethe-Buzenol, La Roche-en-Ardenne, La Vachère, Nassogne, Orval. - NAMEN: Cerfontaine, Heure-en-Famenne, Lustin-Tailfer, Roly. - WEST-VLAANDEREN: Beernem (273), De Panne, Koksijde, Sint-Andries (295), Zedelgem (263).

HABITAT. - Samen met X. cristatus in de meest verscheiden droge biotopen aan te treffen.

FENOLOGIE. - Volwassen van april tot oktober.

*Xysticus bifasciatus* C.L. KOCH, 1837

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 33, 113, 138, 146, 166, 187, 244, 276.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART N° 22.

VINDPLAATSEN. - BRABANT: Boitsfort (33), Tervuren (113). - LIMBURG: Genk (33). - LUIK: Elsenborn (138), Embourg (33), Rocherath (165), Rocheux (244), Xhoris. - LUXEMBURG: Aarlen, Bouillon, Etalle (113), Ethe-Buzenol, Fouches (146), La Roche-en-Ardenne, Libramont (113), Marbehan (33), Muno, Orval (113), Stockem, Torgny (113). - NAMEN: Dourbes, Frasnes, Gimnée, Han-sur-Lesse, Hastières (33) Heure-en-Famenne (276), Le Mesnil, Nismes, Treignes (146), Yvoir (33). - WEST-VLAANDEREN: Nieuwpoort.

HABITAT. - In strooisel, kalkgrasland en langs bosranden.

FENOLOGIE. - Adulten van begin mei tot begin oktober.

*Xysticus cristatus* (CLERCK, 1757)

SYNONIEM. - *Xysticus pini* HAHN, 1831.

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 33, 64, 65, 105, 113, 121, 125, 126, 138, 146, 149, 150, 152, 167, 168, 175, 176, 177, 181, 183, 185, 187, 192, 202, 212, 217, 219, 243, 244, 247, 250, 265, 266, 269, 273, 276, 277, 279, 288, 294, 295, 299.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART N° 23.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Antwerpen (33, 266), Balen, Brasschaat, Brecht (113), Deurne (33, 288), Ekeren, Geel, Grobbendonk (33), Grootlo, Herentals (113), Hingene (33), Hoboken (265), Kalmthout (33, 202), Mol, Olen, Postel (33), Retie, Rijkevorsel (217), Schilde, Schoten, St. Lenaerts (217), Turnhout (243), Wechelderzande, Weelde, Wijnegem, Wommelgem (192), Wuustwezel (217). - BRABANT: Aarschot (33), Auderghem (33), Beersel, Boitsfort (33), Bousval (33), Brussel (33, 113), Buizingen (33), Diest (33), Dworp, Fond St. Corneille, Genval (113), Groenendaal (33), Hamme-Mille, Hofstade (113), Jette (33), Kapelle-op-den-Bos, Keerbergen, (113), Laeken (33), Lasne, Leuven (33), Limal (113), Limelette (113), Mont-Saint-Guibert (33), Nivelles, (33), Noirhat (33), Ohain (113), Ottignies (33), Rixensart (33), Schaffen (33), St. Genesiusrode (113), Ter Hulpe (33), Tervuren (33, 113), Ukkel (33, 113), Walenbos (150), Watermael, Wavre (33), Wezemael (33), Zemst. - HENEGOUWEN: Ath (33, 113), Barbençon (113), Bernissart (33), Braine-le-Comte (33, 113), Donstiennes (113), Forges (125), Harchies, Hennières (33, 113), Kain (33), La Hestre, Lessines, Macqueroise, Mons (33, 113), Péruwelz (33), Quévy (33, 113), Quiévrain (33, 113), Rance (113), Riez, Thuin, Tournai (33), Villers-la-Ville, Virelles (212). - LIMBURG: As, Bree (152), Dilzen, Genk (33, 167), Gruitrode, Guigoven, Hasselt (33), Hechtel, Houthalen (168), Koersel (277), Leopoldsburg (113), Lommel, Maaseik (33), Maasmechelen, Meeuwen, Molenbeersel (152) Munsterbilzen (33) Neerpelt (219), Opitter (299), Opoeteren, Reppel, Zolder, Zonhoven. - LUIK: Antheit, Aywaille (33, 113), Baraque-Michel (33, 65), Bra, Charneux, Clermont, Comblain-au-Pont (33), Eben-Emael, Elsenborn (138), Embourg (33), Esneux (33), Ferrières, Francorchamps (113), Goffontaine (113), Hamoir (33), Hautes-Fagnes (176, 177), Hertogenwald, Hockai (65, 113), Horion-Hozémont (33, 113), Huccorgne, Huy (33, 113), La Calamine (105, 113), Lanaye, Lixhe (113), Lommersweiler, Luik (33), Martinrive (33, 113), Méry (113), Modave (33, 113), Moha, Remouchamps (33), Rocheux (244), Sougné-Remouchamps, Spa (33), Stoumont, Steinebrück, Theux, Thier de Nivelle (185), Tilff (33), Visé, Xhoris. - LUXEMBURG: Aisne (64), Awenne (33, 113), Barvaux-lez-Durbuy (33), Buzenol (113), Carlsbourg (33), Comté-lez-Vielsalm (113), Durbuy (33), Ethe (187), Fouches (146), Herbeumont, Hotton, La Roche-en-Ardenne (33, 113), La Vachère (113), Lesse Our, Marbehan (33), Melreux (33), Muno (113), Nassogne (113), Neufchâteau (33), Odeigne, Orval (113), Ozo, Poupehan, Recogne, Redu (33), Saint-Hubert (33), Torgny (113), Villers-devant-Orval (113). - NAMEN: Andenne, Aublain (33), Belvaux, Blaimont, Boussu-en-Fagne, Bure-Tellin, Cefontaine (113), Clermont-lez-Walcourt, Couvin (33), Cul-des-Sarts, Dave (33), Dinant (33), Dion, Dourbes, Falmignoul, Féage, Frasnes-lez-Couvin, Gimnée, Han-sur-Lesse (33, 113, 126), Hastières (33), Hermeton-sur-Meuse, Heure-en-Famenne (276, 279), Houyet (113), Jamoigne, Jemelle, Le Long d'Hemptinne, Malonne, Marche-les-Dames (33), Mariembourg (33), Matagne, Merlemon, Namur (33), Nismes (113), Oignies-en-Thiérache, Ravin du Colibri, Resteigne (175), Rochefort (113), Roly, Romedenne, Samson (33), Silenrieux (33), Surice, Treignes (149), Waulsort (33, 113), Wavreille (113),

Winenne (113), Yvoir (33), Vierz-sur-Viroin. - OOST-VLAANDEREN: Aalter, Berlare, Deurle (33), Gent (33), Knesselare, Melle (260), Melsele, Neigem, Petit-Renaix, Sint-Denijs-Westrem (269), Waasmunster, Welle. - WEST-VLAANDEREN: Beernem (273), Blankenberge (33, 113), Bloemendaal (33), Brugge (33), De Haan (181), De Panne (121, 126), Harelbeke, Heist (33, 113), Houthulst, Knokke (33, 113), Koksijde, Nieuwpoort (183), Oostduinkerke, Oostende (33), Raversijde, Sint Andries (295), Wingene, Woumen (247), Zedelgem (294), Zwin.

HABITAT. - In de meest verscheiden biotopen aan te treffen, zowel aan de kust als in het binnenland.

FENOLOGIE. - Adult van half april tot eind oktober.

### *Xysticus erraticus* (BLACKWALL, 1834)

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 33, 106, 113, 121, 126, 138, 149, 168, 175, 176, 177, 185, 187, 195, 219, 244, 276.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART N° 24.

VINDPLAATSEN. - BRABANT: Auderghem (33), Keerbergen, Ukkel (113). - HENEGOUWEN: Stambruges. - LIMBURG: Houthalen (168), Neerpelt (219), Rekem. - LUIK: Elsenborn (138), Hautes Fagnes (176, 177), La Calamine (105, 113), Lixhe, Rocheux (244), Theux, Thier de Nivelle (185). - LUXEMBURG: Biham, Carlsbourg (33), Daverdisse, Ethe (187), Ethe-Buzenol, Grand-Halleux, Herbeumont (33), La Roche-en-Ardenne (33), Torgny (113). - NAMEN: Belvaux sur Lesse (113), Chevetogne, Dourbes, Frasnes, Gimnée, Heure-en-Famenne (276), Merlemont, Nismes (196), Resteigne (176), Treignes (149, 195), Vierz-sur-Viroin. - WEST-VLAANDEREN: De Panne (121, 126), Koksijde (121), Nieuwpoort, Oostduinkerke, Zwin.

HABITAT. - In lage begroeiingen, heide, kalkgrasland, zandduinen en onder stenen.

FENOLOGIE. - Volwassen van april tot augustus.

### *Xysticus ferrugineus* MENGE, 1875

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 113, 127, 168, 202, 263, 276.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen met uitzondering van Groot-Brittannië.

VERSPREIDINGSKAART N° 26.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Kalmthout (127, 202). - LIMBURG: As (113), Houthalen (168). - NAMEN: Gimnée, Heure-en-Famenne (276), Le Mesnil, Nismes, Roly, Treignes, Vierz-sur-Viroin. - WEST-VLAANDEREN: Zedelgem (263).

HABITAT. - Voornamelijk gevangen in droge heidebestanden en kalkgraslanden, warmteminnend.

FENOLOGIE. - Adult van april tot oktober.

### *Xysticus kempelini* THORELL, 1872

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIE. - 180.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Duitsland en Frankrijk.

VERSPREIDINGSKAART N° 26.

VINDPLAATSEN. - LIMBURG: Maasmechelen (180). - NAMEN: Treignes.

HABITAT. - Droege heidebiotopen en kalkgrasland, warmteminnend.

FENOLOGIE. - Adulten gevangen in april en mei.

*Xysticus kochi* THORELL, 1872

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES.- 33, 105, 113, 114, 121, 126, 162, 167, 175, 181, 183, 192, 217, 265, 269, 276, 277, 279.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART N°27.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Balen, Beerse, Brecht (33, 113), Hoboken (265), Kalmthout, Mechelen (113), Mol, Olen, Postel (33), St.Lenaerts (217), Weelde, Wommelgem (192). - BRABANT: Brussel (113), Humbeek, Kapelle-op-den-Bos, Limelette, Mont-St. Guibert (33), Schaerbeek, Ukkel (113), Zaventem (33). - HENEGOUWEN: Tournai (33). - LIMBURG: As (113), Bree (162), Genk (167), Hechtel, Koersel (277), Maasmechelen, Meeuwen, Molenbeersel (152), Rekem, Zonhoven. - LUIK: Aywaille, Esneux, Holligne-aux-Pierres (33), La Calamine. - LUXEMBURG: Ethe (113), Orval (113), Redu, Torgny. - NAMEN: Frasnes-lez-Couvin, Heure-en-Famenne (276, 279), Resteigne (175), Rochefort-Belvaux, Roly, Romedenne, Treignes. - OOST-VLAANDEREN: Gent, Heusden (114), Kalken (114), St.Denijs-Westrem (269), Waasmunster. - WEST-VLAANDEREN: Blankenberge, De Haan (181), De Panne (121, 126), Heist (33), Koksijde, Knokke (113), Nieuwpoort (183), Oost-duinkerke, Oostende (113), Ravels, Westende (113), Zwin.

HABITAT. - Onder stenen, op lage begroeïingen, duinen en heidebiotopen.

FENOLOGIE. - Van half maart tot begin september volwassen exemplaren.

*Xysticus lanio* C.L. KOCH, 1824

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 33, 113, 114, 139, 146, 150, 152, 176, 192, 212, 217, 226, 272, 273, 278, 296.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART N° 28.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Balen, Grobbendonk (33), St.Lenaerts (217), Weelde, Wuustwezel (217). - BRABANT: Auderghem, Brussel (33), Groenendaal (33), Houwaart, Leuven (33), Tervuren, Tielt-Winge, Ukkel (33), Walenbos (150), Wommelgem (192). - HENEGOUWEN: Etang de Virelles, Howardries (113), Virelles (212). - LIMBURG: Bree (152), Gruitrode, Hasselt, Leut, Maasmechelen, Meeuwen, Molenbeersel (152), Rekem, Zonhoven. - LUIK: Barrage de la Gileppe (33), Ferrières, Liège (33). - LUXEMBURG: Etalle (113), Ethe (113), Fouches (146), Meix devant Orval, Orval (113), Ozo, Redu (33), Torgny (113). - NAMEN: Bure, Dave (33), Denée (113), Dourbes, Ferage, Frasnes-lez-Couvin, Gimnée, Han-sur-Lesse (113), Heure-en-Famenne (272, 276), Le Bocq (113), Le Mesnil, Nismes, Niverlé, Oignies-en-Thiérache, Resteigne (175), Rivière (113), Treignes, Yvoir. - OOST-VLAANDEREN: Aalter (114), Gontrode (139). - WEST-VLAANDEREN: Beernem (273), Houthulst, Ichtegem (228), Sint Andries (295).

HABITAT. - Op struikgewas, takken van loof- en naaldhout, kalk- graslanden en heidegebieden.

FENOLOGIE. - Adult van half april tot oktober.

*Xysticus lineatus* (WESTRING, 1851)

SYNONIEM.- *Xysticus dentiger* E. SIMON, 1878.

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 33, 113, 114, 149, 173, 175, 187.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen uitgezonderd Groot-Brittannië.

VERSPREIDINGSKAART N° 29.

VINDPLAATSEN. - BRABANT: Bois de la Cambre (33), Boitsfort (33), Groenendaal (33). - LUIK: Horion-Hozémont (33), Liège (33), Logne (33), Martinrive (33), Xhoris. - LUXEMBURG: Ethe (187), Buzenol (173), Heinsch (114), Lamorteau (113), Marbehan (33), Munro (113), Ozo (113), Redu (33), Torgny (113). - NAMEN: Jemelle (113), Nismes, Resteigne (175), Treignes (149), Vierves-sur-Viroin.

HABITAT. - Onder stenen en op lagere planten, kalkgrasland, warmteminnend.

FENOLOGIE. - Van mei tot september volwassen.

*Xysticus luctator* L. KOCH, 1870

SYNONIEM. - *Xysticus cambridgei* (BLACKWALL, 1858).

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 33, 113.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART N° 30.

VINDPLAATSEN. - LUIK: Comblain au Pont (33), Tilff (33). - LUXEMBURG: La Roche (33, 113).

HABITAT. - Leeft voornamelijk onder stenen.

*Xysticus luctuosus* (BLACKWALL, 1836)

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 33, 113, 146, 165.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART N° 31.

VINDPLAATSEN. - BRABANT: Bois de la Cambre (33), Tervuren, Ukkel (33, 113). - LUIK: Rocherath (165), Xhoris. - LUXEMBURG: Ethe- Buzenol, Fouches (146), Hachy, Heinsch, Hotton, La Roche-en-Ardenne (113), Lesse Our, Orval, Torgny (113), Villers-devant-Orval (113). - NAMEN: Cerfontaine (113), Couvin (113), Resteigne, Romedenne, Treignes (146).

HABITAT. - Op lage begroeiing, Langs bossen en in kalkgraslanden.

FENOLOGIE. - Volwassen van april tot september.

*Xysticus robustus* (HAHN, 1832)

SYNONIEM. - *Proxysticus robustus* (HAHN, 1831).

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 33, 113, 146, 196.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART N° 32.

VINDPLAATSEN. - LUXEMBURG: Barvaux-lez-Durbuy (33), La Roche-en-Ardenne (33, 113). - NAMEN: Nismes (196), Treignes (146, 195).

HABITAT. - Voornamelijk onder stenen, langs bosranden en in kalk- grasland, warmteminnend.

FENOLOGIE. - In mei en juni werden adulte exemplaren verzameld.

*Xysticus sabulosus* (HAHN, 1832)

SYNONIEM. - *Psammitis sabulosa* (HAHN, 1831).

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES. - 33, 113, 126, 167.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART N° 33.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Kalmthout (33, 113). - LIMBURG: Genk (33, 113, 167), Koersel, Maasmechelen. - LUXEMBURG: Torgny. - WEST-VLAANDEREN: Heist (33), De Panne (126), Knokke (33), Nieuwpoort.

HABITAT. - In heidegebieden en zandduinen.

FENOLOGIE. - Volwassen van half april tot december.

*Xysticus striatipes* (L. KOCH, 1870)

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIE. - 33, 113.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Frankrijk en Middellandse Zeegebied.

VERSPREIDINGSKAART N° 34.

VINDPLAATS. - LUXEMBURG: Redu (33, 113).

FENOLOGIE. - Slechts éénmaal gevangen langs de rand van een bos in de maand juli.

*Xysticus ulmi* (HAHN, 1832)

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIE. - 33, 66, 78, 97, 105, 113, 125, 126, 138, 146, 149, 150, 162, 166, 167, 176, 177, 187, 192, 212, 247, 250, 266, 266, 289, 275, 276, 277, 299.

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING. - Alle ons omringende landen.

VERSPREIDINGSKAART N° 35.

VINDPLAATSEN. - ANTWERPEN: Antwerpen (268), Balen, Blaasveld, Bornem, Brecht (113), Ekeren, Herentals (33), Hoboken (265), Hombeek, Mol, Retie, Weelde, Wommelgem (192). - BRABANT: Anderlecht, Auderghem (33), Boitsfort (33), Brussel (113), Dworp, Gooik, Heverlee, Humbeek, Kapelle-op-den-Bos, Kraainem (113), Limal (113), Limelette (113), Mont-Saint-Guibert (33), St.Genesiusrode, Tervuren (113), Ukkel (33, 113), Walenbos (150), Wavre (33), Wemmel, Zemst. - HENEGOUWEN: Braine-le-Comte (33), Chimay-Virelles (125), Etang de Virelles, Houdeng, Marcinelle (113), Montignies-le-Tilleul, Thuin, Virelles (212). - LIMBURG: Achel, As (113), Bree (152), Dilsen, Genk (167), Koersel (277), Molenbeersel (152), Opitter (299), Rekem, Zonhoven. - LUIK: Amay, Antheit, Aywaille, Baraque Michel (113), Bas-Oha, Bra, Büttgenbach, Elsenborn (135), Ferrières, Francorchamps (113), Hautes-Fagnes (178, 177), Hockai (85), Huccorgne, Huy, La Calamine (105, 113), Lixhe (113), Malmedy, Moha, Montagne St. Pierre, Regissa, Rocherath (185), Spa, Sprimont, Vallée de la Mehaigne. - LUXEMBURG: Amonines (113), Baraque Fraiture (78), Daverdisse, Etalle (113), Ethe (187), Ethe-Buzenol, Forêt de Munro, Fouches (148), Haute-Ardenne (97), Heinsch, Herbeumont, La Roche-en-Ardenne (113), Lesse-Our, Melreux (113), Munro (113), Orval, Redu, Sugny, Suxy (113), Torgny (113), Villers-devant-Orval (113). - NAMEN: Blaimont, Bouge, Bourseigne, Cefontaine (113), Chevetogne, Cul-des-Sarts, Denée, Dinant (33), Doische, Faulx-les-Tombes, Ferage, Frasnes, Heure-en-Famenne (278), Jemelle, Lustin, Nismes, Oignies-en-Thierache, Onoz-Spy (113), Rhisnes (33), Roly, Treignes (149), Waulsort (33), Yvoir (331) - OOST-VLAANDEREN: Aalter, Evergem, Knesselare, Melle (250), Neigem, Overmere, Sint-Denijs-Westrem (269). - WEST-VLAANDEREN: De Panne (126), Houthulst, Koksijde, Kuurne, Langemark, Oostkamp (276), Woumen.


HABITAT. - Zowel in droge als vochtige biotopen, open en gesloten begroeïingen.

FENOLOGIE. - Volwassen van half april tot half oktober.


### GECITEERDE LITERATUUR

- BECKER, L., 1882. Les Arachnides de Belgique (première partie). *Annales du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique*, 10: 1-246.
- BOSMANS, R. & MAELFAIT, J.P., 1986. Herziene soortenlijst van de Belgische spinnen. *Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging*, 3: 9-29.
- HEIMER, S. & NENTWIG, W., 1991. Spinnen Mitteleuropas. Berlin, P. Parey, 643 pp.
- KEKENBOSCH, J., 1971. Notes sur les Araignées de la faune de Belgique. V. Thomisidae. *Bull. Inst. r. Sc. nat. Belg.*, 47, 37, 1-27.
- LOCKET, G.H. & MILLIDGE, A.F., 1951. British Spiders, vol. I. Ray Society London. 310 pp.
- LOCKET, G.H., MILLIDGE, A.F. & MERRETT, P., 1974. British Spiders, vol. III. Ray Society London. 315 pp.
- LOERBROKS, A., 1983. Revision der Krabbensspinnen-Gattung *Heriaeus* SIMON (Arachnida: Araneae: Thomisidae). *Verh. naturwiss. Ver. Hamburg*, 26: 86-139.


- ROBERTS, M.J., 1985. The spiders of Great Britain and Ireland. Volume I: Atypidae to Theridiosomatidae.  
*Harley Books*, 229 pp.
- SIMON, E., 1932. Les Arachnides de France, Vol. 6: 773-978.
- TULLGREN, A., 1970. Fam. 1-4. Salticidae, Thomisidae, Philodromidae och Eusparassidae. In *Svensk Spindelfauna 3*.1944 Stockholm, 138 pp.
- VAN HELSDINGEN, P., 1980. Novus catalogus Aranearum. Hucusque in Hollandia inventarum. Leiden, 224pp.




1. *Coriarachne depressa*  
(C.L.KOCH, 1837)







2. *Diae dorsata*  
(FABRICIUS, 1777)











3. *Heriaeus graminicola*  
(DOLESCHALL, 1852)








4. *Misumena vatia*  
(CLERCK, 1757)














21. *Xysticus audax*  
(SCHRANK, 1803)







22. *Xysticus bifasciatus*  
C.L.KOCH, 1837








23. *Xysticus cristatus*  
(CLERCK, 1757)




24. *Xysticus erraticus*  
(BLACKWALL, 1834)








33. *Xysticus sabulosus*  
(Hahn, 1832)



34. *Xysticus striatipes*  
(L.KOCH, 1870)



35. *Xysticus ulmi*  
(HAHN, 1832)